

흡수율이 높고 안전한 빈혈치료제

웨르친 캡슐

일반의약품

분류 번호 322
(무기철제제)

- 철 결핍성 빈혈 예방 · 치료제
- 1일 1회 1캡슐로 철분, 비타민B12, 폴산(엽산)을 한번에 복용할 수 있습니다.
- 위장장애가 없어 누구나 복용 가능합니다.
- 생체철(페리친)을 함유하여 흡수율이 높습니다.

생체철(페리친)은 철과 아포페리틴의 복합물, 일반적으로 위장 점막, 간, 비장(지라), 골수(뼈속질)에 소량 존재하는 저장 철단백입니다. 생체철(페리친)을 주성분으로 하는 웨르친캡슐은 생체내 흡수율이 높으며 기존의 철분제와는 달리 변비나 위장장애 등의 부작용이 거의 없는 우수한 철분제입니다.

원료약품의 분량 (1캡슐 중)

철단백 추출물 (발규) (페리친성 철로서 20.0mg)	155mg
시아노코발라민 (비타민B12) (KP)	500µg
폴산(엽산) (KP)	800µg
청가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호	

성상 : 적갈색의 분말이 든 적색의 경질캡슐제

효능 · 효과 : 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

용법 · 용량

성인 및 12세 이상 : 1일 1회 1캡슐을 식후복용합니다.

웨르친캡슐은 어린이가 함부로 뚜껑을 열어 과량 복용하게 되는 사고를 미연에 방지하기 위하여 특수 고안된 뚜껑(Children Resistance Cap)을 사용하고 있습니다.

[사용법]

1. 병뚜껑을 위에서 아래로 함껏 누릅니다.
2. 뚜껑을 누른 상태에서 시계 반대 방향으로 돌립니다.



사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바라며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관합니다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락합니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분이나 과민반응 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(젖먹이)
- 3) 혈색소증(철 대사이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직 장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의(헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
- 4) 철 이용 장애에 : 납중독으로 인한 빈혈, 철 불용성(녹지 않는) 빈혈, 지중해 빈혈, 만발성 피부 포르피린증) 환자
- 5) 비철결핍성 빈혈 환자 (예 : 비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈)
- 6) 철 과잉증 환자
- 7) 감염이나 종양으로 인한 철 결핍성 빈혈 환자 (철이 세망 내피계에 축적되어 이용에 장애를 받을 수 있으므로 1차 질환이 치료된 후 복용하십시오.)
- 8) 만성 췌장(이자)염 환자
- 9) 간경변 환자
- 10) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염
- 2) 경구용 테트라사이클린계 항생제
- 3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유·유제품은 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대창염, 국한성(특정부문에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장·순환기계가능 장애 환자
- 4) 발작성 야간 혈색소뇨증 환자(용혈을 유발하여 병태(병의 상태)를 악화시킬 수 있습니다.)
- 5) 신장에(신장장애) 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 철 함유제제(철분제, MRI용 간장 조영제 등)를 투여중인 환자
- 8) 항알도스테로제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)
- 9) 구충론제, 페니실라민, 글래스티라민, 웨징(이자)엑스 및 비타민 E와 같은 물질을 복용하는 사람
- 10) 철분 제제와 디포스포산 염류, 티록신, 세프디니르 제제를 동시 복용하는 사람(이 제제들의 흡수가 감소되므로 일정한 시간 간격 (2~3시간 이상)두고 복용하십시오.)

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민 반응
- 2) 복부(배부분)· 위통증, 위 경련, 위부불쾌감, 구토, 설사, 구역, 식욕부진, 변비, 흑변, 치아변색
- 3) 열, 혼수
- 4) 진단 또는 검사 시 AST, ALT의 상승, ALP 상승
- 5) 콜산(염산)이 부족한 환자(예 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.)
- 6) 과광 투여로 인해 구역, 구토, 변비, 설사 등의 위장증상, 식욕부진, 복통(배아픔), 토혈(혈액구토), 직장출혈, 무기력, 권태감, 졸음, 창백, 청흑반, 순환장애 또는 과혈당증, 대사성 산증, 간호소 수치(혈)의 상승, 색소침착, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 무중(무가), 혼수상태에 이르는 속, 중독 될 경우 소화기간의 협착(좁아짐) 유발
- 7) 과광 투여로 인한 위장관 장애와 순환부전을 수반한 하혈의 경우에는 구토를 시킨 후 탄산염과 우유를 복용시켜 위세척을 하십시오.
- 8) 국내에서 이 제제를 가지고 철결핍성 빈혈 환자 71명을 대상으로 유효성 및 안전성 재평가를 위한 임상시험을 실시한 결과, 유효사례 발현(드러냄)은 28.17%(20명, 35건)이었고, 소화기계 18.3%(13명, 13건), 전신증상 11.3%(8명, 8건), 피부관련 4.2%(3명, 3건), 통증관련 4.2%(3명, 3건), 눈관련 4.2%(3명, 3건), 호흡기계 1.4%(1명, 1건), 정신신경계 1.4%(1명, 1건), 심혈관계 1.4%(1명, 1건), 수술관련 0.71%(1명, 1건)으로 나타났습니다. 약물유해반응(분제와 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해사례) 발현율(드러냄)은 5.6%(3명, 4건)이며, 변비 1.4%(1명, 1건), 상세불명의 복부(배부분)통증 1.4%(1명, 2건), 설사 1.4%(1명, 1건), 구역 1.4%(1명, 1건)이었습니다. 이중 중대한 약물유해반응은 없었습니다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 합니다. 빈혈은 혈액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 합니다. (예 : 만성질환에 의한 빈혈은 철분 복용이 유효하지 않을 수 있습니다.)
- 3) 12세 이상 청소년에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 4) 일정기간 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 5) 투여 중에는 혈액 검사를 실시하고, 과광 투여하지 않도록 주의하십시오.
- 6) 아스코르브산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가 될 수 있습니다.
- 7) 이 약에 함유된 폴산(엽산)은 악성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만 신경증상에 효과가 없으므로 악성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민 B12제제와 병용(함께복용)합니다. 다만, 진단이 확립되지 않은 악성빈혈이 있는 환자의 경우에 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 되므로 주의하십시오.
- 8) 만성적인 알콜 오남용은 철분의 재흡수를 증가시키고, 철분 과부하를 유발할 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 30, 60캡슐

- 구입시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게 교환받으실 수 있습니다.
- 개정일자(2013년 5월 6일자) 이 후로 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 전자원활창구(ezdrug, kfda.go.kr)의 의약품등 정보 에서 확인할 수 있습니다.

* 사용(유효)기간이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.

제조사

정계제약(주)

경기도 화성시 양감면 두머리길 16

소비자상담실 : 02-554-2639

판매자

일등제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우포로27길 2 (전화) 02-526-3114

공장 : 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)