

의약품 분류번호	329 자양강장 보조제
-------------	--------------------

리피션® 20% 주

Lipision® 20% inj.

전문의약품

□원료약품의 분량

이 약 100mL 중
정제대두유(EP).....20.0g
첨가제 : 정제난인지질, 농글리세린, 수산화나트륨, 주사용수

□성상

수액용 플라스틱 용기에 들어있는 유백색의 유탁액

□효능·효과

비경구 영양공급 처방의 일부로서 에너지 및 필수 지방산의 보급

□용법·용량

- 성인 : 일반적으로 체중 kg당 정제대두유로서 1일 2g(10%는 20mL, 20%는 10mL)이내로 합니다. 투여시간은 3시간 이상에 걸쳐 점적정맥주사합니다. 첫째날 처음 주사에 한하여 체중 kg당 1g 이내로 투여합니다.
- 환자의 생리학적 물질대사 상태를 고려하여 필수 지방산과 칼로리의 요구량에 맞게 점적 정맥주사합니다.

□사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 혈전증 환자
 - 중증 간장에 환자
 - 중증 혈액응고장애 환자
 - 고지혈증 환자
 - 케톤산증을 수반한 당뇨병 환자
 - 급성 속환자
 - 치료되지 않은 전해질 불균형 환자
 - 불안정한 대사 환자
 - 식혈세포증후군(hemophagocytotic syndrome) 환자
 - 인지질 등에 알레르기 반응의 병력이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 간기능 장애 환자
 - 혈액응고 장애 환자
 - 호흡 장애 환자
 - 미숙아
 - 중증의 세균성 패혈증 환자
 - 임부
 - 뇌질환 환자
 - 급성 해장염 환자
 - 혼수 환자
 - 지방대사이상 환자(신부전, 당뇨병, 췌장염, 간 기능 이상, 갑상선 기능 저하증(고트리글리세라이드 혈중이 있을 경우), 패혈증 등)
- 이상반응
 - 알러جي : 때때로 정맥염, 혈관통, 출혈경향, 재발성 정맥색전증, 만성적혈구증가증 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 과민반응 : 과민반응이 나타날 경우에는 중지합니다.
 - 간장 : 장기연용에 따라 간기능장애가 나타날 수 있습니다. 이러한 경우에는 감량 등 적절한 처치를 하여야 합니다.
 - 순환기계 : 때때로 혈압강하, 빈맥, 빈호흡, 거뒀되는 호흡곤란, 청색증 등의 증상이 나타날 수 있습니다. (투여초기에 증상이 나타나면 투여를 중지하고 적절한 처치를 하여야 합니다.)
 - 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 설사, 구갈 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 가타 : 때때로 발열, 오한, 인면홍조, 인면부종, 흉부압박감, 이취감, 지속발기(참가사용시) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 과량 투여 : 인체의 지방 대사 능력에 이상이 생겨 지방과다증후군을 초래할 수 있습니다. 이는 고지혈증, 발열, 지방침착, 여러 장기의 이상, 혈액응고시간지연, 혈소판 감소증, 심한 경우 혼수상태 등으로 특징지을 수 있습니다. 이러한 증상들은 대체로 지방의 투여를 중단하면 사라집니다.
- 일반적 주의

연용할 경우에는 간기능, 혈중지질농도, 혈액상 및 혈액응고능의 검사를 정기적으로 실시합니다.

- 상호작용
 - 와파린의 작용을 저하시킬 수 있습니다.
 - 임상적으로 사용되는 용량의 헤파린과 함께 투여할 경우 혈장의 지방분해가 일시적으로 증가함에 따라 지단백 분해효소가 고갈되어 트리글리세라이드의 제거율이 일시적으로 감소되기도 합니다.
- 소아에 대한 투여
 - 신생아 특히 극소 미숙아, 호흡장애, 산증을 수반한 신생아
 - 생후일수가 짧은 신생아는 지방처리능력이 낮으므로 다음 사항에 유의하여 신중히 투여해야 합니다.
 - 투여할 때에는 될 수 있는 한 서서히 주입합니다. 예를 들면 0.08g/kg/시간 이하의 속도로 주입해야 합니다.
 - 지방처리능력이 매우 낮다고 생각되는 증례에 있어서는 혈중 지방농도를 측정하여 현저한 상승이 인식되지 않은 속도로 주입하는 것이 바람직합니다.
 - 호흡장애가 있는 신생아, 특히 극저체중아에서 호흡장애가 악화되었다는 보고가 있으므로 충분히 관찰합니다.
 - 고빌리루빈혈증이 있거나 폐동맥의 고혈압이 의심되는 소아 및 미숙아에게 이 약을 투여시 혈소판, 간효소 시험치, 혈장 중 트리글리세라이드 및 지방산수치를 모니터링 합니다.
 - 패혈증이 의심되거나 C 반응성단백(C-reactive protein)의 수치가 증가한 신생아의 경우에는 트리글리세라이드 수치를 주의 깊게 모니터링 합니다.
 - 소아의 경우 장기투여후 혈소판감소증이 나타날 수 있습니다.
- 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 신중히 투여해야 합니다.
- 임상 검사치에의 영향

이 약을 투여하고 지방이 혈류에서 완전히 제거되기 전에 채혈을 할 경우 일부 실험실적 검사치들(빌리루빈, 젯산탈 수소효소, 산소포화도, 헤모글로빈 등)의 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 대부분의 환자에서 투여를 중단한지 5~6시간 후에 지방이 제거됩니다.
- 적용상의 주의
 - 점적정맥주사로만 사용합니다.
 - 투여속도가 빠르면 때때로 정맥염, 혈관통, 빈맥, 빠른호흡, 구역, 구토, 발열, 오한, 인면홍조, 흉부압박감 등의 급성증상을 일으킬 수 있으므로 다음과 같은 주의가 필요합니다.
 - 천천히 주입합니다.
 - 다른 약물을 혼합하지 않아야 합니다. 또한 혈액응고장애(엑스트란, 젤라틴 제제 등) 투여 후 96시간 까지는 이 약 투여를 피합니다.
 - 투여액 온도가 낮으면 때때로 정맥염, 혈관통이 나타날 수 있습니다.
 - 일단 마개에 침을 찌른 것은 속히 사용하고 남은 액은 사용하지 않아야 합니다.
 - 한번 동결된 것은 사용하지 않아야 합니다.
- 보관 및 취급상의 주의사항

25℃이하에서 보관하되 얼리지 않아야 합니다.

□포장단위

250mL

□저장방법

밀봉용기, 동결을 피하고 25℃이하의 암소에서 보관할 것

□교환 및 제품문의

이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과 되었거나, 변질·부패 또는 파손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주시십시오.

연락처 : 고객보호팀 1588-2675

※식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 참조



■ Bag제품 사용할 때의 주의사항

- 용기에 인쇄된 용량 표시 눈금과 실제용량이 다를 수도 있습니다.
- 용기의 겉포장 필름은 사용전까지 제거하지 마십시오. 겉포장 필름을 제거하였을 때는 용기를 눌러서 누액 등의 손상여부를 확인하십시오.
- 손상·누액이 확인된 용기는 사용하지 마십시오.

■ 수액제품 사용시 주의사항

- 주사기나 수액Set 삽입부위를 알콜솜 등으로 충분히 소독 후 사용하십시오.
- 멸균한 주사기나 수액Set를 사용하여 적정 정주하십시오.
- 확대하지 않고 쉽게 알아볼 수 있는 혼탁물이나 불용성 물질이 있으면 사용하지 마십시오.

판매원



제조회

