

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

펩타졸[®]정 40mg

PEPTAZOLE Tab. 40mg

판토프라졸나트륨세스키하이드레이트 (Pantoprazole Sodium Sesquihydrate)

펩타졸 정은 위벽 세포 표면에서 위산 분비 작용을 하는 (H⁺, K⁺)-ATPase에 공유결합함으로써 위산 생성의 마지막 단계를 억제하여 우수한 궤양 치료 효과를 나타내는 2세대 프로톤펌프억제제(PPI : Proton Pump Inhibitor)입니다. 펩타졸 정은 주성분인 판토프라졸은 부작용 발현율이 낮고, 다른 약물과의 상호작용이 거의 없는 약물로 단기 및 장기 투여 환자, 고령 환자들의 궤양 치료에 적합합니다. 또한 1일 1회 투여만으로도 지속적인 산 분비 억제 효과가 있어, 야간에 더 욱 심한 통증을 유발하는 위식도역류질환(GERD) 환자들의 증상 완화 및 치료에 사용될 수 있습니다. 뿐만 아니라, 펩타졸 정은 항생제와의 병용을 통해 헬리코박터 파이로리 균에 대한 강력한 박멸 작용을 나타내어 헬리코박터 파이로리에 감염된 위십이지장궤양의 치료 기간을 단축시키고 재발 방지에도 효과적입니다.

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정 중
판토프라졸나트륨세스키하이드레이트(Pantoprazole Sodium Sesquihydrate)(USP) 45.10mg
(판토프라졸로서 40.00mg)

【성 상】 황색의 장용성 제피를 한 타원형 정제

- 【효능·효과】**
- 헬리코박터 필로리에 감염된 위·십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법
 - 십이지장궤양
 - 위궤양
 - 중등도~중증의 역류성 식도염
 - Zollinger-Ellison 증후군 및 기타 병리학적 위산 과분비 상태

- 【용법·용량】**
1. 헬리코박터 필로리에 감염된 위·십이지장궤양의 재발방지를 위한 항생제 병용요법
 - 통상, 성인은 다음 항생제와 병용하여 판토프라졸로서 1회 40 mg을 1일 2회(아침 및 저녁식전) 씹거나 부수지 말고 1주간 투여한다.
 - (1) 아목시실린 1회 1000 mg과 클라리트로마이신 1회 500 mg을 1일 2회, 1주간 복용하거나
 - (2) 메트로니다졸 1회 500 mg과 클라리트로마이신 1회 500 mg을 1일 2회, 1주간 복용하거나
 - (3) 아목시실린 1회 1000 mg과 메트로니다졸 1회 500 mg을 1일 2회, 1주간 복용한다.
 - (2),(3)의 메트로니다졸 사용요법은 1의 요법이 부적당한 경우에만 사용한다.
 - 궤양의 치유를 확실히 하기 위해 판토프라졸로 추가의 치료가 지시된다면 십이지장궤양과 위궤양에 대해 아래의 용법에 따른 투여량추천이 고려되어야 한다.
 - 병용 요법이 필요하지 않은 경우(예, 헬리코박터필로리 감염에 음성) 아래의 용법에 따른 판토프라졸의 단독요법을 실시한다.
 2. 위궤양 및 역류성식도염
 - 통상, 성인 판토프라졸로서 1일 1회 40 mg을 아침식전 씹거나 부수지 말고 물과 함께 복용한다.
 - 대부분 4주 이내에 치유될 수 있으나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다. 처음 4주 복용후 완치되지 않은 경우에는 계속해서 4주 더 복용한다.
 - 특별히 다른 치료법에 반응이 없었을 경우 용량을 두배로 증량(판토프라졸로서 1일 80 mg)할 수 있다.
 3. 십이지장궤양
 - 통상 성인 판토프라졸로서 1일 1회 40 mg을 아침식전 씹거나 부수지 말고 물과 함께 복용한다.
 - 대부분 2주 이내에 치유될 수 있으나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다. 처음 2주 복용후 완치되지 않은 경우에는 계속해서 2주 더 복용한다.
 - 특별히 다른 치료법에 반응이 없었을 경우 용량을 두배로 증량(판토프라졸로서 1일 80 mg)할 수 있다.
 4. Zollinger-Ellison 증후군 및 기타 병리학적 위산 과분비 상태
 - 초회용량으로 1일 판토프라졸로서 80 mg으로 시작한 다음, 위산분비 측정값에 따라 증량하거나 줄일 수 있다.
 - 80 mg 이상 용량에 대해서는 1일 2회에 나누어 복용한다.
 - 일시적으로 160 mg이상으로 증량하는 것은 가능하나 적당량의 산을 조정할 수 있을 정도로만 적용되어야 한다.
 - 치료기간은 제한적이지 않지만 임상적 필요에 따라 변경되어야 한다.
- 중증의 간장애(liver impairment)환자에게는 용량을 감소시켜 판토프라졸로서 격일마다 1회 40 mg씩 복용한다.
- 고령자 또는 신기능장애가 있는 환자는 판토프라졸로서 1일 40 mg을 초과하지 않도록 한다. 고령자의 경우에는 예외적으로 위의 항생제 병용요법으로 이 약으로서 1회 40 mg을 1일 2회(아침 및 저녁식전) 씹거나 부수지 말고, 1주간 복용할 수 있다.
- 중등도~중증의 간/신기능장애 환자의 경우에 항생제 병용요법을 사용해서는 안 된다. 이 병용요법에 대한 유효성, 안전성에 대한 자료가 충분하지 않다

【사용상의 주의사항】

- 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.**
- 1) 항생제 병용요법의 경우 중등도-중증의 간/신기능 장애자(안전성 유효성에 대한 임상경험이 없음)
 - 2) 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤조이미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자 또는 병용요법의 약에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 3) 페니실린계 항생제에 과민반응 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 아목시실린과 병용요법시)
 - 4) 마크로라이드계 항생제 과민반응 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 클라리트로마이신과 병용시에 한함.)
 - 5) 테르페나딘, 시사프리드, 피모지드, 아스테미졸을 투여 받고 있는 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 클라리트로마이신과 병용시에 한함) (4. 상호작용 참조)
 - 6) 아타자나비르 투여중인 환자(4. 상호작용참조)
 - 7) 임신 1기인 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 8) 수유부
 - 9) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이상반응

- 1) 기관계별 이상반응

기관계\발현빈도	자주 1% ~ 10% 미만	때때로 0.1% ~ 1% 미만	드물게 0.01% ~ 0.1% 미만	매우 드물게 0.01 % 미만 또는 단독보고
위장관계	상복부통, 변비, 고창(복부 팽만감),설사	구역/구토, 트림, 입안건조		
전신계		피로, 무력증, 권태	부종(투약중단시 사라짐),체온상승(투약중단시 사라짐)	발열
간담즙계		간효소치(아미노전달효소, γ-GTP) 상승	빌리루빈 상승, 간부전을 동반하거나 동반하지 않는 황달을 유발시키는 심각한 간세포성 손상	
면역계			아나필락시스 쇼크를 포함하는아나필락시스반응	
근골격계, 결합조직계			관절통, 근육통(투약중단시 사라짐)	횡문근융해 배골절
신경계	두통	어지럼,시력장애(시아 흐림)	미각이상	
정신계	불면	수면장애	우울증(투약중단시 사라짐), 환각, 착란	
신장 및 요로계			간질신장염	
피부 및 피하조직계		가려움증이나 피부발적과 같은 알레르기 반응	두드러기,혈관부종,피부점막인중후군(스티븐스존슨증후군),다형성홍반, 독성 표피괴사증(리엘증후군)과 같은 심각한 피부 증상, 광감수성	
내분비계			고혈당증	구토
혈액 및 임파계			무과립구증	백혈구감소증, 혈소판감소증, 범혈구감소증
생식기계			여성형유방	백혈구감소증, 혈소판감소증, 범혈구감소증
대사 및 영양계			고지혈증과 지질증가(트리글리세라이드,콜레스테롤), 체중변화	지나트륨혈증, 저마그네슘혈, CK(creatinine kinase)상승

2) 이 약과의 인과관계에 상관없이 1 %이상에서 추가로 발생한 이상반응은 다음과 같다. : 불안, 관절통, 무기력증, 요통, 기관지염, 흉통, 기침증가, 소화불량, 호흡곤란, 독감증상(flu syndrome), 위장염, 위장장애, 고지혈증, 간장과도, 감염, 편두통, 경부통, 통증, 인두염, 직장장애, 비염, AST 상승, 부비동염, 상기도감염, 빈뇨, 요로감염

- 3) 이 약과의 인과관계는 명확하지 않으나, 이 약 투여 후 1 % 미만에서 추가로 발생한 이상반응은 다음과 같다.
- 전신 : 중기, 알레르기반응, 오한, 피로, 안면부종, 일반적인 부종, 열감, 탈장, 임상실험실검사이상, 관태강, 모낭리아증, 종양, 불특이성 약물반응
 - 심혈관계 : 심전도이상, 협심증, 부정맥, 심방세동, 관상동맥질환, 흉통, 유희성심부전, 출혈, 고혈압, 저혈압, 심근경색, 심근허혈, 심계항진, 망막혈관질환, 실신, 빈맥, 정맥염, 혈전증, 혈관확장
 - 소화기계 : 식욕감퇴, 아프타성 구내염, 대장염, 십이지장염, 연하장애, 장염, 식도출혈, 식도염, 위십이지장 종양, 위십이지장 출혈, 위십이지장 모낭리아증, 치은염, 구취, 토혈, 식욕증가, 흑색변, 구내궤양, 구내 모낭리아증, 치주농양, 치주염,직장출혈, 위궤양, 배변이상, 혀의 변색, 궤양성 대장염
 - 내분비계 : 당뇨, 갑상선종
 - 간 및 담도계 : 담낭통, 고빌리루빈증, 담낭염, 담석증, 황달, 간염, Alkaline Phosphatase 상승
 - 혈액계 : 빈혈, 반상출혈, 호산구증가증, 철결핍성빈혈, 백혈구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증
 - 대사 및 영양계 : 탈수, 통풍, 갈증, 체중증가, 체중감소
 - 근골격계 : 관절염, 골질환, 관절질환, 다리경련, 혈액낭염, 건초염
 - 신경계 : Abnormal dream, 혼돈, 경련, 임마름, 구어장애, 환각, 활동과다, 성욕감퇴, 초조, 신경통, 신경염, 신경장애, 이상감각, 반사작용감소, 수면장애, 졸림, 이상지각, 진전
 - 호흡기계 : 천식, 코피, 말꼭질, 후두염, 호흡장애, 폐렴, 목소리변형
 - 피부/부속기계 : 여드름, 탈모증, 접촉성피부염, 습진, 균성피부염, 출혈, 단순포진, 대상포진, 태선모양피부염, 반구진성 발진, 피부질환, 피부궤양, 발한
 - 특수감각 : 악시, 백내장, 난청, 복시증, 이통, 마비, 녹내장, 외이도염, 미각이상, 이명
 - 비뇨기계 : 알부민뇨, 귀두염, 유방통, 방광염, 월경불순, 배뇨장애, 부고환염, 월노, 발기부전, 신장결석, 신장통, 야뇨증, 전립선장애, 신우신장염, 음낭부종, 요도통, 요도질환, 비뇨이상, 질염
- 4) 시판 후 조사에서 나타난 이상반응
- 감염
 - 빈도 불명 : 클로스트리듬 디피실레성 설사
 - 대사 및 영양계
 - 빈도 불명 : 저마그네슘혈증

3. 일반적 주의

- 이 약으로 인해 약성종양의 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 약성 종양이 의심되는 경고 증상(의도하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킴곤란, 토혈, 흑색변 등)이 있으면서 위계양이 있거나 의심되는 경우 약성이 아님 을 확인하고 투여해야 한다.
- 이 약으로 장기간 치료할 경우(특히 1년 이상) 환자는 정기적으로 검사를 받아야 한다.
- 중증의 간장애환자에 대하여 투약하는 경우 투약은 이 약 40 mg을 이틀에 한번 하는 것으로 하고, 투약기간중 간효소치를 정기적으로 관찰하고 만일, 수치가 높아진 경우에는 투약을 중지한다.
- 역류성 식도염은 내시경으로 확인되어야 한다.
- 이 약은 신경성 위질환 같은 경미한 위통증 및 장통증에는 사용하지 않는다.
- 졸림가-엘리스증후군(ZES) 또는 병적인 위산과다 환자에게 장기간 투여시 자열상증 또는 무위산증에 의해 비타민 B12(cyanocobalamin) 흡수장애가 나타날 가능성이 있다.
- 헬리코박터 필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법으로 이 약과 같이 투여하는 항균제의 사용설명서를 참조해야 한다.
- 일부 해외 역학연구에서 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료가 고관절, 손목 및 척추 골질의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었다. 골질의 위험은 권장용량을 상회하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기사 용 환자에서 증가되었다.
- 3개월 이상 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에게서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났다. 대부분의 환자들에게 저마그네슘혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요하다. 장기간 치료가 필요하거나 디곡신 또는 저마그네슘혈증을 유발하는 약물(예, 이뇨제)을 병용투여하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주기적 마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 감각, 부정맥, 발작을 포함한다.
- 프로톤펌프억제제로 인해 위내 산도가 감소하면 위장관에 보통 존재하는 세균의 수가 증가한다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리듬 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할 수 있다. 이것은 클 로스트리디움 디피실레균성 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. 클로스트리디움 디피실 레균성 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.
- 적절한 치료 후에도 증상이 지속되는 경우에는 추가적인 조사가 고려되어야 한다.
- 어지럼이나 시력장애같은 이상반응이 나타날 수 있으며 그러한 경우 반응하는 능력이 떨어질 수 있다.
- 건강한 지원자에게 오메프라졸(40 mg 1일 1회 투여)과 아타자나버 300 mg/리토나버 100 mg을 병용투여 했을 때 아타자나버의 노출이 감소했으며(AUC, Cmax, Cmin이 약 75 % 감소), 혹은 란소프라졸(60 mg, 일회용량)과 아타자나버 400 mg 을 병용투여 했을 때 아타자나버의 생체이용율이 상당히 감소했다. 아타자나버의 흡수는 pH에 의하여 변한다. 그러므로 판토프라졸을 포함하는 프로톤 펌프 저해제들은 아타자나버 및 넬피나버와 병용투여할 수 없다. 프로톤펌프억제제 (Proton Pump Inhibitor)와 병용투여시 이 두 약물(아타자나버, 넬피나버)의 혈장농도가 감소하며 그 결과로 치료효과와 손실과 약물내성이 나타날 수 있다.
- 건강한 지원자에게 이 약과 클로피도그렐을 병용투여시 클로피도그렐활성대사체나 클로피도그렐에 의해 유도된 혈소판억제작용에 대한 노출에 대해 임상적으로 중요한 영향은 없다.
- 프로톤 펌프 억제제(Proton Pump Inhibitor)를 투여중인 환자에서 tetrahydrocannabinol(THC)에 대한 소변선별검사서서 위양성판정이 있었다. 양성결과를 증명하기 위한 확실한 대체 방법이 고려되어야 할 것이다.
- 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토크레세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크레세이트의 「사용상의 주의사항」 참조)와 프로톤펌프 억제제를 병용하는 경우 메토크레 세이트 그리고/또는 그 대사체인 하도록시메토크레세이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토크레세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토크레세이트와 프로톤펌프 억제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수 행되지 않았다(「3. 일반적 주의」 참조).
- 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제병용요법 : 클래리트로마이신 및/또는 에리트로마이신을 피모지드와 병용 투여시 심부정맥(QT연장, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes포함)이 나타나고 이는 클래리트로마이신 및 에리트로마 이신에 의해 이들 약물의 간대사가 방해를 받기 때문인 것으로 외국의시판후 조사결과 보고되었으며 치명적인 사례도 보고되었다.

4. 상호작용

- 이 약물은 생체이용률이 pH에 의하여 변하는 약물(예, 케토코나졸, 암피실린에스테르, 철분제제)의 흡수를 감소 또는 증가시킬 수 있다.
- 이 약물은 CYP-450 효소계를 통해 간에서 대사되므로, 간에서 CYP-450 효소계를 거쳐 대사는하는 다른 약물과의 상호작용에 주의하여야 한다. 그러나 다음과 같은 약물과의 유의할 만한 임상적 상호작용은 없었다. : 디아제팜, 와르파린, 테오필 린, 페니토인, 디곡신, 안티피린, 니페디핀, 페노프로카민, 디글로페낙, 카르바마제핀, 카페인, 에탄올, 글리벤클라미드, 메토프롤롤, 경구용피임제, 제산제, 나프록센, 피록시캄
- 임상적 약동학 자료에서 펜프로카우론 이나 와르파린의 병용투여시의 상호작용은 없었으나, 시판 후 조사 기간 동안 INR(International Normalized Ratio)수치에 변화를 보인 몇몇의 사례가 있었다. 프로트롬빈시간/INR 의 증가는 비정상적 출 혈, 심지어 사망까지 초래할 수 있다. 그러므로 쿠마린계 항응고제를 병용하고 있는 환자에서 이 약의 사용을 개시 혹은 종료시점 이후, 혹은 비정기적으로 프로트롬빈시간/INR 을 모니터링 할 것을 권장한다.
- 건강한 지원자에게 오메프라졸(40 mg 1일 1회 투여)과 아타자나버 300 mg/리토나버 100 mg을 병용투여 했을 때 아타자나버의 노출이 감소했으며(AUC, Cmax, Cmin이 약 75 % 감소), 혹은 란소프라졸(60 mg, 일회용량)과 아타자나버 400 mg 을 병용투여 했을 때 아타자나버의 생체이용율이 상당히 감소했다. 아타자나버의 흡수는 pH에 의하여 변한다. 그러므로 판토프라졸을 포함하는 프로톤 펌프 저해제들은 아타자나버 및 넬피나버와 병용투여할 수 없다. 프로톤펌프억제제 (Proton Pump Inhibitor)와 병용투여시 이 두 약물(아타자나버, 넬피나버)의 혈장농도가 감소하며 그 결과로 치료효과와 손실과 약물내성이 나타날 수 있다.
- 건강한 지원자에게 이 약과 클로피도그렐을 병용투여시 클로피도그렐활성대사체나 클로피도그렐에 의해 유도된 혈소판억제작용에 대한 노출에 대해 임상적으로 중요한 영향은 없다.
- 프로톤 펌프 억제제(Proton Pump Inhibitor)를 투여중인 환자에서 tetrahydrocannabinol(THC)에 대한 소변선별검사서서 위양성판정이 있었다. 양성결과를 증명하기 위한 확실한 대체 방법이 고려되어야 할 것이다.
- 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토크레세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크레세이트의 「사용상의 주의사항」 참조)와 프로톤펌프 억제제를 병용하는 경우 메토크레 세이트 그리고/또는 그 대사체인 하도록시메토크레세이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토크레세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토크레세이트와 프로톤펌프 억제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수 행되지 않았다(「3. 일반적 주의」 참조).
- 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제병용요법 : 클래리트로마이신 및/또는 에리트로마이신을 피모지드와 병용 투여시 심부정맥(QT연장, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes포함)이 나타나고 이는 클래리트로마이신 및 에리트로마 이신에 의해 이들 약물의 간대사가 방해를 받기 때문인 것으로 외국의시판후 조사결과 보고되었으며 치명적인 사례도 보고되었다.

5. 일부 및 수유부예의 투여

- 이 약은 젖트 양컷을 이용한 수유는 및 일반생식독성 시험의 고용량(450 mg/kg/day)에서 분만지연 및 출생자의 사망을 증가와 성정지연이 나타났으며 주산, 수유기 시험의 10 mg/kg/day이상 투여군에서 출생자의 출생후 체중감소가 나타났 으므로 임신초기 3개월간은 투여하지 않으며 그 외 기간에도 치료상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 동물 생식연구에서는 5 mg/kg이상의 용량에서 약한 태자독성의 증상이 관찰되었다.
- 이 약은 동물실험에서 유즙으로 분비되었으며 사람에게서 모유로 이행된다고 보고되었다. 따라서 수유중인 여성에게 투여하지 않는다.

6. 소아에 대한 투여

18세 이하의 청소년 및 소아에 투여경험이 충분하지 않다.

7. 과량투여시의 처치

인체를 대상으로 한 과량투여시의 증상에 대하여는 알려진 바가 없으나 판토프라졸 240 mg을 2보간 정맥주사 하여도 이상반응은 없었다. 과량투여로 인하여 중독증상이 나타나는 경우에는 대증요법을 실시한다.

8. 적응상의 주의사항

이 약을 복용할 때는 씹거나 부수지 말고 그대로 복용할 것.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

10. 기타

실험동물 랫트를 이용한 발암성실험(2년)에서 이 약에 기인한 위종양, 간세포선종 및 암종(50 mg/kg/day이상), 갑상선여포성 세포종양(200 mg/kg/day)병변이 관찰되었다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 28정

【소비자 상담 창구】 제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오. TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : http://www.hanlim.com

【반품 및 교환】 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업 자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2013. 01. 15)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '06. 01. 09
설명서 개정년월일 : '13. 01. 15
제품의 사용기한은 외부용기에 표기
P32304-07

제조·판매원
 **한림제약주식회사**
공장:경기도 용인시 처인구 영문로 2-27(유방동)
http://www.hanlim.com