



Description				Date: 08 Apr 24		Time: 20:50	
Lyrica_50mg_25mg_75mg_150mg_300mg_30_PP OUTSERT LYRICA 25/50/75/150/300mg KR							
Component Type	Leaflet	Site Barcode/DataMatrix	PAA223709	No. of colours	1	Page Count	1 of 2
Affiliate Item Code	3443424	Viatrix SAP No.	400567886;400567887;400568853;400568854;400568855	Colours	Black		
Superseded Affiliate Item Code	2968260	Vendor Job No.	120110649/0020	Non-Print Colours	Keyline		
TrackWise/GLAMS Job No.	3443424	Artwork Proof No.	1	Equate CMYK with			
MA No.	24, 25, 26, 27,28	Client Market	South Korea				
Supplier SAP No.	N/A	Barcode Info	N/A				
New Supplier Code	PAA223709	3D Render ID	N/A	Main Font	Gulim	Body Text Size	7 pt
Superseded Supplier Code	PAA202350			Dimensions	157 x 585 mm	Min Text Size used	7 pt
Packing Site/Printer	Pfizer Manufacturing Freiburg (Freiburg - DE)			Keyline/Drawing No.	003000009454_2_585 x 157_head to feet		
Sign-offs							
V3 MAY 2023							

전문 의약품

크레아티닌 클리어런스 (CrCl ₂), (mL/min)	시차용량 (mg/일)	최대용량 (mg/일)	투여방법
≥60	150	600	BID or TID
≥30 < 60	75	300	BID or TID
≥15 < 30	25-50	150	QD or BID
< 15	25	75	QD

혈액투석 이후의 용량 추가

25	100	단회용량 ^b
----	-----	-------------------

QD = 1일 총 투여량을 3회로 나누어 투여
 BID = 1일 총 투여량을 2회로 나누어 투여
 QD = 1일 1회 투여
 * 1일 총 투여용량 (mg/일)은 투여방법에 명시된 바와 같이 나누어서 투여하여야 한다.
 * 추가 용량은 단위로 추가 투여되는 용량을 말한다.

3. 간기능 장애환자

간기능 장애환자에서의 영양소정은 필요치 않다.

7. 소아 및 청소년 환자

만 12세 미만의 소아와 만 12-17세의 청소년 환자에 대하여 안전성 및 유효성 자료가 충분하지 않으므로, 투여는 권장되지 않는다.

3. 고령자 (만 65세 이상)

신기능이 저하된 고령자의 경우에는, 용량 감소가 필요할 수도 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- (1) 항뇌전증약을 복용한 환자에서 자살충동 또는 자살행동을 보이는 위험성이 증가되었으므로 항뇌전증약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 등은 악의 및 기분과 행동의 비정상적 변화에 대하여 모니터링되어야 함은 정돈은 그 자체가 이한 및 사함, 자살기간 등인의 자살충동과 자살행동의 위험성증가와 관련된다. 따라서 처방자는 항뇌전증약 처방 시 환자의 자살기간 동안 자살충동 또는 자살행동과 치료될 질병간의 연관성 유무 및 악의 위험성을 함께 고려한다

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 당뇨병환자: 최근 프레가발린의 투여로 체중이 증가된 당뇨병환자는 혈당강하제의 용량 조절이 필요할 수 있다.

[illegible]

아래의 표에 기재된 이상반응은 기저질환 및/혹은 병용약물과 연관되어 나타날 수도 있다.

[표 2] 임상시험 경험에서의 이상반응

관개(SOC)	이상반응
관개	
흔하지 않게	코인두염
혈액 및 림프계	
흔하지 않게	중성구감소증
대사 및 영양	
흔하게	식욕증가
흔하지 않게	식욕부진, 지혈당
정신신경	
흔하게	혼돈, 방향감각장애, 자각과민성, 우울, 다행감, 성욕감소, 불면증
흔하지 않게	이인증, 섬망이상증, 안청부증, 초조, 기분불호, 감정저하, 감정성숙, 적절한 용어 찾기 어려움, 환각, 비정상적인 꿈, 성욕감소
드물게	공황발작, 억제불능, 무감동
신경계	
매우 흔하게	어지러움, 졸음
흔하게	삼진, 혼동증, 오시상, 평형장애, 기억상실, 주의력 장애, 기억력 장애, 떨림, 구명장애, 감각이상, 감각저하, 진전, 졸음증
흔하지 않게	인지력장애, 안구진동, 언어장애, 간대성근경련, 반사저하, 동음이상, 정신운동성 과민, 체위성어지러움, 자각과민, 적열감, 활동불능, 실신
드물게	혼미, 혼동저하증, 후각이상, 미각소실, 팔기장애
눈	
흔하게	시야흐림, 복시
흔하지 않게	간접시 상실(주비력상실), 시야장애, 시야결손, 광시증, 안구건조, 안구충창, 시력감소, 안구통증, 눈피로, 눈물분비증가, 안구자극
드물게	안동, 진동시, 시야의 심도인식 변화, 사시, 시야 밝음(brightness)
귀 및 미로	
흔하게	현훈
흔하지 않게	청각과민증
심장계	
흔하지 않게	1도 병실차단, 빈맥, 동성서맥
드물게	동성빈맥, 동성부정맥
혈관계	
흔하지 않게	지혈당, 고혈압, 흉조, 안면홍조, 말초 냉증
호흡기계	
흔하지 않게	호흡곤란, 비출혈, 기침, 비출혈, 비염, 코골이
드물게	인후건조, 비강건조
알수 없음	어지러움, 어지럼
소화기계	
흔하게	구토, 복부팽만, 변비, 구강건조, 고창(방귀)
흔하지 않게	타액분비과다, 역류성식도염, 구강감각 저하
드물게	복수, 연하곤란, 회절염
피부 및 피하조직	
흔하지 않게	발한, 구진상 발진, 두드러기
드물게	식은증

흔하게	근육계통, 관절통, 등통증, 사지통증, 지각결부결련
흔하지 않게	관절종창, 근육통, 근육육색, 목의 통증, 근육경직
드물게	황문근공해
신장 및 비뇨기계	
흔하지 않게	배뇨장애, 요실금
드물게	요관수, 신부전
생식계 및 유방	
흔하지 않게	발기부전, 사정지연, 생기능장애, 월경통
드물게	무월경, 유방통, 유방부전열, 유방비대
전신이상 및 투여 부위	
흔하게	말초부종, 부종, 보형이상, 냉어짐, 취한느낌, 느긋이감, 피로
흔하지 않게	충부조임감, 전신부종, 통증, 발열, 오한, 무력, 갈증
검사	
흔하게	체중증가
흔하지 않게	알라닌 아미노트랜스퍼라제(ALT) 증가, 혈중 크레아틴 포스파티나제 증가, 아스파티이트 아미노트랜스퍼라제(AST) 증가, 혈당 증가, 혈소판 수지 감소, 혈청 칼륨 감소, 체중감소
드물게	혈중 아미노산 증가, 백혈구 수치 감소

이 시간 후 조사에서 나타난 이상반응

(1) 국외의 시간 경험

연역적: 흔하지 않게; 과민성, 드물게; 혈관경직, 알레르기 반응
선경적: 매우 흔하게; 두통, 흔하지 않게; 의식 소실, 정신 장애
는: 드물게; 각막염

이상: 드물게; 출혈성 심부전

호흡기계: 드물게; 폐부종

소화기계: 흔하게; 구역, 설사, 드물게; 허부종

피부 및 미피조직: 흔하지 않게; 안면 부종, 가려움, 드물게; 스티븐스-존슨 증후군

생식피로피로상해

신장 및 비뇨기계: 드물게; 요지류

생식기 및 유방: 드물게; 여성형 유방증

정신이상 및 현상보와: 흔하지 않게; 골다

도보멸의 소크, 이나발락스의 유사 종상, 피부정착악인종후군(스티븐스-존스 종후군) 다형성인 나비상 소크 있으므로 잘 관찰하고, 이성이 확인되는 경우에는 두마리를 중치하고 이마를 잘라내기를 취한다.

(2) 국내 사마귀 종 조사 결과

국내에서 재조사를 위하여 6년 동안 3,926마리를 대상으로 실시한 사육생적조작 결과 국내 사마귀 종상 관료인 배재현 박한울은 4,966(195/3,926명, 262/220)로 보고되었고, 이 중 1) 악과 악과반계를 배제한 후 소크 있는 악물유해반종 발현율은 4.30%(169/3,926명, 22/220)이었다. 출몰이 1.73%(68/3,926명, 68/220) 가장 많았고, 이자리털 1.71%(67/3,926명, 67/220), 구근정착 0.53%(21/3,926명, 21/220), 부종 0.31%(12/3,926명, 12/220), 탈피 0.18%(7/3,926명, 7/220), 구두, 말초종괴 각각 0.13%(5/3,926명, 5/220), 열원 결원악각 각각 0.14%(9/3,926명, 4/220)으로 나타났다. 그 밖에 0.1% 미만으로 보고된 악물유해반종을 기록할로 분류하면 다음과 같다.

전신: 피로, 무력, 보행상실

정신적: 성격갈소, 수면장애, 불면증

장기계: 중독갈소, 구아염증, 감각이상, 기악적장애, 조의적 장애

소화기계: 배변, 위장장애, 혈변

신장 및 비뇨기계: BUN강조, 요실금, 요과배관



9AA223709

PAA223709



리리카[®] 캡슐
프레가발린



