

필수아미노산 · 비타민보급 아우스민 캡슐

[원료약품 및 분량] 1캡슐 440mg 중

DL-메티오닌(KP)	9.2mg
L-류신(KP)	9.15mg
L-발린(KP)	5mg
L-이소류신(KP)	5mg
L-트레오닌(KP)	5mg
L-트립토판(KP)	5mg
L-페닐알라닌(KP)	5mg
L-리신염산염(KP)	25mg
레티놀팔미테이트(KP)	1,000 I.U
에르고칼시페롤(KP)	100 I.U
초산토코페롤50%(KPC)	10mg
티아민질산염(KP)	2.5mg
리보플라빈(KP)	1.5mg
니코틴산아미드(KP)	10mg
피리독신염산염(KP)	5mg
판토텐산칼슘(KP)	2.5mg
시아노코발라민(KP)	0.5μg
폴산(KP)	100μg
아스코르브산(KP)	25mg

첨가제(식약청인정타르색소) : 황색5호, 황색4호, 청색1호, 적색4호

[성 상] 황색, 적색, 녹색의 과립을 함유한 상부 투명적색, 하부 투명노란색의 경질캡슐제

[효능 · 효과]

자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후 발열성 소모성 질환, 임신 · 수유기 등의 영양보급

[용법 · 용량] 15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2캡슐을 1일 1~2회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 I.U 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성 있는 여성에게는 비타민 A를 1일 5,000 I.U 이상 투여하지 않는다.(비타민A결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis), 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
- 3) 3개월 미만의 영아

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약물을 복용하지 말 것.

레보도파

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 12개월 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 고수산요증(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 1일 10,000 I.U 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 농형뇌(莖型腦, hindbrain : 배아발생초기 신경

관의 내강이 확장되어 형성되는 부분) 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게 투여할 경우는 용법·용량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 1일 5,000 I.U 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 구역, 구토, 설사, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 묽은 변, 위부 팽만감, 배가 거북함, 변비, 발진, 발적, 식욕부진 등
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 에스트로겐이 포함된 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다
 - 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5000 I.U 이상을 넘지 않도록 한다.
 - 4) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다
 - 5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - 6) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
8. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 90캡슐, 90캡슐X2

[제조사] (주)한국코스제약 / 충북 제천시 강제동 253-12

- ※ 의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해보상규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 사항은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.kr>)→정보마당→의약품등 정보를 참조하여 주십시오.

개정연월일 : 10. 05. 03

판매자



광동제약주식회사

경기도 평택시 모곡동 440-2