의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

KGMP 적격업체

전 문 의 약 품

분류번호 : 214

강력한 혈압 강하

뉴로탄정

(로사르탄칼륨)

Newlotan Tab.

■ 원료약품 및 그 분량 1정 중

로사르탄칼륨(Losartan Potassium) (USP) 50.0mg

(로사르탄으로서 45.8mg)

■ 성 상 본제의 단백한 필름코팅정제

■ 효능 · 효과

1. 고혈압
2. 고혈압의 치료요법으로서, 고혈압을 가진 제2형 당뇨병 환자의 신장병

■ 용법 · 용량

이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있지만 매일 같은 시간에 복용할 것을 권장한다.

1. 고혈압

(1) 성인

초회량과 유지량은 로사르탄칼륨으로서 1일 1회 50 mg 경구투여 하는 것이 권장된다. 치료 시작 후 3 ~ 6주 후에 최대 혈압 강하 효과가 나타난다. 치료효과가 불충분한 경우 같은 용량을 1일 2회로 분할 경구투여하거나 필요한 경우 1일 1회 100 mg까지 증량할 수 있다.

(2) 고령자

75세 이상의 고령자에 있어 초회량 조절은 필요하지 않으며, 75세가 넘은 고령자의 경우 초회량은 이 약으로서 1일 1회 25 mg을 권장한다.

(3) 신장애 환자

(1) 크레아티닌청소율 20 ~ 50 mL/min : 초회량 조절은 필요하지 않다.

(2) 크레아티닌청소율 (20 mL/min 과 투석 중인 환자 : 초회량은 이 약으로서 1일 1회 25 mg을 권장한다.

(4) 혈액량 감소에 의해 염분 결핍 환자

혈관내 유효 혈액량 감소(intravascular volume depletion) 가능성이 있는 환자에, 이뇨제 치료중인 환자들)의 초회량은 이 약으로서 1일 1회 25 mg을 권장한다('사용상의 주의사항' 항 참조).

(5) 간장애 환자

간장에 병력 환자들은 소량 투여를 고려해야 한다. 중증 간장애 환자에 투여하지 않는다.

(6) 만 6세 이상의 소아 및 청소년

(1) 체중이 30 kg미상 50 kg 미만인 경우 정제를 삼킴 수 있는 환자

초회용량은 이 약으로서 1일 1회 25 mg이며, 환자의 혈압 반응에 따라 최대 1일 1회 50mg까지 증량할 수 있다.

(2) 체중이 50 kg 이상인 환자

보통 이 약으로서 1일 1회 50 mg이 권장되며, 환자의 혈압 반응에 따라 최대 1일 1회 100 mg까지 증량할 수 있다.

(3) 6세 미만 소아환자 : 투약에 대한 자료가 없다. 따라서 이 환자들에게 투여하지 않는다.

(7) 이 약 단독으로 혈압이 조절되지 않는 경우 다른 고혈압 치료제(예, 저용량의 이뇨제)와 병용투여 할 수 있다. 헥드로클로로티아지드와 병용투여의 상기하였다 나타났다.

2. 고혈압을 가진 제2형 당뇨병 환자의 신장병

보통 이 약으로서 1일 1회 50 mg이 권장된다. 혈압에 따라 1일 1회 100 mg까지 증량할 수 있다. 그러나 과도한 혈압강하의 우려가 있는 환자에게는 초회량으로 25 mg이 권장된다. 이 약은 인슐린, 상용되는 혈압강하제에, 설포닐우레아, 글리리드, 글루코시다아제 억제제 등의 병용 투여에 대한 자료가 있다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있다. 임수과소증의 발생은 태아의 혈청 크레아틴과 혈청 및 골격 기형과 관련이 있을 수 있다. 신생아에게 나타날 가능성이 있는 부작용은 두개골 형성 저하증, 무뇨증, 저혈압, 신부전과 사망 등을 포함한다. 임신이 확인되면 가능한 빨리 이 약을 중단해야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

(1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자

(2) 담부 또는 임산부의 또는 가능성이 있는 여성

(3) 유음의 간장애 환자

(4) 유전성 갈분대사 환자이거나, ACE억제제 혹은 안지오텐신 II 수용체 길항제 치료시 혈관부종의 병력이 있는 환자

(5) 유전성 알도스테론증 환자

(6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose - galactose malabsorption)등의 유전계인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

(1) 고령자

(2) 고혈압혈압 환자 혈액 일부치가 높아지기 쉬운 환자

(3) 중증 ~ 중등도 간장애 환자

(4) 대동맥판 및 승모판 협착증 환자 혹은 폐쇄비대성고혈 환자

(5) 혈액 상장병, 혈액 상장병의 환자, 뇌혈관 장애 환자(심도한 혈압강하는 심근경색이나 뇌혈류 부족으로 인한 뇌혈증을 일으킬 수 있다.)

(6) 혈청내 유효혈액량 감소(혈액량 감소), 이뇨제 투여중인 환자, 염라한 염분제한 환자, 혈액투석중인 환자, 설사 혹은 구토 환자

(7) 유음성 혈관부종 환자의 병력이 있는 환자

(8) 중증의 신장애 환자

4. 이상반응

(1) 이 약은 편대고혈압 성인환자 3,300명 이상을 포함하여 전체 4,068명의 환자/피험자를 대상으로 안전성이 평가되었다. 1,200명 이상의 환자는 6개월 이상 투약받았고, 800명 이상의 환자는 1년 이상 투약받았다. 일반적으로 이 약은 내성이 우수하였다. 전체적인 이상반응 발현율은 설정군과 대조군 사이에 큰 차이가 있었다. 대조임상시험에서 임상적 이상반응으로 인하여 투여를 중단한 경우 로사르탄칼륨의 약 2.3 %인데 비해 위약군의 경우 3.7 % 였다.

(1) 다음 표는 6 ~ 12주 동안 실시한 4건의 위약대조 임상시험에서, 1,000명 이상의 환자는 로사르탄(10 ~ 150 mg)을, 300명 이상은 위약을 투여받았을 때의 이상반응 발현율을 정리한 것이다. 이상반응 발현율은 로사르탄 투약 용량의 변화에 거의 영향을 받지 않았으므로 로사르탄의 용량구분에서 분할하였다. 이 표에서 제시된 이상반응은 로사르탄군의 발현율이 1 % 이상으로서 위약군보다 빈도가 높은 것들이다.

	로사르탄 발현율(%) (n=1,075)	위약 발현율(%) (n=334)
근골격계		
근경련	1	0
요통	2	1
하지통	1	0
정신신경계		
어지럼	3	2
호흡기계		
비충혈	2	1
상기도감염	8	7
부비동염	1	0

(2) 다음 이상반응은 로사르탄군에서 발현율 1 % 이상이었으나 위약군의 발현율이 로사르탄군과 유사하거나 높은 이상반응이다.

- 소화기계 : 구역, 설사, 소화불량
- 정신신경계 : 기면, 불면증, 인두염
- 근골격계 : 근육통
- 정신신경계 : 불면, 두통
- 전신 : 무력감/피로, 흉통, 복통, 홍조

이상반응의 발현율은 성별, 연령, 인종간에 차이가 없었다.

(3) 아스피린, 베니실린에 대해 과민반응 환자에 이 약을 투여하였을 때 입술, 눈꺼풀의 붓은, 얼굴발진 등의 혈관부종으로 인해 투여를 중지하였으나 증지후 3일 이내에 증상은 회복되었다.

(4) 위의 표 외에 임상시험에 소량이 발현된 이상반응은 유형별로 아래와 같다.

- 심혈관계 : 협심증, 빈맥, 기립성 조절 실패
- 신경계통 : 현실증, 간 장실자간, 뇌혈관사고(CVA), 저혈압, 심근경색, 심방세동을 동반하는 부정맥, 심계항진, 동서맥, 빈맥, 심실성 빈맥, 심실세동
- 소화기계 : 식욕부진, 변비, 치통, 구강건조, 장염, 위염, 구토
- 혈액계 : 빈혈
- 대사계 : 통풍
- 근골격계 : 경직통, 고관절부 통증, 관절통증, 무릎통증, 근육통, 어깨 통증, 근강직, 관절통, 관절염, 섬유근통, 근무력
- 정신신경계 : 불안, 불안장애, 혼란, 우울, 악몽, 감각감퍼, 정맥염, 기립저혈압, 현기증, 신경과민, 감각이상, 말초신경병증, 경련증후, 수면장애, 기면, 진전, 이지증
- 호흡기계 : 호흡곤란, 기관지염, 인두통증감, 비출혈, 비염, 호흡기통증, 흉부불쾌감
- 비뇨 · 생식기계 : 빈뇨, 방광염, 혈뇨, 혈단백뇨, 야뇨증, 혈액 요, 혈단백뇨, 발기부전, 월경이상
- 후각감각 : 호르시아, 눈에 작열감 및 자극, 결막염, 마취이상, 이명, 시력저하
- 비뇨기계 : 혈기부전, 야뇨증, 빈뇨, 요도감염

2) ACE억제제를 투여한 고혈압 환자를 대상으로 시험한 결과, 이 약을 투여한 군에서 기침의 발생률은 2건의 평행그룹 이중맹검 무작위, 대조 시험에서 ACE억제제를 투여받아 기침이 유발되었던 환자에게 이 약을 투여하였을 때, 기침 유발에 미치는 영향을 평가하였다. 리시노프릴을 투여받았을 때 ACE억제제로 인한 기침이 유발되었으며 위약을 투여받았을 때는 기침이 나타난 환자들을 이 약 50 mg군, 리시노프릴 20 mg군 그리고 위약군 (n=135)으로 무작위 배정하였다. 이중맹검 기간 8주간 투여하였다. 기침의 발생률은 다음 표와 같다.

	헥드로클로로티아지드	이 약	리시노프릴
기침	25%	17%	69%
임상시험 군[1]	위약	이 약	리시노프릴
기침	35%	29%	62%

[1]인구통계 = (88% 백인, 64% 여성) [2]인구통계 = (90% 백인, 51% 여성)

두 시험결과, ACE억제제로 인해 기침이 유발되었던 환자에게 이 약을 투여하였을 때 기침의 재발률은 헥드로클로로티아지드 혹은 위약과 유사하였다. 양성 재유발률 비동하여 기침은 이 약의 시판 후 조사에서 보고되었다.

3) 간기능 검사

소아 환자에서 나타난 이상반응 프로필과 이전에 보고된 성인 환자의 이상반응 프로필을 비교한 결과 유의한 차이는 없었다.

4) 좌심실 비대를 가진 고혈압 환자

좌심실 비대를 가진 고혈압 환자를 대상으로 로사르탄이나 아테놀롤을 투여하였을 때 심혈관계에 대한 영향을 알아보기 위한 장기 임상시험 (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension, LIFE study)에서 나타난 이 약에 대한 이상반응은 이전에 고혈압 환자에서 보고되었던 이상반응과 유사하였다.

5) 고혈압을 가진 제2형 당뇨병 환자의 신장병

이 약의 안전성 및 유효성은 이 약에 의한 인슐린-비의존성 당뇨병의 평가항목의 감소를 연구한 시험 (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Receptor Antagonist Losartan, RENAAL study)에서 1,513명의 환자가 이 약 혹은 위약을 투여 받았으며, 상기 임상시험에서 보고된 이상반응은 발생률은 두 군간 차이가 없었다. 이상반응으로 인해서 투여를 중단한 비율은 로사르탄(설정군 19 %, 위약군 24 %) 이 약은 일반적으로 내약성이 우수하였다. 투여 약은 관련없과 관계없이 이 약을 투여 받은 환자의 4 % 이상에서 보고되었으며 위약군보다 더 빈번하게 보고된 이상반응은 다음 표와 같으며, 이들은 중증의 혈압강하제를 함께 투여 받았다.

	이 약과 동격의 혈압강하제 투여 % (n=751)	위약과 동격의 혈압강하제 투여 % (n=762)
전신		
무력/피로	14	10
흉통	4	8
낙병	3	4
감염	5	4
인플루엔자양 질환	10	9
외상	4	3
심혈관계		
저혈압	7	3
기립저혈압	3	1
소화기계		
설사	15	10
소화불량	4	3
위염	4	3
내분비계		
당뇨병성 산증	4	3
당뇨병성 혈관질환	10	9
눈, 귀, 코, 인후		
백내장	7	5
부비동염	6	5
혈액계		
빈혈	14	11
대사계/영양계		
고칼륨혈증	7	3
저혈당증	14	10
체중증가	4	3
근골격계		
요통	12	10
하지통	4	4
무릎통	5	4
근무력	7	4
신경계		
감각감퍼	5	4
호흡기계		
기관지염	10	9
기침	11	10
피부계		
홍소병	7	6
비뇨기계		
요도감염	16	13

6) 다음의 이상반응들이 시판 후에 추가로 보고되었다.

(1) 과민반응 : 혈관부종(안드로 폐세를 이기할 수 있는 호도성분은 포함), 얼굴/입술/인후/혀의 붓음이 이 약을 투여받은 환자에서 드물게 보고되었으며, 이들 이상반응을 보인 환자중 일부는 이전에 ACE억제제를 투여 받았을 때에도 혈관부종을 경험한 적이 있었다. 혈관염(Henoch- Schönlein 자반병)이 보고된 적이 있다. 또한 아나필락시스모양 증후군(불쾌감, 구강이상 느낌, 발한, 두드러기, 호흡 곤란, 전신 홍조, 부종 등)이 증상으로 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 한다.

(2) 소화기계 : 간기능 이상, 드물게 간염

(3) 전신 및 투여부위 : 권태

(4) 혈액계 : 빈혈, 드물게 혈소판 감소증

(5) 근골격계 : 드물게 근육통, 근육이완기능이상에 (CK) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 횡문근융해가 드물게 보고되었으며 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 치료를 한다. 또한 횡문근융해에 의한 급성 신부전의 발병에 주의한다.

(6) 신경계 : 미각이상

(7) 호흡기계 : 마른기침

(8) 피부 : 홍색피부증

(9) 대사 및 영양: 고칼륨혈증 및 저나트륨혈증이 이 단독복제를 투여받은 환자에서 보고된 적이 있다. 또한 심각한 고칼륨혈증 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다.

(7) ALT 의 상승이 드물게 일어나며, 투여 중단시 대개 없어진다.

(8) 대조임상시험에서 이 약에 의해 보준검사시간 임상적으로 중요한 정도로 변동된 사례는 드물게 발생했다.

(1) 크레아티닌, BUN : 이 약을 단독투여받은 편대고혈압 환자 중 0.1 % 미만에서 BUN 또는 혈청 크레아티닌치가 약간 증가하였다.

(2) 헤모글로빈 및 헤마토크리트치 : 이 약을 단독투여한 환자중 소수에서 헤모글로빈 및 헤마토크리트치가 약간(각각 0.11 %, 0.09 vol%) 감소하였으나 임상적 유의성은 없었다. 빈혈로 인하여 투여를 중단한 예는 없었다.

(3) 간기능 검사 : 간효소 (간염 및 담관기능 일치 부위)의 대폭적 상승이다. 이 약을 단독복용한 편대고혈압 환자중 1명 (0.1 %)은 간기능 장애에 이상으로 투여를 중단하였다.

9) 심신, 의식상실 : 혈압강하에 동반하는 일과성 소드증상이 나타날 수 있으므로 주의할 것을 권고한다. 차기운 느낌, 근통, 의식소실 및 피로 증상이 나타날 수 있으므로 주의할 것을 환자에게 설명할 필요가 있다. 특히 혈액 투석 환자에 있어서 혈압이 많이 떨어질 경우에 투여중단 여부에 대한 신중한 판단을 한다. 또한 심부전 환자의 경우에도 혈압의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 한다.

10) 급성 간염, 전격성 간염이 나타날 수 있으므로 중증의 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

11) 시력장이 나타날 수 있으므로 주의한다.

12) 급성심근 기저수 및 방광염 등의 부정맥이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다.

13) 저혈압(당뇨병 치료중인 환자에서 나타나기 쉬움)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 우선 환자를 안정시킨 후 필요한 처치를 한다.

5. 일반적 주의

(1) 간장애증 환자의 혈장 로사르탄 농도가 현저히 상승되었다는 보고가 있으므로, 간기능 장애가 있는 환자들은 소량 투여를 고려한다.

(2) 인지오염선 II 수용체 길항제 투여 중 드물게 심각한 간장애가 나타났다는 보고가 있다.

(3) 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 대한 영향의 결과, 신부전을 포함한 신기능의 변화가 보고되었다. 이러한 신기능의 변화는 특히 신기능 장애군에 해당되었다.

신기능 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 의존적인 환자의 경우에, 중증증의 유혈성부전 환자), ACE억제제를 투여하였을 때, 빈뇨 및/혹은 진행성 질소혈증이 보고되었으며, (드물게) 급성 신부전 및/혹은 사망이 보고되었다. 유사한 결과가 이 약을 투여한 환자에서도 보고되었다.

ACE억제제 및 혈관부종 혈흑성 신장병 병력을 가진 환자들의 혈장 요소와 혈청 크레아티닌 치를 상승시킬 수 있다고 보고되었다. 이 약을 투여한 환자에서도 유사한 결과가 보고되었다. 이는 투여 중단 시 회복되었다. 또한 이들 환자군에서 신혈류량의 감소와 사구체 여과 압의 저하에 의해 급속히 신기능을 악화시킬 우려가 있고, 치료하기 힘들 수 있다.

중증의 심부전 환자 혹은 기저 신장병 환자(예, 신동맥 협착증)에 있어서 혈청 요소 및 혈청 크레아틴치 일시적 상승이 나타날 수 있으므로 혈청 크레아티닌이 2.5 mg/dL 이상의 경우에는 투여중증을 하는 등 신중히 투여한다.

(4) 혈액량 불감증은 당뇨병 성인 환자에서 빈번히 나타나기 때문에 이 약을 투여하기 전에 혈액량을 보충하는 것이 좋다.

(5) 이 약은 이뇨제 (특히, 치료 시작 용량 증량시) 일과성의 혈압강하(쇼크증상, 의식상실, 호흡곤란 등을 동반)를 일으킬 수 있으므로 그러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 특히, 혈관내 유효혈액량 감소 환자('다음 환자에는 신중히 투여할 것 : 혈액량이 부족 환자')에 대한 신중한 주의가 필요하다.

(6) 혈청 칼륨에 대한 영향

혈청 칼륨농도에 영향을 미치는 다른 약물과 마찬가지로 이 약의 투여중에는 정기적으로 혈액검사를 실시하는 것이 좋다.

(7) 신부전 유무와 상관없이 심부전 환자에서 중증의 저혈압이나 신부전(주로 급성)을 일으킬 우려가 있다. 중증의 신부전을 가진 심부전 환자, 중증의 심부전 환자(NYHA class IV), 심부전 및 생명을 위협하는 심부전에서 가진 환자들에서 이 약을 투여한 일부 환자에서 혈청 크레아틴 농도 및 혈중칼륨에 이 약 투여에 주의해야 한다.

(8) 고혈압과 단백뇨를 동반하는 2형 당뇨병에서의 당뇨병 신증에 대해 이 약을 투여하는 경우, 혈청 크레아티닌이 이전 검사치와 비교하여 30 %(또는 1 mg/dL)이상 증가하는 경우 및 신기능장애의 진전속도가 나타나는 경우에는 감량 혹은 투여중지를 고려한다.

(9) 수술 24시간 투여하지 않는 것이 바람직하다.

(10) 2형 당뇨병에서의 당뇨병성 신증 환자는 빈혈이 나타나기 쉬우므로 이 약의 투여중에는 정기적으로 혈액검사를 실시하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 빈혈의 원인을 고려하여 적절한 처치를 한다.

(11) 이 약은 신장이 손상되어 대동맥판협착증 환자에 투여하지 않는다.

(12) 폐쇄고혈압 환자에 대한 임상경험이 없다.

(13) 폐쇄고혈압 환자에 대한 임상경험이 없다.

(14) 혈압강하제에 의해 어지럼증, 현기증 등이 나타날 수 있으므로 고소작업, 차량운전 및 기계조작시 주의를 기울여야 한다. 특히 처음 초기나 용량 증량시 주의한다.

6. 상호작용

(1) 헥드로클로로티아지드, 디곡신, 와프파린, 시메티딘, 페노바르비탈 등의 약물과 임상 약동동력적 실험 결과 임상적으로 유의한 약물상호작용은 발견되지 않았다(단, 이 약은 CYP2C9에 의해 부분적으로 대사되기 때문에 CYP2C9 억제제 혹은 유도제와 병용투여 시 이 약의 혈중로사르탄 및 활성대사체의 AUC를 20 % 정도 변화시킬 수 있다). 로사르탄 혹은 로사르탄의 AUC를 18 % 정가시켰으며, 활성대사체에는 영향이 없었다. 이러한 변화는 임상적으로 유의하지 않은 것으로 판단된다. 로사르탄 혹은 로사르탄의 활성대사체의 약동학은 케토코나졸의 동시투여에 의해 영향을 받지 않았다. 로사르탄과 케토코나졸은 상호작용이 없는 것으로 나타났다. 이 약과 플루코나졸의 병용투여 시 이 약의 활성대사체의 혈중농도를 증가시킬 수 있다. 병용시 주의해야 하며, 특히 고령자 혹은 프로필렌글리콜 같은 용기제를 포함한 주의한 경우에는 농도를 약 50 % 상승시키고 로사르탄의 농도는 증가시켰다. 이러한 CYP2C9 억제제의 상해력학 상호작용은 임상적 의미는 없다. 이 약을 활성대사체로 대사되지 않는 CYP2C9에 억제력 활성 강력이 있는 것으로 나타났다. 이 결과를 이 약이 활성대사체로 전환되는데 있어 주요한 역할을 하는 효소는 CYP3A4가 아닌 CYP2C9임을 알 수 있다. 이 약과 ascenicoumarol 및 phenprocoumarin을 비롯한 쿠마린 항응고제의 장재적인 상호작용은 연구된 바 없다.

(2) 인지오텐신 II 수용체 길항제와 다른 약물의 상호작용은 다른 약물의 상호작용 연구에서 관찰되었다. (에르콘리스). 칼륨 보충제, 칼륨을 함유한 염분 대용제, 칼륨 농도를 증가시킬수 있는 약물(예, 헤파린)과의 병용은 혈청 칼륨을 증가시키고 고칼륨혈증을 일으킬 수 있다. 따라서 이 약제의 병용이 권장되지 않는다.

(3) 리튬은 혈청 리튬농도 및 독성의 증가와 관련되어 보고되었다. 이 약과 리튬의 병용투여 시 혈청 리튬농도를 주기적으로 모니터링 해야 한다.

(4) 비스테로이드소염진통제 (NSAID) : 인도메타신 등 NSAID를 투여한 환자에서 비스테로이드소염진통제에 의한 혈압강하효과가 감소될 수 있다. ACE억제제와 같이, 이 NSAID를 투여한 환자에서 비스테로이드소염진통제의 병용은 신기능을 악화, 급성 신부전을 유발시킬 수 있고 혈청 칼륨을 증가시킬 수 있다. 병용시 주의해야 하며, 특히 고령자 혹은 프로필렌글리콜 같은 용기제를 포함한 주의한 경우에는 정기적으로 혈액검사를 실시하는 등 관찰을 충분히 한다.

(5) 니트로 성분에 영향을 미치는 다른 약물과 마찬가지로, 이 약 투여시 리튬제설에 감소되고 리튬 중독이 나타날 수 있다. 따라서 인지오텐신 II 수용체 길항제와 리튬을 병용시 혈청 내 리튬 농도를 모니터링해야 한다.

(6) 이 약과 혈압강하작용을 일으킬 수 있는 약물(삼환계 항우울제, 항정신병약, 바클로펜, 아미프스틴) 등 병용투여하는 경우 저혈압의 위험이 커질 수 있다.

(7) 항산화화성 물질, 심부전, 또는 중탈기관손상을 동반한 당뇨병 환자에서 레닌-안지오텐신-알도스테론계의 이용차단에, 안지오텐신 II 수용체 길항제 투여시 급성 신부전 등 신기능 장애가 나타날 수 있다. 고칼륨혈증 및 심부전을 악화시킬 수 있다. 이러한 환자에서 이 약을 투여하는 경우에는 주기적으로 혈액검사를 실시하는 등 충분히 관찰한다.

(8) 리튬(Lithium) 병용투여 : 리튬과 안지오텐신 II 수용체 길항제 또는 안지오텐신 전환효소 억제제의 병용투여 시 리튬의 혈청농도 증가 및 독성 증가가 보고되었다. 따라서 이 약제와 리튬의 병용투여는 권장하지 않는다. 병용투여가 필수적인 경우에는 혈청 리튬농도를 주의깊게 모니터링 하는 것이 권장된다.

(9) 이 약은 CYP2C9에 의해 대사되므로 CYP2C9 억제제 또는 유도제와 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화될 수 있다.

(10) 이 약은 CYP3A4에 의해 대사되지 않으며 CYP3A4 억제제 또는 유도제와 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않는다.

(11) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 증가되었다. 그러나 활성대사체의 혈중농도는 변화되지 않았다.

(12) 이 약은 CYP3A4 억제제인 케토코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(13) 이 약은 CYP3A4 억제제인 에리스로마이신과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(14) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(15) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(16) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(17) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(18) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(19) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(20) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(21) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(22) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(23) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(24) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(25) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(26) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(27) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(28) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(29) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(30) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(31) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(32) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(33) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(34) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(35) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(36) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(37) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(38) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(39) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(40) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(41) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(42) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(43) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(44) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(45) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(46) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(47) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(48) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(49) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(50) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(51) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(52) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(53) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(54) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(55) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(56) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(57) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(58) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(59) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(60) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(61) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(62) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(63) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(64) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(65) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(66) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(67) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(68) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(69) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(70) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(71) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(72) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(73) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(74) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(75) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(76) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(77) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(78) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(79) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(80) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(81) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(82) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(83) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(84) 이 약은 CYP2C9 억제제인 설파페나졸과 병용투여 시 로사르탄의 혈중농도가 변화되지 않았다.

(85) 이 약은 CYP2C9 억제제인 플루코나졸과 병용투여 시 로사르탄의