

카비드®

일반의약품

분류번호

321 칼슘제

추어불정

Ca 500 mg / Vitamin D 400 IU

[원료약품 및 분량]

이 약 1정 중

- 유효성분: 탄산칼슘(EP).....1250mg
(칼슘으로서 500mg)
· 농축콜레칼시페롤분말(EP).....4mg
(콜레칼시페롤로서 400IU)
- 기타 첨가제: 레몬향과립, 수크랄로스, 스테아린산마그네슘, 자일라톨, 포비돈

[성상] 흰색의 가운뎃가 불룩한 원형의 추어불 정**[용법·용량]** 성인 및 만 8세 이상: 1일 1회 1~2정
만 3세 이상~만 8세 미만: 1일 1회 1/2~1정
입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.

[효능·효과]

- 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급
- 다음 경우의 비타민 D 보급: 임신, 수유기, 발육기, 노년기
이 약에 함유된 비타민 D 등의 효능 효과는 다음과 같다.
- 뼈, 이의 발육보강, 구루병의 예방

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

- 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하세요.
- 사용전에 첨부문서를 읽고 의약품과 함께 보관하세요.
- 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마세요.

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아: 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감시배당체를 투여 중인 환자
- 9) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관**[포장단위]** 30정/병, 60정/병

[비고]

- 구입시 사용기한이 지나거나 변질·변해·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- 첨부문서 개정년월일 이후 최신의 품목 신고사항은 식품의약품안전처 온라인약도서관 ([http:// drug.mfds.go.kr](http://drug.mfds.go.kr)) 참조하세요.
- 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6233)

[제조사] Takeda Takeda AS

Drammensveien 852, NO-1383 Asker, Norway

[수입자] Takeda 한국다케다제약주식회사

서울특별시 강남구 테헤란로98길 8, 9층, 12층 (대치동)

제품문의처 02-3484-0800 ※ 개정년월일: 2017년 8월 18일