

안지오텐신 수용체 차단제

카로자정

(로사르탄 칼륨)

KGMP

의약품

214

의약품분류번호

혈압강화제

전문의약품

의약품

214

의약품분류번호

혈압강화제

【성분·함량】1정 중 로사르탄칼륨(USP).....50mg 첨가제(동물유래):유당수화물(소-우유)

【성 상】흰색의 타원형 필름코팅 정제

【효능·효과】1. 고혈압 2. 고혈압의 치료요법으로서, 고혈압을 가진 제2형 당뇨병 환자의 신장(콩팥)병

【용법·용량】이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있지만 매일 같은 시간에 복용할 것을 권장한다.

- 고혈압
 - 성인
 - 초회량(처음 복용량)과 유지량은 로사르탄칼륨으로서 1일 1회 50mg 경구투여(복용) 하는 것이 권장된다. 치료 시작 후 3~6주 후에 최대 혈압 강하 효과가 나타난다. 치료효과가 불충분한 경우 같은 용량을 1일 2회로 분할 경구투여(복용)하거나 필요한 경우 1일 1회 100mg까지 증량(양을 늘림)할 수 있다.
 - 고령자(노인)
 - 75세 이하의 고령자(노인)에 있어 초회량(처음 복용량) 조절은 필요하지 않으며, 75세가 넘는 고령자(노인)의 경우 초회량(처음 복용량)은 이 약으로서 1일 1회 25mg를 권장한다.
 - 신(신장·콩팥)장애 환자
 - (1) 크레아티닌청소율 20~50 mL/min : 초회량(처음 복용량) 조절은 필요하지 않다.
 - (2) 크레아티닌청소율 <20mL/min 과 투석 중인 환자 : 초회량(처음 복용량)은 이 약으로서 1일 1회 25mg를 권장한다.
 - 혈관내 유출 혈액량 감소 환자
 - 혈관내 유출 혈액량 감소(Intravascular volume depletion) 가능성이 있는 환자(예, 이노제로 치료중인 환자들)의 초회량(처음 복용량)은 이 약으로서 1일 1회 25mg를 권장한다(‘사용상의 주의사항’항 참조).
 - 간장애 환자
 - 간장애 병력 환자들은 소량 투여를 고려해야 한다. 중증(심한 증상) 간장애 환자에게 투여하지 않는다.
 - 만 6세 이상의 소아 및 청소년
 - 추천용량은 이 약으로서 1일 1회 25mg이며, 환자의 혈압 반응에 따라 최대 1일 1회 50mg까지 증량(양을 늘림)할 수 있다.
 - (2) 체중이 50kg 이상인 환자
 - 보통 이 약으로서 1일 1회 50mg이 권장되며, 환자의 혈압 반응에 따라 최대 1일 1회 100mg까지 증량(양을 늘림)할 수 있다.
 - (3) 6세 미만 소아환자, 사구체여과율이 30mL/min/1.73㎡ 미만인 소아 환자, 간장애 소아환자에게 권장되지 않는다.
 - 이 약 단독으로 혈압이 조절되지 않는 경우 다른 고혈압 치료제(예, 저용량의 이노제)와 병용(함께 복용)투여 할 수 있다. 히드로를 로티아제나 1일 1회 50mg이다. 혈압에 따라 1일 1회 100mg까지 증량(양을 늘림)할 수 있다. 그러나 과도한 혈압강하의 우려가 있는 환자에게는 초회량(처음 복용량)으로 25mg이 권장된다. 이 약은 만출란, 상용(일시적으로 사용)되는 혈당강화제(예, 설포닐우레아, 글리리돈, 글루코시다아제 억제제)와 병용(함께 복용) 투여할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 임부에게 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있다. 양수과소증의 발생은 태아의 폐 형성 저하증 및 골격 기형과 관련이 있을 수 있다. 신생아에게 나타날 가능성이 있는 부작용은 두개골 형성 저하증, 무도증, 저혈압, 신부전과 사망 등을 포함한다. 임신이 확인되면 가능한 빨리 이 약을 중단해야 한다(7. ‘임부 및 수유부에 대한 주의·항 참조’)
- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 중증의 간장애 환자
 - 유전성 혈관부종 환자이거나, ACE억제제 혹은 안지오텐신 II수용체 차단제 치료시 혈관부종의 병력이 있는 환자
 - 원발고알도스테론증 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. (유당 함유 제제에 한함)
 - 당뇨병이나 중증도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 <60mL/min/1.73㎡)에서 알리스키렌 함유제제와의 병용
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 고령자
 - 고칼륨혈증 환자 혹은 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자
 - 경증~중증도 간장애 환자
 - 대동맥판 및 심모반 협착증 환자 혹은 폐쇄비대성근병 환자
 - 허혈 심장병, 허혈 심장질환 질환, 뇌혈관 장애 환자(과도한 혈압강하는 심근경색이나 뇌혈류 부전으로 인한 뇌졸중을 일으킬 수 있다.)
 - 혈관내 유출혈액량 감소환자(예, 이노제 투여중인 환자, 엄격한 염분제한 환자, 혈액투석중인 환자, 설사 혹은 구토 환자)
 - 양측성 혹은 편측성 신장 협착증이 있는 환자
 - 중증의 신장애 환자
 - 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단 : 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE억제제, 또는 알리스키렌 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.
- 이상반응
 - 이 약은 본태고혈압 성인환자 3,300명 이상을 포함하여 전체 4,058명의 환자/피험자를 대상으로 안전성이 평가되었다. 1,200명 이상의 환자는 6개월 이상 투여받았고, 800명 이상의 환자는 1년 이상 투여받았다. 일반적으로 이 약은 내약성이 우수하였다. 전체적인 이상반응 발현율은 실험군과 대조군 사이에 큰 차이가 없었다. 대조임상시험에서 임상적 이상반응으로 인하여 투여를 중단한 경우는 로사르탄군의 경우 2.3% 였으며, 위약군의 경우 3.7% 였다. (1) 다음 표는 6~12주 동안 실시한 4건의 위약대조 임상시험에서, 1,000명 이상의 피험자는 로사르탄(10~150mg)을, 300명 이상은 위약을 투여받은 환자들 외에 이상반응 발현율을 정리한 것이다. 이상반응 발현율은 로사르탄 투약 용량의 변화에 거의 영향을 받지 않았으므로 로사르탄의 각 용량군에서 보고된 이상반응을 통합정리하였다. 이 표에서 제시된 이상반응은 로사르탄군의 발현율이 1% 이상으로서 위약군보다 빈도가 높은 것들이다.

	로사르탄 발현(드러남률)(n=1,075)	위약(속임약) 발현(드러남률)(n=334)
근(근육)골격계		
근(근육)경련	1	0
요통(허리 통증)	2	1
하지통(다리 통증)	1	0
정신신경계		
어지럼	3	2
호흡기계		
비(코)출혈	2	1
상기도감염	8	7
부비동염	1	0

- 다음 이상반응은 로사르탄군에서 발현율 1% 이상이었으나 위약군의 발현율이 로사르탄군과 유사하거나 높은 이상반응이다.
 - 소화기계 : 구역, 설사, 소화불량
 - 호흡기계 : 기침, 부비동장애, 인두염
 - 근골격계 : 근육통
 - 정신신경계 : 불면, 두통
 - 전신 : 무력/피로, 부종/팽윤, 복통, 흉통

이상반응의 발현율은 남녀, 연령, 인종간에 차이가 없었다.
- 아스피린, 페니실린에 대해 과민반응 환자에서 이 약을 투여하였을 때 알레, 눈꺼풀의 팽윤, 얼굴발진 등의 혈관부종으로 인해 투여를 중지하였으나 중지후 5일 이내에 정상으로 회복되었다.
- 한약의 피험자에서서 손바닥의 얇은 각질이 벗겨지고 발혈현상이 나타났다.
- (5) 임상시험 설계된 이상반응 외에 임상시험중 발현율이 1% 미만이거나 2명 이상의 피험자에서 보고된 이상반응으로서 잠재적으로 중요한 이상반응의 목록은 다음과 같다. 이 이상반응이 투여약과 관련이 있는지의 여부는 확인되지 않았다.
 - 전신 : 열갈부종, 발열, 기립성 고혈, 설신
 - 심혈관계 : 협심증, 2도 발성치단, 뇌혈관사고(CVA), 저혈압, 심근경색, 심방세동을 동반하는 부정맥, 심계항진, 동서맥, 빈맥, 심실성 빈맥, 심실세동
 - 소화기계 : 식욕부진, 변비, 지통, 구강건조, 방귀, 위염, 구토
 - 혈액계 : 빈혈
 - 대사계 : 통풍
 - 근골격계 : 상지통, 고관절부 통증, 관절팽윤, 무릎통증, 근골격 통증, 어깨 통증, 근강직, 관절통, 관절염, 섬유근통, 근무력
 - 정신신경계 : 불안, 불안장애, 운동실조, 혼란, 우울, 약동, 감각강화, 성욕강화, 기억력장애, 편두통, 신경과민, 감각이상, 말초신경병증, 공황장애, 수면장애, 기억, 전진, 어지럼
 - 호흡기 : 호흡곤란, 기관지염, 인두불쾌감, 비출혈, 비염, 호흡기질환, 흉부불쾌감
 - 피부 : 탈모, 모낭염, 피부건조, 반상출혈, 홍반, 홍조, 광민감반응, 가려움, 발진, 발진, 두드러기
 - 특수감각 : 청신시야, 눈에 작열감 및 자동, 결막염, 미각이상, 미염, 시력저하
 - 비뇨기계 : 발기부전, 야뇨증, 빈뇨, 요도감염
- ACE억제제로 인한 지속적인 마른기침이 보고된 바 있으며, 이로 인하여 ACE억제제의 투여를 중단할 수 있다. 2건의 평행그룹, 이 중맹감, 무작위, 대조 시험에서 ACE억제제를 투여받아 기침이 유발되었던 환자에게 이 약을 투여하였을 때, 기침 유발에 미치는 영향을 평가하였다. 라시노프릴을 투여받았을 때 ACE억제제로 인한 기침이 유발되었으며 위약을 투여받았을 때는 기침이 사라진 환자들을 이 약 50mg군, 라시노프릴 20mg군 그리고 위약군 (n=97) 혹은 히드로클로로티아지드군 (n=135)으로 무작위 배정하여 이 이중맹검으로 8주간 투여하였다. 기침의 발생률은 다음 표와 같다.

알성실험 1†	히드로클로로티아지드	이 약	라시노프릴
기 침	25%	17%	69%
	†인구통계=(98% 백인, 64%여성)		‡인구통계=(30% 백인, 51%여성)
기 침	35%	29%	62%

- 두 시험결과, ACE억제제로 인해 기침이 유발되었던 환자에게 이 약을 투여하였을 때 기침의 재발률은 히드로클로로티아지드 혹은 위약과 유사하였다. 양성 재유발을 비롯하여 기침은 이 약의 시판 후 조사에서 보고되었다.
- 소아 환자
 - 소아 환자에서 나타난 이상반응 프로파일과 이전에 보고된 성인 환자의 이상반응 프로파일을 비교한 결과 유의한 차이는 없었다.
 - 좌심실 비대를 가진 고혈압 환자
 - 좌심실 비대인 고혈압 환자를 대상으로 로사르탄이나 아테놀롤을 투여하였을 때 심혈관계에 대한 영향을 알아보기 위한 장기 임상시험(Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension, LIFE study)에서 나타난 이 약에 대한 이상반응은 이전에 고혈압 환자에서 보고되었던 이상반응과 유사하였다.
 - 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병
 - 안지오텐신 II수용체 차단제인 이 약에 의한 인슐린-비의존성 당뇨병의 평가항목의 감소를 연구한 시험(Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Receptor Antagonist Losartan, RENAAL study)에서 1,513명의 환자가 이 약 혹은 위약을 투여 받았으며, 장기 임상시험에서 보고된 이상반응의 발생률은 두 군간 차이가 없었다. 이상반응으로 인하여 투여를 중단한 비율도 유사하여(실험군 19%, 위약군 24%) 이 약은 일반적으로 내약성이 우수하였다. 투여약의 관련성과 관계없이 이 약을 투여 받은 환자의 4% 이상에서 보고되었으며 위약군보다 더 빈번하게 보고된 이상반응은 다음 표와 같으며, 이들은 중래의 혈압강화제를 함께 투여 받았다.

	이 약과 중래의 혈압강화제 투여 % (n=751)	위약(속임약)과 중래의 혈압강화제 투여 % (n=762)
전신(운동)		
무력/피로	14	10
흉통(가슴 통증)	12	8
발열	4	3
감염	5	4
인플루엔자상 징현(임상)감염	10	9
심혈관계		
저혈압	7	3
기립성 저혈압	4	1
호흡기계		
설사	15	10
소화불량	4	3
위염	5	4
대변변화		
당뇨병성 신장증(콩팥)증	4	3
당뇨병성 혈관질환	10	9

뒷면 이어짐>>>

【저장방법 및 유통기간】 기밀용기, 건조(15~30℃)보관 유통기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 300정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의

- 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
- 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



대우제약(주)
부산광역시 사하구 대대로 153 (신명동)
http://www.daewoopharm.com

소비상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831

최종개정년월일:2015. 05. 28
작성년월일:2015. 05. 06

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 5월 6일)이후 변경된 내용은 http://www.daewoopharm.com나 051-204-3831(대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.

는 권 코 인투(목구멍)	7	5
백내장	6	5
혈액계		
빈혈	14	11
대사계/영양계		
고칼륨 혈증	7	3
지혈장애	14	10
체중증가	4	3
근근육골격계		
요통(허리 통증)	12	10
하지통(다리 통증)	5	4
무릎통(통증)	5	4
근근근육력	7	4
신경계		
간지각민	5	4
호흡기계		
기관지염	10	9
기침	11	10
피부계		
만주진염	7	6
비뇨기계		
요도염	16	13

- 다음의 이상반응들이 시판 후에 추가로 보고되었다.
 - (1) 과민반응 : 혈관부종(기도 폐쇄를 야기할 수 있는 후두/성문의 팽윤, 얼굴/입술/인두/혀의 팽윤)이 이 약을 투여받은 환자에서 드물게 보고되었으며, 이들 이상반응을 보인 환자중 일부는 이전에 ACE억제제들의 다른 약물에 대해서도 혈관부종을 경험한 적이 있었다. 혈관염(Henoch-Schönlein 자반병)이 보고된 적이 있다. 또한 아나필락시소이드와 중추성(불쾌감, 구강 이상 느낌, 발한, 두드러기, 호흡 곤란, 전신 홍조, 부종 등)이 증상으로 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 한다.
 - (2) 소화기계 : 간기능 이상, 드물게 간염
 - (3) 전신 및 투여부위 : 권태
 - (4) 혈액계 : 빈혈, 드물게 혈소판 감소증
 - (5) 근골격계 : 근육통, 무력감, 크레아티닌키나아제(CK) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 횡문근융해가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한 횡문근융해에 의한 급성 신부전의 발병에 주의한다.
 - (6) 신경계 : 마각이상
 - (7) 호흡기계 : 마른기침
 - (8) 피부 : 홍색피부증
 - (9) 대사 및 영양 : 고칼륨혈증 및 저나트륨혈증이 이 약 단독제제를 투여받은 환자에서 보고된 적이 있다. 또한 심각한 고칼륨혈증 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다.
- ALT 가 상승이 드물게 일어나며, 투여 중단시 대개 없어진다.
- 대조와 임상시험에서 이 약에 의해 표준점검사기와 임상적으로 유의한 정도로 변동된 사례는 드물게 발생했다.
 - (1) 크레아티닌, BUN : 이 약을 단독투여받은 본태고혈압 환자 중 0.1% 미만에서 BUN 또는 혈청 크레아티닌치가 약간 증가하였다.
 - (2) 헤모글로빈 및 헤마토크리트치 : 이 약을 단독투여한 환자중 소수에서 헤모글로빈 및 헤마토크리트치가 약간(각각 0.11%, 0.09%) 감소하였으나 임상적 유의성은 없었다. 빈혈로 인하여 투여를 중단한 예는 없었다.
 - (3) 간기능 검사 : 간효소 또는 혈청 빌리루빈이 때때로 상승하였다. 이 약을 단독투여한 본태고혈압 환자중 1명(<0.1%)은 간기능 검사치 이상으로 투여를 중단하였다.
- 심신, 의식상상 : 혈압강하에 동반하는 일과성 쇼크증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 차가운 느낌, 구토, 의식소실 등의 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 특히 혈액 투석 중 엄격한 염분 제한요법 중 이노제 혈압 강하제 투여중인 환자에서 저용량에서 투여를 시작하고 증량하는 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 서서히 한다.
- 급성 간염, 전격성 간염이 나타날 수 있으므로 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 신부전이 나타날 수 있다.
- 심실성 기외수축, 심방세동 등의 부정맥이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다.
- 저혈당(당뇨병 치료중인 환자에서 나타나기 쉬움)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 무력감, 공복감, 식은땀, 소변량, 집중력 저하, 경련, 의식장애 등이 나타난 경우 예는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

5. 일반적 주의

- 간경변증 환자의 혈청 로사르탄 농도가 현저히 상승되었다는 보고가 있으므로, 간기능 장애가 있는 환자들은 소량 투여를 고려한다.
- 안지오텐신 II수용체 차단제 투여 중 드물게 간염 등의 심각한 간장애가 나타났다는 보고가 있다.
- 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 대한 영향의 결과, 신부전을 포함한 신기능의 변화가 보고되었다. 이러한 신기능의 변화는 투여 중단시 정상으로 회복되었다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 의존적인 환자의 경우(예, 중증의 울혈성부전 환자), ACE억제제를 투여하였을 때, 빈뇨 및/혹은 진행성 질소혈증이 보고되었으며, (드물게) 급성 신부전 및/혹은 사망이 보고되었다. 유사한 결과에 이 약을 투여한 환자에서도 보고되었다. ACE억제제가 양측성 혹은 편측성 신동맥 협착증을 갖는 환자들의 혈중 요소와 혈청 크레아티닌치를 상승시켰다는 보고가 있다. 이 약을 투여한 환자에서도 유사한 결과가 보고되었다. 이는 투여 중단 시 회복되었다. 또한 이들 환자군에서 신혈류량의 감소와 사구체 여과율의 저하에 의해 급속히 신기능을 악화시킬 우려가 있고, 저혈당을 일으킬 수 있다. 중증의 신장애 환자에게 이 약 투여시 고칼륨혈증이 나타나기 쉽다. 또한 신기능의 악화가 일어날 우려가 있으므로 혈청 크레아티닌이 2.5mg/dL 이상의 경우에는 투여량을 줄이는 등 신중히 투여한다.
- 전해질 불균형은 당뇨병 유무에 상관없이 신장애 환자에서 빈번하게 발생하므로 반드시 알아야 한다. 단백뇨를 동반한 제 2형 당뇨병 환자를 대상으로 실시된 임상시험에서 고칼륨혈증이 위약군에 비하여 실험군에서 더 많이 보고되었다. 그러나 고칼륨혈증으로 인하여 투여를 중단한 환자는 드물었다(‘이상반응’항 참조).
- 고칼륨혈증(혈청 칼륨 > 5.5mmol/L)이 1.5%의 환자에서 발생하였으나, 약물 투여를 중단할 정도의 아니었다. 고령자와 신장장애 환자들(혈청 칼륨을 검사 받아야 한다, 특히 심부전 환자)과 크레아티닌청소율이 30~50mL/min인 환자의 경우, 혈청 칼륨 농도 및 크레아티닌청소율을 주의깊게 관찰해야 한다. 신장애, 당뇨병 등에 의해 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자에서는 고칼륨혈증이 발생할 확률이 더 크므로 혈청 칼륨치를 주의한다. 또한 고칼륨혈증 환자에서 고칼륨혈증을 악화시킬 우려가 있으므로 치료 불거피하고도 판단되는 경우를 제외하고는 사용을 피한다. 이 약은 칼륨보존이노제나 칼륨보존제, 칼륨을 포함한 염분 대용제와 병용투여해서는 안된다.
- 이 약의 투여에 의해(특히, 치료 시작, 용량 증량시) 일과성의 혈압강하(쇼크증상, 의식상상, 호흡곤란 등을 동반)를 일으킬 수 있으므로 그러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 특히, 혈관내 유출혈액량 감소 환자(‘다음 환자에는 신중히 투여할 것.’항 참조)에 투여 시 소량으로 개시하고 증량 시 환자의 상태를 충분히 관찰하여야 한다. 또한 이 약 투여 중에 정기적으로 혈압 모니터링을 실시할 것이 권장된다.
- 신부전 유무와 상관없이 심부전 환자에서 중증의 저혈압이나 신부전(주로 급성)을 일으킬 우려가 있다. 중증의 신부전을 가진 심부전 환자, 중증의 심부전 환자(NYHA class IV), 심부전 및 생명을 위협하는 심부전환자에게 투여 환자들에게 이 약을 투여한 임상경험은 거의 없으므로, 이러한 환자들에게 이 약 투여시 주의해야 한다.
- 고혈압과 단백뇨를 동반하는 2형 당뇨병에서의 당뇨병 신증에 대해 이 약을 투여하는 경우, 혈청 크레아티닌이 이전 검사치와 비교하여 30%(또는 1mg/dL)이상 증가하는 경우 및 신기능장애의 진전속도가 가속되는 경우에는 강량 혹은 투여중지를 고려한다.
- 수술 전 24시간은 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 2형 당뇨병에서의 당뇨병 신증 환자는 빈혈이 나타나기 쉬우므로 이 약의 투여중에는 정기적으로 혈액검사를 실시하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 빈혈의 원인을 고려하여 적절한 처치를 한다.

6. 상호작용

- 히드로클로로티아지드, 디곡신, 와르파린, 시메티딘, 페노바르비탈 등의 약물과 임상 약물동력학 시험 결과 임상적으로 유의한 약물상호작용은 발견되지 않았다(약물 대사 유도제인 페노바르비탈은 이 약과 이약의 활성대사체의 AUC를 20% 감소시켰다. 효소 억제제인 시메티딘은 로사르탄의 AUC를 18% 증가시켰으나, 활성대사체에는 영향을 없었다. 이러한 변화는 임상적으로 유의하지 않은 것으로 판단된다).
 - 약물 대사 유도제인 리팜핀은 로사르탄과 활성대사체의 농도를 40% 감소시켰다. 사람에게 2건의 CYP3A4 억제제가 연구되었다. 케토키나솔은 정맥투여한 이 약의 활성 대사체들로 전환되는데 영향을 미치지 않았으며 에리트로마이신은 이 약의 경구투여 후 임상상적으로 유의한 영향을 주지 않았다. CYP2C9의 억제제인 플루코니azole은 활성대사체의 농도를 약 50% 감소시키고 로사르탄의 농도는 증가시켰다. 이 약과 CYP2C9 억제제의 약력학적 상호작용은 연구된 바 없다. 이 약을 활성 대사체로 대사하지 못하는 사람은 CYP2C9에 회귀하여 특정 결합이 있는 것으로 나타났다. 이 결과로 이 약이 활성대사체로 전환되는데 있어 주요한 역할을 하는 효소는 CYP3A4가 아닌 CYP2C9임을 알 수 있다.
 - 이 약과 acenocoumarol 및 phenprocoumon을 비롯한 경우중 항응고제의 잠재적인 상호작용은 연구된 바 없다.
- 안지오텐신 II를 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 혈중 요소와 혈청 크레아티닌치에(예, 소피로락텐, 톨리암페렌, 아미로디핀), 칼륨 보충제, 칼륨을 함유한 염분 대용제, 칼륨 농도를 증가시킬 수 있는 약물(예, 헤파린)과의 병용은 혈청 칼륨을 증가시키고 고칼륨혈증을 일으킬 수 있다. 따라서 이 약과의 병용이 권장되지 않는다.
- 비스테로이드소염진통제(NSAID) : 안지오텐신 II수용체 차단제가 비스테로이드소염진통제(예, 선택적인 COX-2억제제, 아세틸살리실산(> 3g/day), 비선택적 비스테로이드소염진통제)와 병용시 혈압강화효과가 감소할 수 있다. ACE억제제와 같이, 안지오텐신 II수용체 차단제와 비스테로이드소염진통제의 병용은 신기능을 악화, 급성 신부전을 유발시킬 수 있고, 혈청 칼륨을 증가시킬 수 있다. 병용시 주의해야 하며, 특히 고령자 혹은 유출혈액량 감소환자(이노제 치료 중인 환자를 포함)는 주의한다. 병용치 시작 후배를 환자에게 적절한 수분이 공급되어야 하며, 신기능을 주기적으로 모니터링 해야한다.
- 니트록 배설에 영향을 미치는 다른 약물과 마찬가지로, 이 약 투여시 리튬배설이 감소되고 리튬 독증이 나타날 수 있다. 따라서 안지오텐신 II수용체 차단제와 리튬을 병용시 혈청 내 리튬 농도를 모니터링해야 한다.
- 이 약과 혈압강하를 일으킬 수 있는 약물(심한게 항우울제, 항정신약제, 바르올로, 아미포스티)를 병용투여하는 경우 저혈압의 위험이 커질 수 있다.
- 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE억제제 또는 알리스키렌의 병용투여에 의한 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단은 이러한 약물의 단독효과보다 비교적 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자는 기침, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 한다. 당뇨병이나 중증도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 <60mL/min/1.73㎡)에게 이 약과 알리스키렌 함유제제를 병용투여하는 것은 바람직하지 않다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임부
 - 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 직접적으로 작용하는 약물군은 발달 중인 태아의 손상 및 사망까지도 초래할 수 있다. 로사르탄은 임신 중에 사용해서는 안되며, 임신이 확인되면 가능한 빨리 투약을 중지한다. 사람의 경우, 태아의 신장 관류는 레닌-안지오텐신계의 발육에 따라 임신 2기에 시작되므로, 이 약을 임신 2~3기에 복용하였을 때 태아의 위험성이 커진다.
 - 임신 2, 3기 사이에 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 직접 작용하는 약물군은 투여한 일부에서 태아 및 신생아의 저혈압, 고칼륨혈증, 신생아 두개골형성저하증, 요강소 크기과/혹은 무노증, 가역적 또는 비가역적 신부전, 자궁내 성장 지체 및 사망을 포함하여 태아 및 신생아 손상과 연관성이 있었다.
 - 태아 신기능 감소 때문인 것으로 추측된 양수과소증도 보고 되었고, 양수과소증은 태아 사지구축, 두개안면 기형 및 폐형성 저하증과 연관성이 있었다.
 - 또한 이 약에 의한 것이지 명확하지 않은 만성, 자궁내 발육지연, 동맥과 열림증이 나타났다는 보고가 있다.
 - 역학자료에서 임신 1기에 ACE 저해제에 노출된 경우 초기형성 위험에 대한 증가는 명확하지 않았다. 어느정도의 위험성 증가를 배제할 수 없다. 안지오텐신수용체차단제의 위험성에 대한 통제된 역학자료는 없으나, 이 계열 약물들에도 유사한 위험성이 나타날 수 있다. 임신 기간동안 임부의 고혈압을 적절히 관리하는 것은 임부와 태아 모두에게 최적화된 결과를 주는데 중요하다.
 - 드물지만 레닌안지오텐신 계에 영향을 미치는 약물에 대한 적절한 대체약물이 없는 경우(대체로 천원의 일부 중 한영 끝 이하로 발한) 임부에 대해 적절한 잠재적 위험을 인지시켜야 하며, 양막 내 환경을 확인하기 위해 일련의 초음파 검사를 실시하여야 한다. 양수과소증이 관찰될 경우, 임부의 생명을 구하기 위한 경우를 제외하고는 이 약의 투여를 중단해야 한다. 임신 주수에 따라서 수축대응스트레스(Contraction Stress Testing), 비부하검사(Non-stress Test) 혹은 생리물학적 프로파일(Biophysical Profiling) 등의 검사가 정상일 수 있다. 하지만 태아에게 이미 비가역적 장애가 발생한 이후에도 양수과소증이 나타나지 않을 수 있다.
 - 자궁 내에서 안지오텐신 II수용체 차단제에 노출된 적이 있는 신생아, 영·유아의 경우에는 저혈압, 소변감소증 및 고칼륨혈증이 있는지 면밀하게 관찰하여야 한다. 만약 소변감소증이나 저혈압이 나타나다면, 혈압 및 신장관류에 대한 직접적인 관리를 해야 한다. 저혈압을 회복시키고 저하된 신기능을 정상하기 위해 교환수혈이나 투석을 할 수 있다.
 - 이 약은 컷트의 태자 및 새끼에서 체중 감소, 육체/행동 발달 지연, 사망률 및 신장독성을 포함한 이상반응을 유발시켰다. 신생아에서의 체중증가를 감소(10 mg/kg/day의 낮은 투여용량에서 영향 받은 것임)를 제외하고는, 이러한 이상반응들이 발현된 것은 25 mg/kg/day를 초과한 투여용량에서였다(mg/m2에 근거하여 사람의 최대 권장용량인 100 mg의 약 3배에 해당됨). 이러한 이상반응들은 임신말기 및 수유 중 약물의 노출에 기인한 것이다.
 - 수유
 - 이 약이 모유 중에 분비되는 지의 여부는 밝혀지지 않았으나 컷트에 대한 실험에서 유즙 중에 이 약의 분비가 확인되었으므로 수유부가 이 약을 사용하는 것은 바람직하지 않다. 수유중인 여성에게 이 약의 투여를 피하고, 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중단해야 한다.
- 소아에 대한 투여
 - 6세 미만의 소아환자, 사구체 여과율이 30mL/min/1.73㎡ 미만인 소아 및 청소년 환자에서 이 약의 혈압강하작용에 대한 자료는 없으므로, 투여하지 않는다.
- 고령자에 대한 투여
 - 고혈압에 대한 대조 임상시험에서 이 약을 투여 받은 환자들 중에서 391명의 환자(19%)가 65세 이상이었으며, 그 중 37명(2%)은 75세 이상이었다. 단백뇨가 있는 제 2형 당뇨병 환자의 신장 보호에 관한 대조 임상시험에서 248명(33%)의 환자가 65세 이상이었다. 좌심실 비대를 가진 고혈압 환자에 대해 실험군 사망, 뇌졸중, 심근경색의 복합 위험도 감소를 확인하기 위한 대조 임상시험에서 2,857명(62%)의 환자가 65세 이상이었으며 808명(18%)의 환자가 75세 이상이었다. 유증상 및 안전성에 있어서 이 고령자들과 젊은 환자들 사이에 전반적인 차이는 없었으나, 몇몇 고령자들의 감소성의 증가를 배제시킬 수는 없다.
- 과량 투여시의 처치
 - 마우스와 랫드에게 각각 1,000mg/kg, 2,000mg/kg(mg/m²에 근거하여 사람의 투여 최대 용량의 각각 44배, 170배)를 투여하였을 때 유의적인 치사율이 관찰되었다.
 - 사람을 대상으로 한 과량 투여 자료는 거의 없다. 과량 투여시 나타날 것으로 예상되는 증상은 저혈압과 빈맥이며 부교감(미주신경)의 자극으로 인해 서맥이 발생할 수 있다. 유증상 저혈압이 일어날 경우, 그에 따른 처료가 이루어져야 한다. 치료는 복용시간, 증상의 유형 및 중증도에 따라 달라질 수 있다. 심혈관계를 안정화시키는 것이 가장 우선적이다. 경구투여시 충분한 양의 활성탄을 투여하는 것이 권장되며, 활력 정주를 면밀히 모니터링하여 필요시 조절한다. 로사르탄 또는 활성 대사물은 혈액 투석으로써 제거되지 않는다.
- 환자에게 제공되어야 할 정보
 - 1) 임신 : 가임기 여성에게는 임신 중 이 약에 노출 시 나타날 수 있는 위험성에 대해 알려주어야 하며, 임신을 계획하고 있는 경우, 치료여부에 대하여 환자와 상의하여야 한다. 환자가 임신하게 되면 즉시 의사와 상의하도록 한다 (‘임부 및 수유부에 대한 투여’항 참조).
 - 2) 칼륨보충제 : 이 약을 복용하는 환자는 의사와 상의하지 않고 칼륨보충제 또는 칼륨을 함유하는 염분 대용제를 복용하지 않도록 한다(‘상호작용’항 참조).
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.