



분류번호:122
전문의약품

미오날 정

(에페리손염산염)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

에페리손염산염(JP)50.00mg
첨가제(타르색소) : 황색 203호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크, 청색2호 알루미늄레이크

[성상] 연두색의 불룩한 원형 필름코팅정

[효능·효과]

- 근골격계 질환에 수반하는 동통성 근육연축:
경관완증후군, 견관절주위염, 요통
- 신경계 질환에 의한 경직성 마비:
뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후
유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애,
아급성 척수신경병변, 기타의 뇌척수질환

[용법용량]

성인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약에 과민증 환자
- 중증의 근무력증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 약물과민증의 병력이 있는 환자
- 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다.)

3. 부작용

- 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는
투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히
하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여
증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는
경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.
- 장신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이
나타날 수 있다.
- 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게
복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
- 비뇨기계 : 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다.
- 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장 저하 등이
나타날 수 있다.
- 기타 : 때때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는
감량 또는 투여를 중지한다.
- 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여
중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

이 약의 유사약품인 염산톨페리손과 메토카르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는
보고가 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을
가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만
투여한다.
- 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중
단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다)

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

[포장단위] 100정, 500정

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

- 만약, 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은
구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원
(<http://www.drugsafe.or.kr>) ➡ (의약품 유해사례 보고)에 알리도록 하십시오.
- 기타 자세한사항은 (주)한독 홈페이지 (www.handok.co.kr) 또는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)
의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.
- 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하세요.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관 하세요.
- 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마세요.
- 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마세요.

제조사

씨제이헬스케어주식회사

충북 청원군 오송읍 오송생명2로 239
고객행복센터:080-700-8802
<http://www.cjpc.co.kr>



Eisai Co., Ltd.
TOKYO, JAPAN

공동판매자

(주)한독

서울특별시 강남구 테헤란로 132
[고객상담실 02-527-5114]



한국에자이주식회사

서울특별시 강남구 봉은사로86길 6
(삼성동) 빌딩 레베캄트 10층

FD-060511
LD-140411

168 631217103