

살균 · 소독 · 상처치료 · 피부재생에~

베나텐플러스크림

· 찰과상 · 베인상처 · 화상 · 만성상처 · 피부손상 · 피부감염증



※ 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

D-판테놀(USP)	50.0mg
클로르헥시딘염산염(KP)	5.0mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸	1.8mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필	0.2mg

[성 상]

흰색의 전질균등한 크림제제

[효능 · 효과]

- 감염위험이 있는 다음과 같은 형태의 상처 : 찰과상(긁힌 상처), 베인 상처, 찢긴 상처, 화상, 피부염
- 만성상처 : 다각궤양, 욕창
- 이차감염된 습진, 만성단순태선(신경피부염)과 같은 피부감염증
- 수유기 동안의 유두균열
- 소수술 : 피부손상, 수술상처

[용법 · 용량]

상처 또는 감염된 피부부위를 청결히 한 후 필요에 따라 1일 1~수회(여러 차례) 얇게 바른다.
상처를 통상의 방법, 즉 바른 후 드레싱하거나 드레싱하지 않은 상태로 치료할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

이 약의 성분 중 클로르헥시딘은 뇌, 척수, 귀(내이, 중이, 외이)등 청각신경 또는 중추신경에 직접 작용할 경우 난청, 신경장애를 일으킬 수 있다.

2. 다음 환자(부위)에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 함유된 한 가지 이상의 성분에 대해 이전에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 천공성 고막

3. 다음의 환자(부위)에는 신중히 투여할 것.

- 1) 다른 약물에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 천식 등 알레르기 질환 및 그 병력 또는 가족력이 있는 환자
- 3) 분만 직전의 외음부 주위(신생아의 눈 등에 들어갈 약영향을 미칠 수 있다)

4. 부작용

과민증 : 드물게 작열감(화끈감), 알레르기성 피부반응 등 과민증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지한다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 사용한다.
- 3) 이 약은 특별한 감염위험이 없는 자극된 피부(예 : 햇볕에 탄데)의 치료에는 사용하지 않는 것이 바람직하다. 이런 경우에는 소독제가 들어있지 않은 D-판테놀 단일제를 사용하는 것이 바람직하다.

6. 상호작용

- 1) 이 약의 성분 중 클로르헥시딘은 계면활성제 및 기타 음이온성 약물과 배합해서 사용하면 안된다.
- 2) 이 약과 다른 소독 · 방부제를 동시에 바르면 상호작용(길항작용(약제작용, 대항작용) 또는 불활성화)을 유발시킬 수 있으므로 병용(함께 복용(사용))투여하지 않는다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

동물을 대상으로 한 생식독성시험에서는 태자에 대한 위험이 없는 것으로 나타났으나 임부를 대상으로 한 임상시험을 실시한 경험이 없으므로 임신기간 동안에는 이 약을 다량으로 사용해서는 안된다. 특히 분만 직전의 외음부 주위에 사용할 경우 신생아의 눈 등에 들어갈 수 있으므로 신중히 투여해야 한다.

8. 적용상의 주의

이 약은 질, 방광, 구강(입안) 등의 점막면 또는 눈에 사용하지 않는다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻는다. 중상이 심할 경우에는 안과의사의 치료를 받는다.

9. 저장상의 주의사항

25℃ 이하에서 보관한다.

[포장단위] 15g / 튜브 [저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~25℃)

- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.
- 기타 자세한 사항이나 문서의 작성일자(2016. 12. 07)이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다.
- 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

[제조 · 판매원]  (주)씨트리 경기도 남양주시 경강로 27 www.c-tri.co.kr