

고혈압 치료제

노바핀정

(암로디핀말레산염)

노바핀정은 칼슘채널 길항제로서, 혈관평활근을 직접적으로 이완하여, 혈관을 확장함으로써 혈압을 낮추는 고혈압 치료제입니다. 또한 심박수의 안정화에 의한 심장부담의 감소로 심근의 에너지 소모량 및 산소 요구량을 감소시키고, 심근 허혈 부위와 관상동맥의 확장으로 관상혈류를 증가시켜 협심증을 완화시킵니다

【원료약품의 분량】1정 중
암로디핀말레산염 (KP) 6.42mg
(암로디핀으로서 5.0mg)

【성 상】 흰색의 팔각형 정제

【약리작용 및 특장점】

노바핀정은 디하이드로피리딘계 칼슘채널 길항제인 암로디핀을 함유한 고혈압 치료제입니다. 암로디핀은 심장 근육세포 및 혈관의 평활근 세포 내로 칼슘이 유입되는 것을 차단함으로써, 혈관의 확장을 초래하여 말초저항을 감소시키고 심근의 수축력을 감소시켜 혈압강하 효과를 나타냅니다. 암로디핀의 최종 소실반감기는 약 35~50시간으로, 서서히 지속적으로 작용하므로 부작용이 적고 장기간 혈압조절작용을 나타냅니다. 또한 암로디핀은 심부전, 고지혈증 등의 질환을 동반한 환자에서도 타제제와 병용하여 안전하게 투여할 수 있습니다. 따라서, 노바핀정은 다양한 환자의 고혈압, 협심증으로 인한 심근성허혈증 치료에 1일 1회 용법으로 안전하고 효과적으로 사용할 수 있습니다.

【효능·효과】

고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련수축(이형협심증)에 의한 심근성 허혈증

【용법·용량】

성인：
암로디핀으로서 1일 1회 5mg을 경구투여하며, 2 ~ 4주 이내에 증상이 호전되지 않으면 환자의 반응에 따라 1일 최고 10mg까지 증량할 수 있다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에게는 투여하지 말 것.
 - 이 약이나 이 약의 구성 성분 또는 다른 디하이드로피리딘계 약물에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 소크 환자(심장정소속 포함)
 - 중증의 대동맥판막질환 환자
 - 불안정협심증 환자
 - 심근경색 발생 후 1개월 이내인 환자
 - 중증의 간기능장애 환자
 - 중증의 저혈압 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 중증의 신기능장애(환자(투석을 해야 하는 신부전 환자 포함)
 - 고령자
 - 급성 심부전 환자
 - 고혈압위기 환자
 - 경증 ~ 중증도의 간기능장애 환자
 - 좌심실기능이 제한적인 환자
- 이상반응
 - 암로디핀은 내약성이 좋다. 고혈압 및 협심증환자에 대한 위약대조 임상시험에서, 가장 흔하게 나타난 이상반응은 다음과 같다.
 - 자율신경계：열감을 동반한 홍조(특히 치료 시작 시)
 - 전신：피로, 부종
 - 심혈관계：심계항진, 치료 초기 혹은 용량 증량 시에 협심증 환자의 협심증의 발생 빈도, 시간, 정도 증가(특히 폐쇄관상동맥질환 환자)
 - 중추 및 말초신경계：어지럼, 두통(특히 치료 초기), 편두통, 무력증
 - 소화기계：복통, 구수, 소화불량
 - 정신계：졸음
 - 근골격계：발목부종
 - 임상시험에서 암로디핀과 연관되어 임상적으로 유의한 실험실실검사 이상은 관찰 되지 않았다.
- 시판 후 비교적 적은 빈도로 관찰된 이상반응은 다음과 같다.
 - 자율신경계：구강건조, 발한증가
 - 전신：무력, 권태감, 통증, 체중의 증가/감소, 오한
 - 심혈관계：저혈압, 체위저혈압, 체위어지럼, 말초허혈, 혈관염, 실신, 빈맥, 말초부종
 - 중추 및 말초신경계：긴장형진, 감각저하/감각이상, 말초신경병증, 미각이상, 진전, 마비
 - 생식기계：발기부전, 여성형 유방
 - 소화기계：배변습관의 변화, 소화불량, 위염, 치은 비후, 혀창증, 구토, 포만감, 식욕부진/증가, 삼킴곤란, 복부팽만감
 - 대사/영양：고혈당, 갈증, 혈청 콜레스테롤 상승, 크레아티닌치아제(CK) 상승
 - 근골격계：관절통, 요통, 근육경련, 근육통, 골격근긴장증가, 관절증, 단일수축, 실조, 등통증
 - 혈액 및 림프계：백혈구감소증, 혈소판감소증이 나타날 수 있으므로, 감사를 행하는 등 관혈을 충분히하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 정신계：불면, 기분변화, 성격변화, 공이상, 이인증, 무감동, 초조, 기억상실, 민감, 우울, 불안, 혼란, 공포, 불쾌감
 - 호흡기계：기침, 호흡곤란, 비염, 코피
 - 피부 및 피하조직：발모, 자색반병, 피부 변색, 두드러기, 광민감반응, 발진, 발진홍반, 발진반구진, 냉습피부, 모세혈관확장, 피진, 가려움, 혈관부종
 - 감각기계：이명, 시각이상, 결막염, 복시, 눈통증, 안구건조, 후각이상, 미각이상, 시력저하
 - 비뇨기계：배뇨빈도 증가, 배뇨장애, 야뇨증, 다뇨, 배뇨통
 - 감각도제：근염, 활막, 간초소치의 상승 등이 매우 드물게 보고되었으며, 이들의 대부분은 담즙울체성과 관련이 있었다. 입원이 필요할 만큼 중증이었던 일부 경우에는 암로디핀의 사용과 연관이 있다고 보고되었으나, 대부분 많은 경우에는 암로디핀의 인과관계가 불명확하다. 간기능장애 임상증상(예, 무력증, 거식증, 오래 지속되는 구역)이 있을 경우 간초소 수치에 대한 측정이 권장된다. 수치가 상승되고 황달이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.
 - 드물게 가려움, 발진, 혈관부종, 다형성출혈반, 박탈피부염, 피부점막안주후군(스티븐스-존슨 증후군)을 포함한 알레르기반응이 보고되었다. 이러한 과민반응이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 다른 칼슘채널차단제에서와 마찬가지로, 다음의 이상반응들이 드물게 보고되었는데 이들이 기저질환으로 인한 것인지 약물에 의한 것인지는 구별을 할 수 없었다.
 - 심근경색, 부정맥(사맥, 심실빈맥, 심방성세동, 기외수축, 심방부정맥 포함), 흉통
- 기타 다음과 같은 이상반응이 관찰되었다.
 - 심혈관계：때때로 혈압하락, 동방방진 또는 방실차단, 드물게 복부불쾌감 등이 나타날 수 있다. 방실차단이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 소화기계：때때로 심와부통, 설사, 묽은 변, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 피부：드물게 피부홍통증, 만성성 구진성 발진 등이 나타날 수 있다.
 - 기타：때때로 두드랑, 열감, 내당력저하, 쇠약 등이 나타날 수 있다.

- 일반적 주의
 - 칼슘채널차단제를 급하게 투여 중지한 경우 증상이 악화된 예가 보고되어 있으므로 휴약이 필요한 경우에는 천천히 감량하고, 관찰을 충분히 한다. 또한, 환자에게 의사의 지시없이 복약을 중지하지 않도록 주의를 시킨다.

- 심부전 환자에 대한 투여：허혈성 병인이 없는 NYHAⅢ,Ⅳ등급의 심부전 환자에 대한 암로디핀의 장기간, 위약대조시험(PRAISE-2)에서 이 약은 위약과 비교 시 심부전의 악화율에 유의적인 차이가 없음에도 불구하고 폐부종 보고의 증가와 연관이 있었다.
- 간기능장애 환자에 대한 투여：모든 칼슘채널차단제와 마찬가지로 암로디핀의 반감기는 간기능장애 환자에서 길어졌으며, 이들 환자에 대한 권장용량은 확립되지 않았다. 그러므로 이런 환자들은 주의하여 투여한다.
- 혈장농도 반감기가 길어 투여를 중지한 후에도 완전한 혈압강하작용이 나타나므로, 투여 중지 후 다른 혈압강하제를 투여하는 경우에는 용량 및 투여간격에 주의하고 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
- 효과발현이 천천히 나타나므로 증근 치료를 요하는 불안정협심증에는 효과를 기대할 수 없다.
- 이 약은 충분한 양의 물과 함께 복용한다.
- 혈압강하작용에 의해 어지럼 등이 나타날 수 있으므로 고소작업, 자동차운전 등 위험한 기계조작 시 주의한다. 어지럼, 두통, 피로, 혹은 구역이 있는 환자는 반응 능력에 손상이 있을 수 있으므로 주의한다.
- 상호작용
 - 암로디핀은 티아지드계 이뇨제, 알파차단제, 베타차단제, ACE억제제, 작용시간이 긴 질산염제제, 니트로글리세린 설하정, 비스테로이드소염진통제(NSAID), 항생제, 경구 혈당강화제와 병용 시 안전하였다.
 - 사람혈청을 이용한 실험실실적 자료는 암로디핀이 디곡신, 페니토인, 와르파린, 인도메타신의 단백결합에 영향을 미치지 않는 다는 것을 알려준다.
 - 자몽주스：암로디핀은 자몽이나 자몽주스와 병용 시 일부 환자에서 생체이용률 증가로 인한 혈압강하효과의 증가가 나타날 수 있으므로, 병용 투여를 권장하지 않는다.
 - 다른 약물들이 암로디핀에 미치는 영향：
 - 시메티딘：병용 투여 시 암로디핀의 약동학에 영향이 없었다.
 - 알루미늄/마그네슘(제산제)：알루미늄/마그네슘 제산제와 단화용량의 암로디핀과 병용 투여 시 암로디핀의 약동학에 유의적인 영향이 없었다.
 - 실데나필：원발고혈압환자에 실데나필 100mg 단화용량의 투여는 암로디핀의 약동학적 파라미터에 영향을 미치지 않았다. 암로디핀과 실데나필을 병용 투여 시, 각 약물은 단독적으로 각각의 혈압강하효과를 발휘한다.
 - CYP3A4억제제：CYP3A4억제제와의 병용 투여(젊은 성인에서 에리트로마ycin 및 고령자에서 딜티아젠휴)시 암로디핀의 혈장농도가 각각 22% 및 50%까지 증가하였으나, 임상적인 연관성은 밝혀진 바 없다. 강력한 CYP3A4억제제(예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 리토나비르)가 암로디핀의 혈장 농도를 딜티아젠휴과의 병용 투여에서 나타난 것보다 더 높은 수치로 증가시킬 가능성은 배제할 수 없다. 암로디핀은 CYP3A4억제제와 병용 투여 시 주의하여 투여한다. 그러나 이런 약물상호 작용으로부터 기인된 이상반응은 보고된 바 없다.
 - CYP3A4유도제：CYP3A4유도제가 암로디핀에 미치는 영향에 대한 실험은 수행되지 않았다. CYP3A4유도제(예, 리파피질, 세인티 존스 워트(hypericum perforatum))와의 병용 투여는 암로디핀의 혈장농도를 감소시킬 수 있으므로, 병용 시 주의하여 투여한다.
 - 암로디핀이 다른 약물들에 미치는 영향
 - 아토르바스타틴：아토르바스타틴 80mg과 암로디핀 10mg 다화용량을 병용 투여 시 아토르바스타틴의 항정약동학적 파라미터에 유의적인 변화가 없었다.
 - 디곡신：정상인 자원자에게 암로디핀과 디곡신을 병용 투여 시 혈청디곡신의 수치 혹은 디곡신의 신장 클리어런스에 변화가 없었다.
 - 알코올：10mg 암로디핀의 단회 및 반복 투여 시 알코올의 약동학에 유의적인 변화가 없었다.
 - 와르파린：암로디핀과 와르파린의 병용 투여 시 와르파린-프로트롬빈 반응시간에 영향이 없었다.
 - 시클로스포린：시클로스포린에 대한 약동학 시험에서 암로디핀이 시클로스포린의 약동학을 유의적으로 변화시키지 않았다.
 - 다른 혈압강하제：다른 혈압강하제와 병용 시 혈압강하효과를 증가시킬 수 있다. 특히 칼슘채널차단제와 베타차단제의 병용은 심부전을 일으킬 수 있으며, 저혈압과 심근경색까지 유발할 수 있으므로 주의한다.
 - 심한계 항우울제：혈압강하효과를 증가시킬 수 있다.
 - 질산염제제：혈압과 심박수에 대한 이 약의 효과를 증가시킬 수 있다.
 - 항부정맥제(아미오다론, 퀴니딘 등)：근육수축 억제작용이 커질 수 있다.
 - 테오필린과 에르고타민：칼슘채널차단제는 CYP-450 대사에 의존하는 테오필린과 에르고타민의 대사에 개입할 수 있다. 이 약과 의 병용 시 혈액을 정기적으로 체크할 것이 권장된다.
 - 단트롤렌：이 약과 단트롤렌과의 병용 투여는 권장되지 않는다. 동물실험에서 이 약과 단트롤렌을 투여했을 때 치명적인 심실 세동이 관찰된 바 있다. 따라서 칼슘채널차단제와 단트롤렌의 병용 투여는 위험할 수 있다.
 - 바클로펜：혈압강하작용이 더 커질 수 있다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 이 약의 임부에 대한 안전성은 확립되지 않았다. 인체에 대한 최대건강용량의 50배에 해당하는 용량의 이 약을 투여한 랫트에서 분만 지연 및 연장이 나타났다. 또한 동물실험중 이 약 고용량에서 생식독성이 나타났다.
 - 이 약의 수유부에 대한 안전성은 확립되지 않았다. 따라서, 이 약을 투여하는 동안에는 수유를 중단하는 것이 권장된다.
- 소아에 대한 투여
 - 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않다.
- 고령자에 대한 투여
 - 일반적으로 고령자에게 과도한 혈압강하에는 바람직하지 않다. 고령자의 경우 약물의 혈중 농도가 증가하고, 반감기가 길어지는 경향이 있으므로 저용량부터 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
- 과량투여시의 처치
 - 심한 과량투여 시 과도한 말초혈관확장과 함께 반사성 빈맥도 나타날 수 있다는 것이 현재까지의 자료에서 언급되었다. 또한, 전신성 저혈압, 홍조, 두통, 반사성 빈맥, 심박이상, 심혈관계 혈액순환 이상으로 쇼크상태, 의식불명, 혼수상태까지 이를 수 있다. 건강한 지원자에게 암로디핀 10mg을 투여한 후자는 2시간 후까지 활성탄을 투여하였을 때 암로디핀의 흡수가 유의하게 감소되었다. 일부 경우에는 위세척이 유용할 수 있다. 이 약의 과량투여로 인한 임상적으로 심각한 저혈압은 심장과 호흡기능을 자주 모니터링 하고, 사지의 위치를 몸체보다 높게 유지하여 혈액등과 같은 순환액 및 노폐설량을 충분히 확보하는 등의 적극적인 실험관리에 대한 보조요법을 필요로 한다. 혈관수축제 사용을 금기하는 특별한 경우가 아니라면, 혈관긴장력 및 혈압을 회복하는데 혈관수축제가 유용할 수 있다. 칼슘채널저해제의 효과를 반전시키는데 칼슘글루콘산염의 정맥투여가 유용할 수 있다. 암로디핀은 단백결합율이 매우 높으므로 혈액투석은 도움이 되지 않는다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.
- 기타
 - 발암성

암로디핀 0.5, 1.25, 2.5mg/kg/day를 2년동안 먹이 속에 투여한 랫트 및 마우스에서 발암성의 증거는 나타나지 않았다. 또한, 이 실험에서 투여된 최고용량은 마우스의 최대 내약성 용량에 근접하였으나(마우스에서는 mg/2g 기준으로 임상 최대 권장용량인 10mg에 근접한 용량, 랫트에서는 임상 최대 권장용량의 2배*)
 - 돌연변이성

돌연변이 시험에서 이 약은 유전자 혹은 크로모솜 수치에 영향을 미치지 않았다.
 - 수태능 이상

10mg/kg/day 용량까지의 암로디핀(mg/2g 기준으로 임상 최대 권장용량인 10mg의 8배*)으로 처치한 랫트(코피 전에 수컷은 64일 동안, 암컷은 14일 동안 처치)에서 수태능에 대한 영향은 나타나지 않았다.

*：환자의 체중 50kg 기준

【저장방법 및 사용기간】

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

【포장 단위】 30정, 100정

【제 조 자】 (주)동구바이오제약 경기도 화성시 향남읍 제곡공단2길 18

【제조회지】 한국셀스제약(주) 총복 음성군 금강읍 금일로 271-8

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.

※이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은(02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.

※첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사·약사 또는 식품의약품안전처 (이디트랙 → 보고의무 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고에 알려주시기 바랍니다.)

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관 (http://drug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.