

치주질환 치료제

티스큐어 정

옥수수불검화정량추출물

치주질환 | 치은염 | 치주증



[원료약품 및 그 분량] 1정 중

옥수수불검화정량추출물(생규) 35mg

(총 β -Sitosterol로서 7mg)

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원 : 소, 사용부위 : 우유)

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호

[성상] 주황색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 질환에 사용할 수 있다.

치주질환(치아주위조직질환)[치아지지조직질환, 치은염(잇몸염), 치주증(유년형 치주염)]

[용법·용량]

- 성인 : 초기량으로는 옥수수의 불검화정량추출물로서 1회 70mg(2정) 1일 3회 식전에 경구투여 한다. (복용한다.)
- 유지량으로는 1회 35mg(1정) 1일 3회 식전에 투여한다.
- 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분예의 과민반응 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 한다.
- 2) 이 약은 콜레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의한다.
- 3) 임부 및 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.)

4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 가벼운 완하작용을 일으킬 수 있다.
- 2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 자사포장단위

[제조사] 영일제약(주) 충청북도 진천군 진천읍 문화12길 6-1

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 구입하신 약국에서 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(☎080-001-0795) 또는 식약청 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 사이트의 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2013년 10월 18일

제조의뢰자 :  **주비티오제약**
충청북도 청원군 오송읍 오송생명로 70
www.biopharm.com

판매자 :  **SK 케미칼**
Life Science Biz.