



클로펙트정 클로피도그렐환산염

전문의약품

클로펙트정

【원료약품 및 분량】 정 중 - 유효성분：클로피도그렐환산염(별규) (클로피도그렐로서 75.0mg) 첨가제－동등유제：유당수화물(소의 우유에서 유래) - 기타 첨가제：오프드라이브 분홍색(03B240024), 차차히도하드프록시프로필셀룰로오스, 코코보돈, 탈크, 푸마르산스테아릴나트륨, D－만니톨
【성상】 분홍색의 원형 필름코팅정
【효능·효과】 - 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성질환이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상의 개선 - 급성관상동맥중추근불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색 환자에 있어서 약물치료 또는 관상중 재시술(PCI)시술을 하거나 하지 않은 경 위) 및 관상동맥화재우회술(CABG)을 받았거나 받을 환자를 포함)이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색, 뇌졸중 또는 불응성 허혈의 개선 - 한 가지 이상의 혈관성 위험인자를 가지고 있고, 비타민 K 길항제(VKa) 투여가 적합하지 않으며, 출혈 위험이 낮은 심방세동성 성인 환자에서 뇌졸중을 포함한 죽상혈전증 및 혈전색전증의 위험성 감소
【용법·용량】 - 성인： - 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성 질환이 있는 환자에는 클로피도그렐로서 1일 1회 75 mg을 경구투여한다. - 급성관상동맥중추근불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색에 있는 환자에는 이 약 투여개시 일제에 이 약으로서 1일 1회 300 mg을 부하용량 (loading dose)으로 시작하고 이후에 1일 1회 75 mg을 유지 용량으로 경구투여한다. 이 때 아스피린 75 ～ 325 mg을 1일 1회 이 약과 병용투여하여야 한다. - 심방세동 환자에는 이 약으로서 1일 1회 75 mg을 경구투여한다. 이 때 아스피린 75 ～ 100 mg을 1일 1회 이 약과 병용투여 하여야 한다. - 신장에 환자：신장에 환자에서 치료 경험은 제한적이다. - 간장애 환자：출혈 제질의 중등도 간질환 환자에서 치료경험은 제한적이다. 이 약은 음식물의 섭취와 상관없이 투여할 수 있다.

- 경고 - 유전적으로 CYP2C19의 기능이 저하된 환자：유전적으로 CYP2C19의 기능이 저하된 환자는 정상 CYP2C19 기능을 가진 환자들에 비하여, 이 약의 활성 대사체의 전신 노출이 적어 혈당소판 반응이 감소되며 일반적으로 심근경색 이후 심혈관계 사건이 발생할 확률이 높으므로 CYP2C19의 기능이 저하된 환자로 확인된 경우 치료방법 또는 대체치료를 고려해야 한다. - CYP2C19의 활성을 유도하는 약물의 사용은 이 약의 활성 대사체의 약물 농도를 증가시킬 수 있고 출혈의 위험을 높일 수 있다. 이 약을 CYP2C19 유도제와 병용하는 것은 권장되지 않는다.

- 다른 환자에는 투여하지 말 것. - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자 - 출혈이 있는 환자(소화성궤양, 두개내 출혈, 혈우병, 소화관 출혈, 요로 출혈, 각혈, 유리체 출혈 등) - 중증의 긴 간선 환자 - 수유부 - 이 약을 용량을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당－갈락토오스 흡수장애(gucose－galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. (유당불용유제에 한함)
--

- 다른 환자에는 신중히 투여할 것. - 출혈 및 출혈성 이상반응의 위험이 있으므로, 치료 중에 이런 임상적인 증상이 의심될 때마다 신속하게 혈구수 측정 또는 다른 적절한 검사가 고려되어야 한다. 이 약과 와르파린을 병용투여 할 경우 출혈 위험이 증가하므로 주의하여야 한다. 이 약은 출혈 시간을 연장시키므로 출혈이 생길 수 있는 병변을 가진 환자(특히, 위장관 및 안구내 병변)에게는 주의하여 투여하여야 한다. 또한 다른 항혈소판제와 마찬가지로, 이 약은 수술, 수술 또는 다른 병리상태에(예 선전적 또는 후천적 응고 이상, 혈소판 감소증 또는 기능적인 혈소판 결손, 활성 계량성 위장관 질환, 최근의 생검, 제2종 심막박열 등)로 인해 출혈 위험이 증가한 환자에게는 신중하게 투여하여야 한다. 환자가 수술을 받기로 예정되어 있는 경우, 항혈소판 효과의 비일관적이지 않은 경우에는 수술 5일 내지 7일전에 이 약의 투여를 중단하여야 한다. 지혈이 이루어지는 대로 이 약 투여를 재개한다. 이 약을 복용하는 환자는 위장관내 병변을 야기할 수 있는 약물(아스피린과 그 외 비스테로이드 소염진통제(NSAD)), 해피린, 당단백 Ilb/Ⅲa 저해제 선택적세로토닌재흡수억제제(SSRI), 혈전용해제 또는 펜톡시필린과 같이 출혈의 위험이 있는 약물, 또는 CYP2C19 유도제 등과 병용시 주의하여야 한다. 특히, 투여 전체 주 및/또는 침상성 심장 치지 또는 수술 이후에 잠재출혈을 포함한 모든 출혈증상에 대하여 환자를 주의해서 관찰하여야 한다. 허혈성 사건의 재발 위험이 높은 일과성 허혈발작 또는 뇌졸중 환자의 경우, 이 약을 아스피린과 병용하였을 때 주요한 출혈이 증가하는 것으로 나타났다. 그러므로 이러한 환자에서는 병용투여의 이익성이 확실할 경우에 병용이 신중하게 고려되어야 한다(예, 심호중 응 용 항 진정). - 급성 비심인성 허혈성 뇌졸중 또는 일과성 허혈발작 환자에게는 뇌졸중 2차 예방을 위한 항혈소판제 3제요법(클로피도그렐+아스피린+디피리다몰)은 출혈 위험이 증가하므로 권장되지 않는다(예, 심호작용 항 진정). - 간질환 환자 출혈성 소인이 있는 중증의 간질환 환자에게는 이 약의 사용 경험이 제한적이다. 이런 환자에게 이 약은 신중하게 투여하여야 한다. - 신장에 환자 출혈성 환자에 대한 이 약의 사용 경험이 제한적이므로, 이런 환자에게 이 약은 신중하게 투여하여야 한다. - 급성 뇌졸중 환자(7일 이내)(관련 치료가 부족하므로 투여를 권장하지 않는다.) - CYP2C19 저해제를 투여중인 환자(예, 심호작용 항 진정) - 고혈압이 지속되는 환자 - 고령자 - 저체중 환자 - 티에노파리딘계 약물과의 교차과민반응 이 약은 티에노파리딘계 약물 (예 티클로피딘, 프라수그렐)과 교차과민반응이 보고된 적이 있으므로, 다른 티에노파리딘계 약물에 대한 환자의 과민반응 병력을 검토해야 한다. 티에노파리딘계 약물들은 발진, 혈관부종과 같은 경증에서 중증의 알레르기 반응이나 혈소판감소증, 호중구감소증과 같은 혈액학적 반응을 야기할 수 있다. 이전에 한 가지 티에노파리딘계 약물에 알레르기 반응 및/또는 혈액학적 반응을 나타냈던 환자는 다른 티에노파리딘계 약물에 동일한 또는 다른 반응을 나타낼 위험이 증가되어 있을 수 있다. 교차 과민반응에 관한 모니터링이 권고된다. - 후천성 면역결핍 바이러스 이 약은 HIV 후 천성 혈우병이 보고된 사례가 있다. 출혈을 동반하거나 동반하지 않는, 활성화 부분 트롬보플라스틴 시(지APTT) 연장이 확인된 경우에는 후천성 혈우병인지 살펴보아야 한다. 후천성 혈우병으로 진단된 환자는 투여를 중단하고, 전문의의 치료를 받아야 한다. - 이 약은 황색소(산혈로루 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다(황색소 함유유제에 한함).
--

- 이상반응 이 약의 안전성은 이 약을 1년 이상을 투여한 12,000명을 포함한 44,000명 이상의 환자를 대상으로 평가되었다. 이 약의 전반적인 내약성은 연령, 성별, 인종, 인종간 관계없이 아스피린과 비슷하였다. 이상 반응 발현으로 투여를 중단한 환자는 대략 아스피린과 같은 빈도(%)였다. CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT, ACTIVE-A, ACTIVE-W 연구에서 관찰된 임상적으로 중요한 이상반응은 아래와 같다. - 출혈장애 - CAPRIE 연구에서, 이 약과 아스피린 투여군에서 전반적인 출혈의 발생빈도는 동일했으며(0.3 %), 중증의 출혈 발생빈도는 이 약 투여군에서 1.4%, 아스피린 투여군에서 1.6%로 각각 나타났다. 구체적으로 살펴보면, 전반적인 위장관 출혈률이 이 약 투여군에서 2.0 %이었고, 이중 0.7 %가 입혈을 필요로 하였다. 반면, 아스피린을 투여한 환자군의 경우, 위장관 출혈률이 2.7 %이었고 입혈이 필요한 경우는 1.1 %였다. 그 외에 기타 출혈의 발생빈도는 이 약 투여군에서 7.3 %였고, 아스피린(6.5 %)의 경우보다 높았다. 그러나 이 중에서 중증의 출혈 발생빈도는 두 치료군에서 유사한 것으로 나타났다(0.6 % 대 0.4 %). 또한, 치반/자상/혈종(purpura/bruising/ haematoma)과 혈관혈(hepatectasis)이 가장 빈번하게 발생되었으며, 혈종, 혈노, 안구내출혈(주로 결막 부위)은 덜 빈번하게 보고되었다. 두개내 출혈률은 아스피린의 경우 0.5 %이고 이 약은 0.4 %였다. - CURE 연구에서 위약과 아스피린을 투여받은 환자군에서보다 이약과 아스피린을 병용투여한 환자군에서 주요한 출혈 및 경미한 출혈이 증가되었다(주요한 출혈의 발생빈도 2.7% 대 3.7%, 경미한 출혈의 발생빈도 2.4 % 대 5.1 %). 주요한 출혈이 주로 발생되는 위치는 위장관계 및 치반(puncture) 부위 등이었다. 위약과 아스피린을 투여받은 환자군과 비교하여 이 약과 아스피린을 병용투여 받은 환자군에서 생명을 위협하는 출혈의 발생빈도 증가는 통계적으로 유의하지 않았으나(1.8 % 대 2.2 %). 두 치료군에서 치명적인 출혈의 발생빈도는 차이가 없었다(두 군 모두 0.2 %). 생명을 위협하지 않는 주요한 출혈의 발생빈도는 위약과 아스피린 투여군에 비해 이 약과 아스피린 투여군에서 유의하게 높았고(1.0 % 대 1.6 %), 두 치료군에서 두개내 출혈률은 0.1 %로 동일하였다. - CAPRIE 연구에서, 이 약과 아스피린의 병용투여군에서의 출혈률은 아래의 표와 같다(%/환자).
--

증상	클로피도그렐 (+ 아스피린)* (n=6,259)	위 약 (+ 아스피린)* (n=6,303)	p - Value
주요한 출혈	3.7** ^(a)	2.7** ^(a)	0.001
• 생명을 위협하는 출혈	2.2	1.8	0.13
~ 치명적	0.2	0.2	
~ 5g/dL 헤모글로빈 저하	0.9	0.9	
~ 수술적 중재가 요구	0.7	0.7	
~ 출혈성 뇌졸중	0.1	0.1	
~ 혈액제 사용이 요구	0.5	0.5	
~ 수술을 요구 (≥4 units)	1.2	1.0	
• 기타 주요한 출혈	1.6	1.0	0.005
~ 상당한 정도의 기능부전	0.4	0.3	
~ 상당한 시력 손실을 동반한 안구내 출혈	0.05	0.03	
~ 2~3 units의 수술을 요구	1.3	0.9	
경미한 출혈***	5.1	2.4	< 0.001

* 적당히 다른 표준오염제에 치료중 사용되었다.

**^(a) 클로피도그렐 + 아스피린에 의한 주요한 출혈 증상의 발현률은 아스피린에 대해 용량 비례적이었다(<100 mg=2.6 %；100 ～ 200 mg=3.5 %；>200 mg=4.9 %).

**^(b) 위 약 + 아스피린에 의한 주요한 출혈 증상의 발현률은 아스피린에 대해 용량 비례적이었다(<100 mg=2.0 %；100 ～ 200 mg=2.3 %；>200 mg=4.0 %).

*** 이로 인해, 약물의 투여가 중지되었다.

－ CURE 연구에서, 대상 환자의 92 %가 해피린 및 저분자량 해피린을 투여 받았으며 이들 환자의 출혈률은 이 약의 전반적인 결과와 유사하였다. 최소한 수술 5일 전부터 이 약의 투여를 중단한 환자에서 관상동맥화재우회술 이후 7일 이내에 주요한 출혈이 추가로 관찰되지 않았다(이 약과 아스피린 투여군에서 4.4 %, 위약과 아스피린 투여군에서 5.3 %).관상동맥화재우회술 이전 5일 이내에 이 약을 투여 받은 환자에서, 출혈성 증상의 발현률은 이 약과 아스피린 투여군에서 9.6 %, 위약과 아스피린 투여군에서 6.3 %였다.

－ CLARITY연구에서 주요한 출혈 또는 내 출혈 또는 헤모글로빈이 5 g/dL 이상 감소하는 것과 관련된 출혈의 발생은 두 투여군에서 유사하게 나타났다(이 약 + 아스피린 투여군과 위약 + 아스피린 투여군에서 각각 1.3 % vs 1.1 %). 이는 기본적인 특징과 섬유소 용해제의 유형 또는

해피린 요법에 따른 환자 서브그룹에서 일관되었다. 치명적인 출혈의 발생이 약 + 아스피린 투여군과 위약+아스피린 투여군에서 각각 0.8 % vs 0.6 %과 두개 내 출혈 각각 0.5 % vs 0.7 %은 두 그룹에서 낮고 비슷하게 나타났다.

－ COMMIT연구에서, 뇌 이외의 주요한 출혈 또는 뇌에서의 출혈은 위 의제와 같이 두 그룹에서 낮고 비슷하게 나타났다. COMMIT연구에서 출혈이 발생한 환자수(%)는 다음과 같다.

출혈	클로피도그렐 (+ 아스피린) (N=22,961)	위약 (+ 아스피린) (N=22,881)	p - Value
주요한* 뇌 이외의 출혈 또는 뇌에서의 출혈**	134 (0.6%)	125 (0.5%)	0.59
주요한 뇌 이외의 출혈	82 (0.4%)	73 (0.3%)	0.48
치명적	36 (0.2%)	37 (0.2%)	0.90
출혈성 뇌졸중	55 (0.2%)	56 (0.2%)	0.91
치명적	39 (0.2%)	41 (0.2%)	0.81
다른 뇌 이외의 출혈 (주요하지 않은)	831 (3.6%)	721 (3.1%)	0.005
그 밖에 뇌 이외의 출혈	896 (3.9%)	777 (3.4%)	0.004

* 주요한 출혈은 뇌에서의 출혈 또는 뇌 이외의 출혈로 사망에 이르거나 또는 수술을 요하는 정도를 말함.

** 주요한 뇌 이외의 또는 뇌에서의 출혈의 상관비율은 연령과 무관하였다. 연령에 따른 이 약 + 아스피린 투여군의 발생률은 60세 미만=0.3%, 60 ～ 70세=0.7%, 70세 이상=0.8%로 나타났다. 위약 + 아스피린 투여군에서는60세 미만=0.4%, 60～70세=0.6%, 70세 이상=0.7%로 나타났다.

－ ACTIVE-A 연구에서 주요한 출혈의 발생률은 이 약과 아스피린 병용투여군이 위약과 아스피린 투여군보다 높았으며(6.7% 대 4.3%). 주요한 출혈은 대부분 두개외 출혈이었다(5.3% 대 3.6%), 주로 위장관 출혈이었다(3.5% 대 1.8%). 두개내 출혈의 발생률은 이 약과 아스피린 투여군에서 더 높았으나(1.4% 대 0.8%). 치명적인 출혈 및 출혈성 뇌졸중의 발생률은 두 군 사이에 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다(치명적인 출혈: 1.1 % 대 0.7%, 출혈성 뇌졸중: 0.8% 대 0.6%).

	발생 건수 (발생률 %)*		Hazard Ratio (%) (95% CI)	p - Value
출혈	클로피도그렐 + 아스피린 (n=3,772)	위 약 + 아스피린 (n=3,782)		
주요한 출혈 ^{ab}	251 (6.7)	162 (4.3)	1.6 (1.3 to 1.9)	< 0.0001
중증의 출혈 ^{ab}	190 (5.0)	122 (3.2)	1.6 (1.3 to 2.0)	< 0.0001
치명적인 출혈	42 (1.1)	27 (0.7)	1.6 (1.0 to 2.5)	0.0680
두개내 출혈 ^{ab,b}	54 (1.4)	29 (0.8)	1.9 (1.2 to 2.9)	0.0056
경미한 출혈	408 (10.8)	175 (4.6)	2.4 (2.0 to 2.9)	< 0.0001
모든 출혈	1014 (26.9)	661 (17.2)	1.7 (1.5 to 1.8)	< 0.0001

* 판정된 사례

출혈은 아니었으나 출혈성 뇌졸중으로 판단된 환자 1명 포함

° 클로피도그렐 + 아스피린 군에서 연령에 따른 주요한 출혈의 발생률：65세 미만=3.3%, 65 ～ 75세=7.7%, 75세 이상=8.3%, 아스피린 단독 군에서의 연령에 따른 주요한 출혈의 발생률：65세 미만=1.9%, 65 ～ 75세=3.9%, 75세 이상=6.0%

° 출혈성 뇌졸중과 경막하 혈종을 포함하는 두개내 출혈

－ ACTIVE-W 연구에서, 주요한 출혈의 발생은 이 약과 아스피린 병용투여군과 경구용 항응고제 투여군 간에 유의한 차이가 없었다. 치명적인 출혈은 두 군에서 모두 낮게 보고되었다 (0.21 대 0.33%). 출혈의 총 발생률은 경구용 항응고제 투여군에 비해 이 약과 아스피린 병용 투여군에서 유의하게 높게 나타났다.

	발생 건수 (발생률 %)		Hazard Ratio (%) (95% CI)	p - Value
출혈	클로피도그렐 + 아스피린 (n=3,335)	경구용 항응고제 (n=3,371)		
주요한 출혈 ^a	101 (3.03)	93 (2.76)	1.09 (0.82 to 1.45)	0.5101
중증의 출혈 ^a	69 (2.07)	63 (1.87)	1.10 (0.78 to 1.55)	0.5554
치명적인 출혈	7 (0.21)	11 (0.33)	0.64 (0.25 to 1.65)	0.3569
두개내 출혈 ^{ab}	13 (0.39)	23 (0.68)	0.52 (0.26 to 1.05)	0.1012
경미한 출혈	208 (6.24)	238 (7.06)	0.88 (0.73 to 1.06)	0.1761
모든 출혈	644 (19.31)	558 (16.49)	1.20 (1.07 to 1.34)	0.0026

* 판정된 사례

출혈은 아니었으나 출혈성 뇌졸중으로 판단된 환자 1명 포함

ACTIVE-A 연구와 ACTIVE-W 연구는 각각 ACTIVE 프로그램에 속한 개별 연구로서, 한 가지 이상의 혈관성 사건의 위험인자를 가지고 있는 심방세동 환자를 대상으로 하였다. 이들 환자 중, 피험자 등록 기준에 근거하여, Vitamin K 길항제와리파린 등을 투여 받기에 적합한 환자는 ACTIVE-W 연구에 배정되었고, Vitamin K 길항약을 투여 받기에 적합하지 않은 환자(Vitamin K 길항약을 투여 받을 수 없거나 환자가 원하지 않는 경우는 ACTIVE-A 연구에 배정되었다. ACTIVE-W 연구 결과, Vitamin K 길항약이 이 약과 아스피린 병용투여군에 비해 더 효과가 높았다.

2) 혈액학적 장애(호중구감소증/무과립구증 등)

－ CAPRIE 연구에서, 중증의 호중구감소증(<0.450 G/L)이 6례 발생하였는데, 이중 이 약 투여군에서 4례(0.04 %), 아스피린 투여군에서 2례(0.02 %) 발생하였다.

이 약을 투여한 환자 9,589명중 2명의 호중구 수치가 0이었다나, 아스피린을 투여한 9,586명의 환자에서는 이러한 증상이 나타나지 않았다. 이 약 투여군의 생명의 환자 중, 1명은 세포독성 화학요법을 받고 있었으며 다른 1명은 이 약의 일시적 중단 후 회복하여 임상시험에 복귀하였다.

※ 이 약과 화학적으로 유사한 티클로피딘에 의한 중증의 호중구감소증 발생률은 0.8 %이었다(<0.450 G/L). 재생불량성 빈혈이 이 약 투여군에서 1례 발생하였다. 중증의 혈소판감소증(<80 G/L) 발생률은 이 약 투여군에서 0.2 %, 아스피린 투여군에서 0.1 %였으며, 혈소판 수가 30G/L 이하로 감소한 사례는 매우 드물게 보고되었다.

－ CURE 연구에서, 혈소판감소증 발생률은 이 약과 아스피린 투여군에서 19명, 위약과 아스피린 투여군에서 24명, 무과립구증 발생률은 각각 3명씩으로 유사하게 나타났다. 이 약의 골수독성 위험은 상당히 낮지만, 이 약을 투여한 환자에서 열 또는 다른 감염 증상이 나타날 경우에는 골수독성의 가능성을 고려해야 한다.

3) 위장관계 증상

－ CAPRIE 연구에서, 전반적으로 이 약을 투여한 환자에서 위장관계 증상에, 복부통, 소화 불량, 위장염 또는 변비)의 발생빈도는 27.1 %인데 비해, 아스피린을 투여한 환자에서는 29.8 %였다. CURE 연구에서의 위장관 증상의 발생빈도는 이 약과 아스피린 투여군에서 11.7 %, 위약과 아스피린 투여군에서 12.5 %였다.

－ CAPRIE 연구에서, 소화성위 또는 심미지장) 재발의 발생빈도는 이 약 투여군은 0.7 %, 아스피린 투여군은 1.2 %이었다. CURE 연구에서는 소화성위 또는 심미지장) 재발의 발생빈도는 이 약과 아스피린 투여군에서 0.4%, 위약과 아스피린 투여군에서 0.3 %였다.

－ CAPRIE 연구에서, 설사는 아스피린 투여군에서 3.4 %인데 비해 이 약 투여군에서는 환자의 4.5 %에서 보고되었다. 하지만, 중증은 거의 나타나지 않았다(이 약 투여군 0.2 %, 아스피린 투여군 0.1 %). CURE 연구에 의하면, 설사가 이 약과 아스피린 투여군에서 2.1 %, 위약과 아스피린 투여군에서 2.2 % 나타났다.

－ CAPRIE 연구에서, 위장관계 이상반응으로 투여를 중단한 환자의 빈도는 이 약 투여군에서 3.2 %, 아스피린 투여군에서는 4.0 %였다. CURE 연구에 의하면, 위장관계 이상반응으로 인해 투여가 중단된 환자의 빈도가 위약과 아스피린 투여군에서 0.8 %인데 비해서 이 약과 아스피린 투여군에서는 0.9 %였다.

4) 발진 및 기타 피부 질환

－ CAPRIE 연구에서, 이 약을 투여한 환자군의 피부 및 피부 부속기관에서 이상반응 발생빈도는 15.8 %였고(중증 이상반응 0.7 %). 아스피린을 투여한 환자군에서는 13.1 %였다(중증 이상반응 0.5 %). CURE 연구에서의 피부 및 피부 부속기관의 이상발생 빈도는 이 약과 아스피린 투여군에서는 4.0 %, 위약과 아스피린 투여군에서는 3.5 %였다.

－ CAPRIE 연구에서, 피부 및 피부 부속기관의 이상반응으로 이 약의 투여를 중단한 환자의 전반적인 발생 빈도가 1.5 %인 반면, 아스피린 투여군에서는 0.8 %였다. CURE 연구에 의하면, 피부 및 피부 부속기관의 이상반응으로 약의 투여를 중단한 환자의 발생 빈도가 이 약과 아스피린 투여군에서는 0.7 %, 위약과 아스피린 투여군에서는 0.3 %였다.

5) CAPRIE의 임상 연구에서 이 약과의 관련성과 관계없이 이 약을 투여받은 환자군에서 그 발현율 이 25 % 이상인 이상반응은 아래표와 같다. 평균 치료기간은 20개월이었다. 최장 치료기간은 34일이었다.

* CAPRIE 연구에서, 이 약을 투여한 환자군에서 2.5 % 이상 나타난 이상반응

	% 빈도 (% 중환)	
증상	클로피도그렐 (n=9,599)	Aspirin (n=9,586)
전신		
홍통	8.3(0.2)	8.3(0.3)
사고성 상태	7.9(0.1)	7.3(0.1)
인물투명자 유사질환	7.5(<0.1)	7.0(<0.1)
통증	6.4(0.1)	6.3(0.1)
피로	3.3(0.1)	3.4(0.1)
심혈관계		
부종	4.1(<0.1)	4.5(<0.1)
고혈압	4.3(<0.1)	5.1(<0.1)
중추 및 말초신경계		
두통	7.6(0.3)	7.2(0.1)
현기증	6.2(0.2)	6.7(0.3)
소화기계		
복부통	5.6(0.7)	7.1(1.0)
소화불량	5.2(0.6)	6.1(0.7)
설사	4.5(0.4)	3.4(0.3)
구역	3.4(0.5)	3.8(0.4)
대사 및 영양		
고콜레스테롤혈증	4.0(0)	4.4(<0.1)
근육－골격기계		
관절통	6.3(0.1)	6.2(0.1)
요통	5.8(0.1)	5.3(<0.1)
혈소관, 출혈 및 응고		
지반/자상	5.3(0.3)	3.7(0.1)
비출혈	2.9(0.2)	2.5(0.1)

제품명	클로펙트정	기타사양	35mm 35mm 전문의약품 AG250612 20X20mm *인쇄시 가이드삭제 클로펙트정 클로피도그렐황산염
자재	매뉴얼팩 설명서	양면	
개정번호	AG250612	수정사항	
규격 / 접지규격 (mm)	204×385 / 35×35	이전 히스토리 '지식참고' 참고 250612 제조자 변경에 따른 변경: 규격, 기타 첨가제, 제조자 / 포장단위 추가: 100정/병 / 13.의약품동등성 시험정보 추가	
재질 / 코팅 / 후가공	캠퍼스지50g / - / -		
컬러	■ K		
글자크기	6pt		
라벨/케이스	7pt 이상 제품명, 유효기한(사용기한), 유효성분 명칭 및 분량, 전문의약품 , 일반의약품 6pt 이상 이 외		
설명서	전문의약품 : 6pt 이상 / 일반의약품 : 7pt 이상 줄 간격 0.5pt 이상		

인국약품