

웰타민®

(Welltamin Soft Cap.)

인간은 일상생활에서 다양한 신진대사를 하며 이에 따른 여러 종류의 활성산소를 생성하게 되는데 이렇게 생성된 활성산소는 체내 세포를 손상시켜 각 기관의 세포기능장애를 일으키고 이로 인해 노화를 촉진시킬 뿐만 아니라 혈액순환장애, 고지혈증, 관상동맥질환 및 신경계손상과 같은 다양한 성인병의 진행을 초래합니다.

웰타민®연질캡슐은 인체에 유해한 활성산소와 유리기를 제거시켜주는 항산화 물질인 코엔자임Q10과 베타카로틴, 비타민C(아스코르브산), 비타민E(토코페롤아세테이트), 셀레늄, 아연 등이 이상적으로 배합된 항산화영양제입니다. 특히 코엔자임Q10은 체내에서 에너지 생성 및 생리기능에 관여하는 보조효소로서 생명활동의 기본이 되는 에너지인 ATP를 공급하여 인체의 활력과 피로회복에 도움을 주며, 항산화작용에 의해 노화를 지연하고 각종 질환을 예방합니다.

웰타민®연질캡슐은 코엔자임Q10과 항산화 비타민인 베타카로틴, 비타민C 및 비타민E와 셀레늄, 아연 등의 항산화 무기질의 상승작용으로 강력한 항산화작용과 에너지 생성 및 영양공급, 혈액순환 촉진작용을 발휘함으로써 혈액순환장애 및 갱년기 증상을 개선하고, 육체피로, 체력저하 및 노년기에 영양과 에너지를 공급하여 활력을 줄 뿐만 아니라, 노화 및 각종 성인병을 예방하고 건강한 생활을 유지할 수 있도록 도와 줍니다.

- **원료약품의 분량** : 1캡슐 중
- | | |
|---------------------|---------------------|
| 유비데카레논(코엔자임Q10)(KP) | 5mg |
| 토코페롤아세테이트(KP) | 200mg(비타민E로서 200IU) |
| 아스코르브산(KP) | 500mg |
| β-카로틴현탁액30%(KP) | 10mg(β-카로틴으로서 3mg) |
| 산화아연(KP) | 17.43mg(아연으로서 14mg) |
| 셀레늄가루0.1%(KP) | 25mg(셀레늄으로서 25μg) |
- 첨가제(타르색소) - 청색1호, 적색40호

■ **성 상** : 적갈색의 내용물을 함유한 암적색의 연질캡슐

■ **효능 · 효과**

- 다음경우의 비타민 A, C, E의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능,효과는 다음과 같다
 - 눈의 건조감의 완화
 - 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
 - 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소 침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈 · 비출혈(코피) 예방
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)
- 아연의 보급

■ **용법 · 용량** : 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

■ **사용상의 주의사항**

- 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 12개월 미만의 젖먹이
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
인신염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ①외국에서 임신전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
 - 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
- 통풍환자 또는 신장결석에 있는 환자
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 설사, 변비, 위부불쾌감, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부부)통증, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 저혈압, 폐부종(부기)
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성 의 골다공증(뼈영양성증) 위험을 높일 수 있다.
 - 항알도스테론제, 트리암테네과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다.
 - 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당 지지치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

■ **제조원** : 삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52 (제조외리지)

※ 주의

- 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- PTP포장을 개봉하여 복용시 가림 캡슐제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐제에 포장물이 있는지 꼭 확인하고 복용하십시오.
- 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

※ 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2015. 12. 29) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.

연질캡슐은 제형이 특수하므로 보관상태(온도 30℃이상, 상대습도 75%이상)에 따라 젤라틴 피막이 변형될 수 있습니다. 직사일광을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하시고, 특히 제품 개봉 후에는 인습에 주의하여 보관하십시오.

12015
WQC-03-11-1171



판 매 원
삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)
공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52
☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6