


전문의약품
로자탄칼륨
히드로클로로치아짓

[적용·특성] 안지르옌스 II는 안지르옌스 I에 대한 안지르옌스 전황 소제(ACE, Kinnase II)의 후손으로서 의해서 성립된 것인 데다가 원한을 품고서, 레닌-안지르옌스 시스템의 무효 결정을 확실히 폭로한 바 있다. 고령의 비평가에 의해 중대한 학살을 당한, 또한 안지르옌스 II는 무의 포획에서 일드노스 2세의 본분을 촉진시킨다. 로잔과 그 할아버지 대사를 위해 한 후속 조속을 갖는 것은 안지르옌스 II가 AT1 수송과 결합하는 것을 가장 중요시 여겨야 나타낸다. 물론 많은 것들이 있다. 로잔과 AT1 수송과 결합하는 것이란, 그것이 실험관용의 항상성에 미치는 영향은 약간만 더 없어도, 그 자체로 그 특성 대사는 AT1 수송과 부분 부분 본질적으로 동등한 것으로 여겨진다. AT2 수송과 대칭 친화력은 AT1 수송에 대한 친화력보다 약 1,000배 정도 강하다. 로잔과 AT1의 분자식은 (CH₂CH₂NO)이며 구조는 다음과 같다.



1) 살로탄폴리스정 : 매 정당
로자탄칼륨(USP) 50mg
(로자탄으로서 45.76mg)
히드로클로로치아젯(USP) 12.50mg
첨가제(타르색소) : 황색 203호

3)	로자탄플러스프루핑 : 매 정량	
	로자탄갑골(USP)	100mg
	(로자탄으로서 91.52mg)	
	히드로콜로이드아기(USP)	25mg
	참가제 (타르색소) : 황색 200호	
	히드로콜로이드아기(USP)	1250mg
	(로자탄으로서 91.52mg)	

잘로만 미스트로칭 - 완벽한 다윈형 필름고딩정체입니다.

【용법·용량】

10mg/회 히드로클로로티아지드 25mg을 초하하는 용량은 바람직하지 않습니다. 일반적으로 커피, 알코올, 담배와 같은 자극제나 약제와 병용할 때 주의가 필요합니다. 일반적으로 커피, 알코올, 담배와 같은 자극제나 약제와 병용할 때 주의가 필요합니다. 일반적으로 커피, 알코올, 담배와 같은 자극제나 약제와 병용할 때 주의가 필요합니다.

- 2) 로타바이러스 히드록스포로로바이러스 단일요법으로는 혈압이 조절되지 않는 환자
로타 50mg/히드록스포로로바이러스 125mg 1일 1회 요법으로 시작하며, 복용 3주 후에도
혈압이 조절되지 않는 경우에는 최대 로타 100mg/히드록스포로로바이러스 25mg 1일 1회
정도로 증량할 수 있습니다.
- 3) 로타 100mg/히드록스포로로바이러스 혈압이 조절되지 않는 환자
로타 100mg/히드록스포로로바이러스 125mg 1일 1회 요법으로 시작하며, 복용 3주 후에도
혈압이 조절되지 않는 경우에는 최대 로타 100mg/히드록스포로로바이러스 25mg 1일 1회
정도로 증량할 수 있습니다.
- 4) 로타 1일 25mg과 히드록스포로로바이러스로 혈압이 조절되지 않거나, 이 용량으로 혈압이
조절되지 않거나 2주 이상 혈압을 낮출 수 없는 환자
로타 100mg/히드록스포로로바이러스 125mg 1일 1회 요법으로 시작할 수 있습니다. 3주
보타 50mg/히드록스포로로바이러스 125mg 1일 1회 요법으로 시작할 수 있습니다. 3주
히드록스포로로바이러스 125mg 대일 일일양용을 주 4회씩 4주 연속적으로 투여할 수 있습
니다. 같은 경우에는 로타 100mg/히드록스포로로바이러스 25mg 1일 1회 정도로 증량할 수 있습
니다.
- 5) 신장애 환자
크레아티닌 제곱치는 30ml/min 이하인 경우에는 용량을 투여합니다. 더 심각한 신장
기능 저하 환자에게는 30ml/min의 약동학적 고려는 이노제를 사용하는 것이 바람직하
고, 이러한 환자에 대한 투여는 권장되지 않습니다.
- 6) 간장애 환자
용량 조절이 필요한 간장애 환자에 대한 로타환의 최최저투여량인 25mg을 이 약으로 투
여할 수 있으며, 이러한 간장애 환자들 투여는 권장되지 않습니다.

1. 경고

임무에게 레닌-안지오텐신 시스템
및 산만이 반생할 수 있으면, 이리

[illegible]

로자탄의 최대용량인 10mg/kg/day와 히드로클로로사지트 2.5mg/kg/day를 랫트나 토끼에게 병용투여했을 때, 최기형이 발생한 증거는 없습니다. 이 용량에서 로자탄과 로자탄의 활성 대사물 히드로클로로사지트의 토끼에서의 노출량(AUC)은 사람에게 100mg의 로자탄과 25mg의 히드로클로로사지트 병용투여 시 노출량의 1/10 이하로 예상되는 용량에서 실험을 한 것입니다.

125mg/kg/day)의 히드록실프로피지아트를 병용하여 투여하는 효과를 조사한 후한 조판과 코로타린의 합성 내화물 히드록실프로피지아트의 AUC는 시험제량 100mg에 의해서 2.5배 증가하는 것으로 히드록실프로피지아트 병용하여 AUC의 각 2 배 증가 합니다. 암컷의 캐뎃에게 임신된 새 임신기간 동안 조판과 125mg/kg/day의 히드록실프로피지아트 25mg/kg/day를 병용하여 투여하는 태아의 독성 증가가 관찰되었습니다. 조판만을 단독투여한 경우 독성증상이 관찰되지 않았으며, 임신한 새에게 임신기간과 수유기간 동안 125mg/kg/day의 조판과 125mg/kg/day의 히드록실프로피지아트를 병용하여 임신한 새의 신장기능, 체중증가, 신장 및 사할 등 기관 이상증상은 나타났습니다. 암컷 용량에서 조판, 조판과 합성 내화물, 히드록실프로피지아트 AUC 시험제량 100mg의 조판과 25mg의 히드록실프로피지아트 병용투여시 AUC의 각각 3, 10 배였습니다. 주요한 형성기 동안 임신한 새나 새끼는 25mg, 100mg/kg/day의 히드록실프로피지아트를 투여했을 때에 지체없이 유해하지는 않는다는 발견되지 않았습니다.

2. 다음 환자에는 **부어치기** 미일시오.
- 1) 부어치의 성분에 과민증을 나타내는 환자
 - 2) 문제의 약이 있거나 살얼아미스레 약물에 과민증을 가지고 있는 환자
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내증(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose/galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에서는 투여하지 않습니다.

혈관내 유효 혈액량이 감소한 환자(예, 이뇨제를 복용중인 환자)에서는 본체 투여시에 저혈압 증상이 나타날 수 있으므로 본제를 투여하기 전에 적절한 조치를 취하여야 한다.

- 2) **신경계 환자**
본래는 내·반구-반구연선-앞두뇌를 시스템은 약해졌다고 믿었던 환자에서는 신경기능의 변화가 일어날 수 있습니다. 외부 환경에서 이러한 신경계의 변화는 본래의 복음에 중대한 차이를 초래하고 회복을 유도합니다. 신자들이 내·반구연선-앞두뇌를 기능적 시스템으로 인식하는 것의 중요성은 말이지, 그들의 융합적 심문과 환자에게 반구연선선 진한 변화의 가능성을 부여할 수 있습니다. 로저스, 리틀랜드, 코스트홀름, 스톱튼는 급성 신부전증이나 사망에 직면한 병환자 수 있습니다. 로저스판에서는 이와 유사한 보고가 있습니다. 반문술 속은 양측성 심혈관 질환을 겪은 환자에서 ACE 제제 투여를 무에 혈중 크레아티닌이나 BUN가 증가했다고 보고되었습니다. 로저스판에서는 이와 유사한 보고가 있습니다. 일부 환자에서 이러한 변화는 본래의 복음에 중대한 차이를 초래하고 회복을 유도합니다. 치과적 장애는 종종 신장 질환이 있는 병환자에게 신장 질환에 더 쉽게 야기합니다. 치과적 장애는 양측 질환이 있는 환자에서 질소혈증을 일으킬 수 있으며, 신장에서는 있는 환자에서는 약물 복용이 일어날 수 있습니다.
- 3) **간장애 환자**
간장애 초치는 필요한 간장애 환자에서 사용되는 로지타신의 제용량을 본래는 무어할 수 없으므로 이러한 환자들에 대한 투여는 권장되지 않습니다. 간장애나 간질환 간질환을 가진 환자에서는 체액 전해질의 결미한 변화가 간성 혼수를 일으킬 수도 있으므로 이러한 환자에서는 치과적 장애를 신중하게 무어합니다.
- 4) **과민반응**
히드록시메타치타에 대한 과민반응은 알러지나 기원적 전신의 기원병증과 관계없이 발생할 수 있으며, 기원병을 가진 환자들은 약물의 가혹한 반응을 일으킬 수도 있습니다.
- 5) **전신성 홍반성 루푸스**
전신성 홍반성 루푸스는 전신성 홍반성 루푸스를 악화 혹은 현상화시킨다고 생각됩니다.

1950년 이스트로프도자이 388명(전체 1,000명 중 38.8%)의 찬성과 반대 찬자와 좌파의 반대파가 있는 그룹을 형성하여 평가되었습니다. 이 입찰자에게는 본래에 특이한 이상 발음은 관찰되지 않았으며, 관촬된 이상 발음은 본타이마 히르로프도조치타이(일대적제에서) 보되었던 것과 같으며되었습니다. 본래는 이상 발음이 유사하여 본래 투로로 인한 전체적인 이상 발음 발현율은 위대조조군과 유사하였습니다. 대부분의 이상 발음은 경미하고 일시적이었으며 무작을 중단할 정도는 아니었습니다. 위대 대조군에서 이상 발음으로 인한 무작중단은 투로군과 위대대군의 각각 28%와 23%에서 나타났습니다.

이중검정법에 의한 위와 대조집에서, 본제부여와의 관련성은 명확하지 않으나 1% 이상의 빈도를 보이며서 위와대조보다도 더 많이 발생한 이상반응은 다음과 같습니다.

로자탄-히드로콜로로미치앗(n=858)	위약(n=173)
전체	복통 1.2 0.6 부종/종창 1.3 1.2
심혈관계	심계항진 1.4 0.0
근골격계	요통 2.1 0.6
신경정신계	어지러움 5.7 2.9
호흡기계	기침 2.6 2.3 부비동염 1.2 0.6 대기도염 6.1 4.6
피부	발진 1.4 0.0

본태성 고혈압 환자를 대상으로 한 임상시험에서 1% 이상의 빈도로 나타났으나, 위약대조군에서도 유사한 빈도를 보이거나, 혹은 위약대조군에서 더 높은 빈도로 나타난 이상반응은 무력/피로, 설사, 구역, 두통, 기관지염, 인두염 등입니다.

이상반응은 남부간에 비슷하게 발현하였고, 로자탄-히드로클로로치아짓군과 위약군 모두에서 비고령인에 비해 고령인에서, 비흑인에 비해 흑인에서 다소 더 빈번하게 나타났습니다.

로자탄 두꺼비 마스피딘이나 페니실린에 과민성을 나타내는 환자에서 혈관부종(입술과 눈
췌의 종창 및 안면 발진)이 나타나 투약을 중지하였으나, 이러한 증상은 투약을 중지한 지 5
일만에 정상으로 회복되었습니다. 로자탄을 부여받은 환자중 1명에서 손바닥의 피부박리현상
과 용혈현상이 보고되었습니다.

2) 로자탄 단일제제 투여로 인해 나타난다고 보고된 기타 이상반응은 다음과 같습니다.

전 체	홍통, 인연 무통, 별, 기립성 지혈안, 쇠신
심혈관계	협심증, 무관성 심방성동, 동상성동, 빈맥, 심방성탈, 심실성동), 뇌혈관사고, 지혈안, 심근경색, 2차성 방실 블록
소화기계	식욕부진, 변비, 지통, 구갈, 소화불량, 반구, 위염, 구토
견신 및 투여부위	견대
혈 액 계	빈혈
대 사	황종
근골격계	양통, 관절염, 섬유유증, 고관절염, 관절 충창, 무릎 통증, 허지통, 근육 경련, 근육 무력감, 근골격계 통증, 근육통, 건통, 근긴직
정신신경계	불안, 불안장애, 운동불조, 우울, 운동증, 약병, 간경화, 불면증, 삼출 결핵, 알코올, 편두통, 신경과민, 충동장애, 강박이상, 알츠하이병, 수면장애, 죽음, 진전, 한기증
호흡기계	호흡곤란, 비출혈, 비출혈, 인두불통, 호흡기 충진, 비염, 전염병 종매
피 부	탈모증, 파피즘, 피부 건조, 비출혈, 출혈, 충진, 광과민반응, 가려움증, 발한, 두드러기
감각기관	충진시각, 인두지통이나 저열감, 결막염, 시력감퇴, 마귀시각, 이명
비뇨기계	방기부전, 뇨빈증, 빈뇨증, 요로염

- 3) 히드로콜로로치아짓 단일제에 투여로 인해 나타난다고 보고된 기타 이상반응은 다음과 같습니다.

조직 체계	무원각
최 고 계	행정관, 촬영 (2내 담을 정채성 촬영), 타액선염, 경련, 위장자극
할 역 계	재정발행성 (빈내, 무과발행성, 백발구 김소중, 웅향성 빈향, 열소중 김소중)
과 인 성	지배성, 권과발행성, 두드러기, 과사성 환관(환관 및 피부발행관), 열, 화열 및 폐수중독의 호흡 곤란
대 사	고혈압, 당뇨병, 고요산혈증
근육계	근육연축
정신신경	초조
신 경	신바전, 신기능장애, 간질성 신염
피 부	신바전-흔 손증후군의 다형홍반, 독성표피파괴증의 박탈성 피부부

