

모프리트®정 5mg

구연산모사프리트

전문의약품

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.

작용 · 특성: 모프리트 정은 선택적 5-HT₄ receptor agonist 작용을 통해 acetylcholine의 분비를 증가시켜 소화관 운동을 촉진시키는 위장관 운동 개선제입니다.

모프리트 정은 기능성 소화불량(만성위염)에 수반하는 증상을 개선시켜 삶의 질을 향상시킵니다.

모프리트 정은 cisapride와 달리 심장의 HERG K⁺ channel에 대한 영향이 거의 없고, dopamine D₂ antagonist 활성이 없습니다.

모프리트 정은 식사와 관계없이 식전 또는 식후 모두 복용 가능합니다.

조성 · 성상: 1. 원료약품의 분량 : 매 정당

구연산모사프리트(별규)..... 5.29mg
(구연산모사프리트 무수물로서 5mg)

2. 성상 : 이 약은 흰색의 장방형 필름코팅정제입니다.

효능 · 효과: 기능성소화불량(만성위염)에 수반하는 소화기능이상(가슴쓰림, 오심, 구토)

용법 · 용량: 통상, 성인에게는 구연산모사프리트 무수물로서 1일 15mg을 3회 나누어 식전 또는 식후에 경구투여합니다.

사용상의 주의사항: 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

주의사항 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이상반응

998례 중 40례(4.0%)에서 이상반응이 나타났습니다. 주요한 이상반응으로는 설사·연변(1.8%), 구갈(0.5%), 권태감(0.3%) 등이 있습니다. 임상검사치에서는 792례 중 30례(3.8%)에서 이상변동이 보였습니다.

주요 내용으로는 호산구증가증(1.1%), 중성지방의 상승(1.0%), AST(GOT), ALT(GPT), ALP 및 γ -GTP의 상승(각 0.4%) 등이 있습니다.

1) 중대한 이상반응

극중간염, 간기능장애와 황달(각 0.1% 미만) :

극중간염, 현저한 AST(GOT), ALT(GPT), γ -GTP의 상승 등을 동반한 심각한 간기능장애, 황달이 나타나는 경우가 있고, 사망에 이른 예도 있으므로, 충분히 관찰하고, 이상이 확인되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 적절한 처치를 실시합니다.

2) 기타 이상반응

과민증 : 발진, 두드러기, 때때로 부종

혈액계 : 때때로 호산구증가, 백혈구감소

소화기계 : 복부팽만감, 구강마비(혀와 입술을 포함), 때때로 설사, 연변, 구갈, 복통, 구역, 구토, 미각이상

간장 : 때때로 ALP의 상승, 빌리루빈 상승

순환기계 : 때때로 심계항진

정신신경계 : 때때로 어지러움, 취청거림, 두통

기타 : 떨림, 때때로 권태감, 중성지방의 상승

3) 국내 시판후 조사결과

국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 745명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사결과 이상반응의 발현증례율은 인과관계 여부와 상관없이 1.9%(14례/745례)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 1.3%(10례/745례)입니다. 이상반응은 인과관계 여부와 상관없이 복통, 설사 각 4례, 묽은 변 3례, 오심 2례, 복부팽만, 소화불량, 유즙과생산, 권태, 발진 각 1례로 나타났습니다. 이 중 시판전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 소화불량, 유즙과생산이 각 1례씩 보고되었습니다.

3. 일반적 주의

일정기간(보통 2주) 투여하여도 소화관 증상의 개선이 보이지 않을 경우 장기간 투여하지 않습니다.

4. 상호작용

본제의 소화관운동촉진작용은 콜린작동성 신경과의 관련성으로 인해 항콜린제(항산아트로핀, 브롬화부틸스코폴라민 등)와 병용 투여 시 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 복용 간격을 두는 등 병용에 주의해야 합니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 적격업소 제품

I01-102510

(임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어있지 않습니다.)

- 2) 수유중에는 투여를 피하고, 부득이한 경우에는 수유를 중단합니다.
(실험동물에서 모유중으로의 이행이 보고되어 있습니다.)

6. 소아에 대한 투여

소아 등에 대한 안전성이 확립되어있지 않습니다.(사용경험이 없습니다.)

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 신기능, 간기능 등의 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하고 이상반응이 발현된 경우에는 감량(예, 1일 7.5mg)하는 등 적절한 처치를 합니다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

9. 기타

설치류에 임상통상용량의 100~300배(30~100mg/kg/일)을 장기간 경구투여한 시험(랫트 104주, 마우스 92주간)에 있어 종창(간세포선종 및 갑상선여포성 종창) 발생률의 상승이 나타났습니다.

【주의】

- 1) 개봉 후에는 타제품과의 혼입 및 혼용이 되지 않도록 주의하십시오.
2) 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
3) 개봉 후 충전물이 있을 경우 완전히 제거하고 사용하시기 바라며, 뚜껑을 잘 닫아 보관하십시오.
4) 실리카겔을 먹지 마십시오. 실리카겔이 물에 닿으면 화상을 입을 수도 있으니 주의하시기 바라며, 제품에 실리카겔이 혼입되어 있는 경우 구입처를 통하여 교환하십시오.
5) 제품 개봉시 또는 취급시 화재재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

저 장 방 법 : 밀폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

포 장 단 위 : 30, 100, 300정

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.



종 근 당

본사 : 서울특별시 서대문구 총정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 서북구 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)

이 첨부문서 작성일자(2010. 9. 14)이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.