

레보드로 정

(Levodropropizine 60mg)

【원료약품분량】 1정 중

레보드로프로피진 (E,P) 60mg
 유당수화물 (KP) 기원:동물유래(건강한 소의 우유)

【성 상】 흰색의 원형정제

【효능 · 효과】 다음 질환에서의 기침 : 급 · 만성기관지염

【용법 · 용량】

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60 mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.
 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 기관지 점액 분비 증가 환자
 - 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 중증의 간장애 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
 - 고령자
 - 만 2세 미만의 영아
- 이상반응
 - 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
 - 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
 - 순환기계 : 심계항진
 - 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응
- 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.
- 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

- ※ 의약품을 사용하시기 전에 본 설명서를 주의깊게 읽어주시기 바라며, 설명서는 반드시 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 때는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 자세한 내용은 자사로 문의하시기 바랍니다.
 (소비자상담실 : 02-6925-4064)
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 설명서 (재)작성일 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(<http://www.pharmaking.co.kr>)에서 확인 하실 수 있습니다.

(재)작성일 : 2014. 05. 12