

기관지천식, 만성기관지염

바미필정 (바미필린염산염 300mg)



일양바이오팜

충북 제천시 바이오밸리 3로 8
전문약품 | 분류번호 : 222 (진해 거담제)

의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

바미필린염산염 (별규)300.0mg

[성 상] 흰색의 원형평동코팅정제

[효능·효과] 1. 다음 질환에 사용할 수 있습니다.

다음 질환의 기파쇄성 장애에 의한 호흡곤란 등 여러 증상의 완화 : 기관지천식, 만성기관지염

[용법·용량] 성인 : 염산바미필린으로서 1회 600~900mg 1일 2회(아침, 저녁) 식후에 경구투여합니다.

연령, 증상 등에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 크산틴계 약물에 과민증 환자

2) 급성 심근경색 환자

3) 임부

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 심부전증 환자

2) 갑상선기능항진증 환자

3) 간기능부전 환자(필요한 경우 감량합니다.)

4) 위·십이지장궤양 환자

5) 소아(특히 영아), 고령자

6) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 부작용

때때로 두통, 위통 등이 나타날 수 있습니다. 또한 과량투여로 구역, 복부팽만감, 산통, 말초부위의 진전 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

테오필린의 경우 대표적인 부작용으로 소화기증상(특히 구역, 구토) 및 정신신경증상(두통, 불면, 불안, 흥분, 경련 등)이 나타날 수 있고 이러한 부작용은 대부분 혈중농도의 상승에 의한 것으로 알려져 있으므로 이 약의 투여시에는 혈중농도의 모니터링을 적절히 하고 환자 개개인에 적합한 투여계획을 설정하는 것이 바람직합니다.

5. 상호작용

1) 트롤레안도마이신과 병용투여하지 않습니다.

2) 에리스로마이신, 시메티딘 등과 병용투여시 상호작용이 있습니다.

3) 조사마이신은 테오필린의 약동학 변수에 영향을 미치지 않습니다.

6. 소아에 대한 투여

소아(특히 영아)는 크산틴계 약물에 민감하므로 신중히 투여합니다.

[포 장 단 위] 30정, 500정

[저 장 방 법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변해 오염되거나 손상된 제품은 약국개 설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해 에 대해 보상해 드립니다.

* 설명서 최종 작성연월일(2017.01.03) 이후 변경된 내용 및 제품에 대한 기타 자세한 사항은 고객센터 : 02-570-3972로 문의하 시거나 또는 식품의약품안전처의 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

설명서 최종 작성연월일 : 2017.01.03

PI1701-01



일양바이오팜

충북 제천시 바이오밸리3로 8
소비자상담전화번호 02-570-3972
www.ilyangbio.co.kr