

진해거담제

레인보우 정

분류번호 : 222

레보드로프로피진

전문의약품

【성분·함량】 1정중

레보드로프로피진 (EP) 60.0mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(네덜란드산 소, 우유)

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】 다음 질환에서의 기침 : 급·만성 기관지염

【용법·용량】

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구 투여하십시오.

증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타케너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계 : 심계항진
- 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있습니다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의하십시오.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 마십시오.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의하십시오.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **【포 장 단 위】** 30정, 300정

* 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

* 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

* 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.

* 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청에 알리도록 하십시오.

* 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

* 이 첨부문서 작성일자(2012년 1월 20일)이후 변경된 내용은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요.

* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.


삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 정전1동 374-1
약술/개발부 : (02)928-0661