


의약품 분류번호	322 무기질제제
-------------	--------------



일반의약품

헤모포스는 유·소아 보호를 위한 안전포장 적용 제품입니다. 절취선을 따라 자른 후 모서리 미 접착 화살표 부분을 벗기면 쉽게 약을 꺼낼 수 있습니다.



원료약품의 분량

1정 중

수산화제이철폴리말토스복염(KP).....	125.0mg
(철로서).....	35.0mg)
폴산(KP).....	0.5mg
판토텐산칼슘(KP).....	100.0mg

성상

암적색(검붉은 색)을 띠는 장방형의 필름코팅정

효능·효과

철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

용법·용량

12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회 1정 복용

사용상의 주의사항

1. 경고

철 함유제제는 6세이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 혈액소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린 침착증, 비철결핍성 빈혈

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자

- 3) 심장-순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장애(신장장애) 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
4. 이상반응
- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
: 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부-위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 혼수
 - 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 율혈성 심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
5. 일반적 주의
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
6. 상호작용
- 1) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용(사용))투여하지 마십시오. : 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
7. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아 단단히 마개로 막아) 보관하십시오.
 - 3) 오(잘못사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

포장단위

자사포장단위

저장방법

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

교환 및 제품문의

이 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.

연락처 : 고객센터팀 1588-2675

첨부문서 작성년월일 : 2015. 8. 10 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

jw 중외제약
제이더블유중외제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진길 56

수산화제이철폴리말토스복염 공급원(스위스)
Vifor
International