

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
 개정연월일 : 2014년 2월 3일

복용이 간편한 구제제

보령알벤다졸^정

(알벤다졸 400mg)

일반의약품

품목기준코드:
200607863

원료 약품 및 그분량 1정 중

알벤다졸(USP) 400mg

첨가제(타르색소) : 황색5호

*날알식별표시

표시(앞)	표시(뒤)
DIZ (할선)	

성상 연한 주황색의 장방형 필름코팅제

효능·효과 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카구충, 분선충의 감염 및 이들 혼합감염의 치료

용법·용량

1. 성인 및 2세 이상의 유·소아

1) 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충 : 400mg 1회 복용합니다.

2) 2세 이상의 유·소아의 요충증은, 200mg을 1회 복용하고 7일 후 200mg을 반복 복용할 수 있습니다.

2) 분선충 : 1일 1회 400mg 3일간 복용합니다.

3) 편충의 중증 혼합 감염시 : 1일 1회 400mg 3일간 복용합니다.

※ 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제[설사약]를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요 없습니다.

※ 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 복용을 실시 할 수 있습니다.

사용상의 주의사항

1. 경고 : 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약 구성 성분에 과민반응 환자
- 2) 임부
- 3) 2세 미만의 영아[갓난아기]
- 4) 이 약은 유당[젖당]을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당[젖당]분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

테오필린 : 테오필린의 대사를 억제할 수 있습니다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 및 약사와 상의하십시오.

이 약이 모유로 이행되는지에 관해서는 알려진 바 없으나, 이 약 복용시에는 수유를 중단하는 것이 좋습니다.

5. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

상당시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 다형홍반(붉은반점)이 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시하십시오.

2) 구역, 구토, 속쓰림, 설사, 상복부[배부분] 또는 복부[배부분] 통증 등의 위장관 장애 또는 두통 및 어지러움이 나타날 수 있습니다.

3) 드물게 발열, 발진, 전신 발적[충혈되어 붉어짐], 가려움, 두드러기 등이 나타났다는 보고가 있습니다.

4) 가역적인 탈모증이 나타날 수 있습니다.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용하십시오. 임신초기 동안에 이 약의 투여를 피하기 위해서 가임연령[나이]의 여성은 생리 첫 주 동안 또는 임신 테스트에서 음성이 나타난 후에 치료를 시작하십시오.

2) 임상검사치에의 영향: 때때로 가역적인 백혈구 수의 감소를 유발할 수 있고, 과도한 처방시 임혈구[전체혈구] 감소증 및 간효소치 이상을 유발할 수 있습니다.

3) 프라지판텔이 알벤다졸 활성대사체의 혈장농도를 증가시킨다는 보고가 있습니다.

4) 과량투여 했을 경우 대증요법[증상별로 치료하는 방법](위세척) 및 일반적인 지지 요법을 사용하십시오.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사일광의 피하여 건냉한 곳에 실온보관하십시오.

3) 오용[잘못사용]·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

포장단위 2정

저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 만약 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.

※ 본 첨부문서 개정연월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자 상담실 수신자 부담전화 080-708-8088에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(온라인의약품도서관)→ 보고마당→ 안전성보고→ 의약품유해사례보고에 알려주시기 바랍니다.

※ 본 제품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오. ※ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8088

개정연월일 : 2014년 2월 3일



BORYUNG
보령제약

제조의뢰 및 판매자 : 보령제약(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 107,109

제조사 : (주)한국파비스제약 경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 127