

28265M212012


코감기·비염 전문 치료제
코린투에스 정
(KORIN 2 S Tabs.)

일반의약품
분류번호: 141

【성분·함량】(1정 중)

유효성분：페닐레프린염산염(KP)	5mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	15mg
클로르페니라민말레산염(KP)	2mg
글리시리진산(KP)	7.5mg
카페인무수물(KP)	15mg

첨가제(타르색소)：황색 5호 알루미늄레이크

첨가제(동물유래성분)：유당수화물(소·우유)

기타첨가제：경질무수규산, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탕크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스2910

【성상】 등황색 원형의 필름코팅정

【효능·효과】

코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화：코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통(목구멍통증), 머리 무거움

【용법·용량】

· 성인 및 만 15세 이상：1회 2정, 1일 3회

· 만 8세~만 15세 미만：1회 1정, 1일 3회

※ 매 식후 복용하고 복용간격은 4시간 이상으로 하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 만 7세 이하의 영아(젖먹이, 갓난아기)·유아
- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해(기침을 그치게함)거담제(가래약), 멀미약, 알레르기용약 등)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예：발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 고혈압, 심장질환, 신장(콩팥)질환, 부종(부기), 녹내장(예：눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 뎡)곤란, 갑상선질환, 당뇨병 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 고령자(노인)
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
 - ：흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

- 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - ：출혈성뇌졸중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 뎡)곤란
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한증상) 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시)：복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
 - ② 위알도스테론증：요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있습니다.(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)
 - ③ 근병증(근육병증)：저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.
- 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시키십시오.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
- 복용 시에는 음주하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10정(10정/PTP)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래 위원회고시 "소비자 분쟁해결기준" 에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인할 수 있습니다.

※부작용 보고 및 피해구제 신청：한국의약품안전관리원(1644-6223)

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
제조의뢰자：신일제약(주)

본사：서울특별시 동대문구 사가정로 272
공장：충청북도 충주시 양성면 복상골길 28

제조사：(주)마더스제약

경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18

