



철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

고가이큐 캡슐

분류번호: 322(무기질제제)

고가이큐 캡슐(Gogai Q Cap)은...

빈혈은 임신부는 물론 남녀노소 고르게 발생하는 질환입니다. 이 중 철결핍성 빈혈은 적혈구 내에 헤모글로빈을 생성하는데 필수성분인 철분이 부족하여 나타나는 질환으로서, 철분제제의 복용으로 부족한 철분을 충분히 공급해주어야 합니다.

고가이큐캡슐은 폴리사카리드철착염(Polysaccharide Iron Complex)을 주성분으로 하는 제제로서, 위장관을 자극하기 쉬운 이온형태가 아닌 비이온상태로 흡수되기 때문에 위장장애의 부작용이 적어 임신부, 노인, 소화성 궤양환자들도 복용하기 좋으며, 체내흡수율도 매우 높은 제제입니다.


성분 · 함량 · 1캡슐 중

폴리사카리드철착염(KPC)	326.1mg
(철(Fe)로서 150.0mg)	
0.1%시아노코발라민(KPC)	25.0mg
(시아노코발라민으로서 25.0 μ g)	
폴산(KP)	1.0mg

성상 · 갈색의 분말이 충전(충전)된 상 · 하부 봉갈색의 경질캡슐재

용법 · 용량 · 성인 : 1일 1회 1캡슐을 복용합니다.

※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.



1. 절취선을 따라 자릅니다.



2. 화살표 방향으로 종이로 벗겨냅니다.



3. 볼록한 부분을 눌러 캡슐만 꺼내 복용합니다.

효능 · 효과 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

사용상의 주의사항

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자

2) 12개월 미만의 영아

3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직장에는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자

4) 비철결핍성빈혈 (예 : 비타민 B12 결핍에 의한 거대적아구성 빈혈) 환자

5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염

2) 경구용테트라사이클린계 제제

3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

녹차, 홍차등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용 중, 복용전후에는 피할 것.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자

3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자

4) 신장장애(신장장애) 환자

5) 저단백혈증 환자

6) 임부, 수유부

7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.)

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부 문서를 소지할 것.

1) 때때로 홍반(붉은 반점), 피부질환, 가려움, 전신관태, 기관지에 의한 호흡곤란 등의 알레르기 증상이 나타나는 경우

2) 두드러기, 가려움, 햇빛에 의한 피부 과민반응

- 3) 복부·위통증, 위 경련 4) 구토, 설사 5) 열, 혼수
- 6) 구역, 식욕부진, 체중감소, 부종(부기), 복통(배아픔), 설사, 변비, 흑변, 위부불쾌감
- 7) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 복부 통증, 구토, 구역, 설사, 흑변, 토혈(혈액구토), 저혈압, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기), 빈맥(빠른맥), 대사성 산증, 고지혈증, 탈수, 졸음, 창백, 권태, 발작, 속, 혼수
7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜라.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 3) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 한다. 빈혈은 혈액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 한다.
 - 4) 이 약에 함유된 엽산은 악성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만 신경증상에 효과가 없으므로 악성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민 B₁₂제제와 병용(함께 복용(사용))한다. 다만, 진단이 확립되지 않은 악성빈혈이 있는 환자의 경우에 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 되므로 주의할 것.
 - 5) 아스코르빈산(비타민 C) 200 mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것.
 - 3) 오·남용(잘못사용·함부로 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기한 외부포장에 표기

포장단위 60각슬, 120캡슬

- ※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 끝낸 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 이 설명서 작성일자(2012년 1월 5일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
- ※ 의약품 용어 및 기타 자세한 사항은 이지드럭 (ezdrug.kfda.go.kr)의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭-보고마당-안전성정보-의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

제조원

(주)서흥캡셀

경기도 부천시 소사구 송내동 315, 317

판매원

(주)유한양행

서울시 동작구 대방동 49-6