

(히드록소코발라민)

[원료약품의 분량] 1mL 중

히드록소코발라민(USP).....	2.50mg
염화나트륨(KP).....	4.1mg
아세트산나트륨수화물(KP).....	1.94mg
아세트산무수물(KP).....	적량
주사용수(KP).....	적량

[성상] 갈색 앰플내의 암적색액이 들어있는 주사제

[효능·효과]

다음 질환에 사용할 수 있습니다.

급성신경염, 다발성 신경염, 좌골신경통, 류마티양 신경통, 경견완증후군, 척수근통, 건갑관절주위염, 암 및 외상에 의한 신경통, 대상포진 및 편두통에 의한 신경통

[용법·용량]

성인 : 히드록소코발라민으로서 1회 5000 μ g, 1일 1회 근육주사 또는 정맥주사합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 비타민 B₁₂와 그 유사체에 과민증 환자 2) 악성종양 환자(조직발육에 대한 비타민 B₁₂의 작용으로 세포의 증식 속도가 증가하지만 그 위험도에 대한 자료는 확실하지 않습니다.)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

비타민 B₁₂와 그 유사체의 투여후에 나타나는 면역성 과민증은 매우 드물게 치명적일 수 있으므로 토양성 알레르기(천식 습진)를 나타내는 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

4. 부작용

1) 과민증 : 드물게 가려움증, 두드러기, 홍반, 일과성의 발진, 속등이 일어날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오. 2) 피부 : 여드름이 생길 수 있습니다. 3) 기타 : 요의 착색이 나타날 수 있습니다.

5. 적용상의 주의

근육주사시 동통을 일으킬 수 있습니다.

“주사용수가 용제로 사용되었습니다”

[저장방법]

차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

작성연월일 : 2016.11.20

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처의 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

제조의뢰자

PI1611-01



일양바이오팜

충북 제천시 바이오밸리 3로 8
소비자상담전화번호 02-570-3972
홈페이지 www.ilyangbio.co.kr

제조사

주식회사 휴온스

충북 제천시 바이오밸리로 100