

감염성 질환의 제 1차 선택제

삼의 세파클러

서방정 375mg

분류번호 : 618

전문의약품

【성분·형량】 1정 중 세파클라수화물(KP) 375.0mg(약가) 첨가물(타르색소) : 청색 1호, 청색 2호, 적색 40호

【성 상】 청색의 장방형 서방정제

【효능·효과】

- 급성기관지염 및 만성기관지염의 재발 : 폐렴연쇄구균, 인플루엔자균(베타락타마제 생성균 포함), 파라인플루엔자균, 모락셀라 카타랄리스(베타락타마제 생성균 포함), 황색포도구균
- 인두염 및 편도염 : 스트렙토кок쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성)
- 하부요로의 단순 감염증(방광염 및 무충후성 세균노증 포함) : 대장균, 폐렴간균, 프로테우스 미라빌리스, 스태필로кок쿠스 사포피토кок쿠스
- 피부 및 연조직 감염증 : 스트렙토кок쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성), 황색포도구균(베타락타마제 생성균 포함), 표피포도구균(베타락타마제 생성균 포함)

【용법·용량】

세파클라수화물 1일 2회, 1회 375mg(약가)을 경구투여하십시오.
스트렙토кок쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성)에 의한 감염증의 치료에는 이 약을 10일 이상 계속 투여하여야 합니다.
정제는 전체를 복용해야 하며 부수거나 갈거나 씹어서는 안됩니다.
연령, 증상에 따라 적절한 증감하십시오.
이 약은 식사와 관계없이 경구 투여하십시오. 그러나 음식과 함께 섭취할 경우에는 흡수가 증가됩니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약에 의하여 속의 병력이 있는 환자
 - 2) 이 약 또는 세팔로스포린계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 페니실린계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 2) 본인은 또는 부모형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자
 - 3) 중증의 신장애 환자
 - 4) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하십시오.)
 - 5) 위장관질환의 병력이 있는 환자(특히 대장염)
3. 이상반응
 - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 증상이 나타나는 경우에는 투어를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 - 2) 과민반응 : 아·폐렴사상 증상(전신홍조, 부종, 호흡곤란, 맥관부종, 갑작스런 실신, 고열인, 혈관확장), 발진, 두드러기, 홍반, 가려움, 발열, 림프절 종창, 관절염, 혈청병양 반응(발진, 다형홍반, 관절염, 관절통, 발열은 수반되거나 수반되지 않음.) 등이 나타날 수 있으며 이러한 증상, 징후들은 투어를 시작한 후 며칠 이내에 나타나서, 투여 종료 후 며칠 이내에 소실됩니다. 항히스타민 및 코르티코이드는 회복을 도와줍니다.
 - 3) 피부 : 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증후군이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투어를 중지하고 적절한 처치를 하십시오
 - 4) 혈액계 : 때때로 무과립구증, 과립구 감소 또한 드물게 범혈구 감소, 빈혈, 혈소판 감소, 호산구 증가, 림프구 증가, 백혈구 감소, 재생불량성빈혈, 용혈성 빈혈, 가역적 호중구 감소 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이상이 인정되는 경우에는 투어를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
 - 5) 간장 : 드물게 일시적인 간염, 황달, 때때로 AST, ALT, ALP의 상상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 투어를 중지하십시오.
 - 6) 신장 : 가역적 간질성 신염, 드물게 BUN 상승, 혈청크레아티닌 상승, 급성 신부전 등의 중증의 신장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투어를 중지하고 적절한 처치를 하십시오. 몇몇 세팔로스포린계 항생물질은 특히 신장애 환자에게 용량을 감량하지 않고 투여 시 발작이 야기될 수 있습니다. 발작이 약물치료와 관련이 있다면 약물치료를 중단해야 하고 임상적으로 필요할 경우 항경련제를 투여하십시오.
 - 7) 소화기계 : 드물게 위막성대장염 등의 합병을 유발하는 중증의 대장염이 나타날 수 있습니다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투어를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오. 또한 때때로 구역, 구토, 설사, 복통, 위부불쾌감, 가슴쓰림, 식욕 부진 등이 나타날 수 있습니다.
 - 8) 호흡기계 : 다른 세파계 항생물질 투여 시 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구 증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, 호산구성 폐렴등 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투어를 중지하고 코르티코이드 투여 등 적절한 처치를 하십시오.
 - 9) 중추신경계 : 드물게 가역적인 기능항진, 초조, 불안, 과다근육 긴장증, 신경과민, 불면, 착란, 어지러움, 환각, 졸음 등이 나타날 수 있습니다.
 - 10) 근교대증 : 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있습니다.
 - 11) 비타민결핍증 : 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있습니다.
 - 12) 기타 : 드물게 두통, 생식기 가려움, 질염, 질 모노리얼증 등이 나타날 수 있습니다.
 - 13) 서방정의 임상시험결과 추가된 이상반응은 다음과 같습니다.
불의의 상처, 식욕부진, 불안, 관절통, 천식, 기관지염, 홍종, 오한, 유행성심부전, 결막염, 변비, 어지러움, 월경통, 소화불량, 배노란과, 귀의 통증, 부종, 발열, 복부팽만감, 위염, 감염, 불면증, 질염비염, 발진, 권태, 월경불순, 근육통, 구역, 구토, 목의 통증, 신경질, 아노증, 조이염, 통증, 심계항진, 호흡곤란, 부비동염, 졸음, 땀, 떨림, 두드러기
4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직합니다.
- 2) 속 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진하십시오.
- 3) 다른 항생물질들처럼 이 약에 내성인 미생물들에 의한 중복 감염이 발생할 가능성을 고려해야 하고, 이러한 경우에는 적절한 치료법을 선택해야 합니다.
5. 상호작용
 - 1) 프로베네시드와 병용투여 시 이 약의 세뇨관 배설 속도가 감소되어 혈중농도를 지속시킬 수 있습니다.
 - 2) 마그네슘 히드록사이드 또는 알루미늄 트리하이드레이트를 포함한 제산제를 항생물질 투여의 1시간 이내에 복용하면 이 약의 흡수가 감소됩니다. H₂ 억제제는 이 약의 흡수 속도 및 흡수량에 영향을 미치지 않습니다.
 - 3) 산독성이 있는 항생물질 또는 이노제(푸로세미드, 에타크리산)를 병용투여 시 신장장애가 증가될 수 있으므로 신중히 투여하십시오.
 - 4) INR(국제정상화비율)의 변화 : 이 약을 포함한 항생물질을 항응고제와 동시에 투여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고되었습니다. 감염성질환(그리고 염증성 과정을 동반한), 환자의 연령과 일반적인 상태는 위험요소가 됩니다. 비록 이 약과 파린의 상호작용이 임상시험을 통해 밝혀지지 않았지만 INR 모니터링을 실시하여야 하고, 필요한 경우 경구용 항응고제의 용량을 적절히 조절하십시오. 항생물질의 일부 종류를, 특히 플루오로퀴놀론, 마크로라이드, 사이클린, 코트릭스테로이드와 일부 세팔로스프린의 경우는 더 심합니다.
 - 5) 경구 피임약과 병용투여 시 피임의 효과가 감소시킬 수 있으므로 다른 피임법을 추가로 사용하는 것이 바람직합니다.
 - 6) 정공성 항생물질(클로라멜리콜, 에리스로마신, 테트라사이클린 등)과 병용투여 시 이 약의 살균작용을 감소시킬 수 있습니다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
 - 2) 모유로의 소량 이행이 보고되어 있으므로 수유부에는 신중히 투여하십시오. 500mg 단일 용량 투여 후 세 파클라의 소량이 모유에서 발견되었습니다. 혈중 평균 농도는 2, 3, 5시간 후 각각 0.18, 0.20, 0.16mg/L이었으며 1시간 후에는 극미량이 되었습니다. 수유 중인 모에 이 약물의 영향은 알려지지 않았으므로 수유부는 주의하여 이 약을 사용해야 합니다.
7. 소아에 대한 투여
소아에서 효능과 내약성이 확립되지 않았습니다.
8. 고령자에 대한 투여
고령자에 투여할 때는 다음과 같은 점에 유의하고, 용량 및 투여간격에 유의하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하십시오.
9. 임상검사자에 대한 영향
 - 1) 생리기능이 저하되어 있는 경우가 많고 이상반응이 발생할기 쉽습니다.
 - 2) 비타민 K 결핍에 의한 출혈을 일으키기도 합니다.
10. 피임투여 시 처치
 - 1) 중상 : 구역, 구토, 설사, 설사, 설사 및 설사가 나타날 수 있으며 설사, 설사, 설사의 정도는 용량과 관련이 있습니다. 증상 용량의 5배가 투여 되었을 때는 위장관 세척, 활성탄 투여가 필요하며, 이때 기도를 보호해야 합니다. 다른 증상들은 이미 존재 하 있는 질병, 알레르기 반응 또는 다른 독소의 영향 때문일 것입니다.
 - 2) 처치 : 과량투여의 치료 시 여러 약물의 과량투여, 약물상호작용 및 비정상적인 약물동력학 등이 고려되어야 합니다. 환자에서 호흡이 가능하도록 적절한 기도를 확보하고 환자의 신체증상, 혈중가스, 혈청내 전해질 등을 모니터링 해야 합니다. 위장관으로의 약물 흡수는 활성탄을 투여함으로써 감소되는데 많은 경우에서 구토나 위세척보다 더 효과적임이 증명되었습니다. 위장관 세척에 추가하여 또는 위장세척을 대신하여 활성탄 사용을 고려해야 합니다. 활성탄의 반복 사용은 흡수된 일부 약물의 제거를 향상시킬 수 있습니다. 위장관 세척 또는 활성탄을 사용할 경우 기도를 보호해야 합니다. 강제 배뇨, 복막투석 또는 혈액 관류의 유의성이 확립되지 않았습니다.
11. 기타
이 약은 세포벽의 필수적인 특정 단백질과 결합하여 세포벽 합성을 저해함으로써 살균작용을 합니다.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【포 장 단 위】 30정, 100정

- 제조자 : 경동제약(주) / 경기도 화성시 양암면 제약단지로 224-3
- 제조회파자 : 삼익제약주식회사
- 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- 약약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.
- 유효기간이 지난 약품을 사용하지 마십시오.
- 이 첨부문서 작성일자(2014. 03. 21)이후 변경된 내용은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 온라인의약도서관(drug.mfds.go.kr)의 약품 정보를 참조하세요.
- 구입시 유효기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공공거래위원회 고시「소비자분쟁해결기준」에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 160720

삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청안로 13
학술/개발부 : (02)928-0661