

신개념 위장약 알로탈 정

일반의약품
분류번호: 234

【원료약품 및 그 분량】1정 중

시메티딘(KP).....	50mg
규산알루미늄산마그네슘(USP).....	100mg
(산화알루미늄으로 30.7mg, 산화마그네슘으로 24.1mg)	
히드로탈시드(BP).....	125mg
(산화알루미늄으로 21.3mg, 산화마그네슘으로 50mg)	
탄산수소나트륨(KP).....	100mg

【성상】 흰색의 원형 필름코팅정(앞 : TG ALT)

【효능 · 효과】 위통, 속쓰림, 체합, 구역

【용법 · 용량】

성인(15세 이상 ~ 80세 미만) : 1회 2정씩 복용한다. 필요시 4시간 간격으로 1회 2정씩 1일 3회까지 복용할 수 있다.
단, 1일 3회(6정)를 초과하여 복용하지 말 것.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 투석요법을 받고 있는 환자
 - 다음 질환으로 치료를 받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장(콩팥) · 간장질환, 위 · 십이지장질환, 천식, 류마티스 등의 면역계 질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다.)
 - 다음 약물을 복용하고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아즐제 항진균(항곰팡이)제(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다.)
 - 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액 이상의 병력이 있는 환자 (혈구수의 감소가 증가될 수 있다.)
 - 히스타민 H₂-수용체 길항제(억제제)에 과민반응의 병력이 있는 사람
 - 소아(15세 미만) 및 고령자(노인)(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적다), 80세 이상의 고령자(노인)에서는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현(드러냄)될 수 있다.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 시메티딘은 모유 중 이행되므로 수유부가 복용할 경우에는 수유하지 않도록 주의한다.
 - 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
다른 위장약(작용이 강하게 발현(드러냄)되어 예기치 못한 이상반응이 나타날 수 있다.)
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 졸음, 어지럼, 혼란감이 생길 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지 말 것.
 - 이 약을 복용할 시에는 알콜음료를 섭취하지 말 것(혈중 알콜농도를 높일 수 있다).
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약물을 복용중인 사람 : 약물 상호작용에 의해 이상반응의 발현(드러냄) 및 효과의 감소가 나타날 수 있다.
 - 이 약에 함유된 시메티딘은 다음 약물들과 상호작용으로 이들의 배설을 지연시켜 약효가 강하게 나타날 수 있다. : 기관지 확장제(비오필린 등), 혈액응고저지제(와로파린 등), 항전간(항간질)제(페니토인 등), 벤조디아제핀계 약제(디아제팜, 트리아졸람 등), 삼환계항우울제(이미프라민 등), 협심증 · 고혈압 치료제(베타-차단제 프로프라놀롤 등), 칼슘길항제(억제제)(니페디핀 등), 부정맥치료제(멕실레틴 등), 마크로라이드계 항생물질(테트라사이클린 등), 뉴-퀴놀론계 항균제(오플록사신 등)

(2) 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해(억제)될 수 있다. : 테트라사이클린계 항생물질 및 뉴-퀴놀론계 항균제

- 약물에 의한 과민반응의 병력이 있는 사람
- 고령자(노인)(65세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 복용한다.
- 인후(목구멍)통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액 이상이 인정될 수 있다.
이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 이상반응을 은폐시킬 수 있다.
- 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
- 복통(배아픔)이 지속되는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
- 신장(콩팥)병의 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 복용 직후에 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함과 동시에 안색창백, 수족냉증(손발이 차가움), 식은땀, 숨가쁨 등 이 나타나는 경우
 - 고열을 동반한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 열성(화상)의 수종 등의 심한 증상이 전신(온몸)의 피부, 입, 눈의 점막에 나타나는 경우
 - 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기))이 나타나는 경우
 - 변비, 설사, 두통, 발열, 권태감, 탈력감, 감기 증상, 하지(다리) · 점막하출혈, 사지(팔 다리)저림 및 굳은감, 두근거림, 황달, 전신부종(온몸부기), 혈뇨가 나타나는 경우
 - 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 : 다른 질환이 있을 수 있다.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 장기적으로 계속 복용 하지 말 것.
 - 2주간을 초과하여 계속 복용하지 말 것.
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 과량 복용 시에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 10, 120, 240정(120정x2)

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2016. 11. 16