

설명서 재질:모조-70g / 규격:140*300

의약품 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

내성균용 광범위 항생제

아목사 정 375mg

AMOXIA Tab. 375mg

K G M P	전문의약품
적격업체	분류번호:618

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- **주요 성분:** 아목시실린수화물(KP) 250mg(약가량 : 250.00mg)
 묽은클라불란산칼륨(EP) 212.73mg(약가량 : 125.00mg)
- **기타첨가제:** 미질정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이트흰색(OY-C-7000A), 전분글리콜산나트륨, 카르나우바인, 폴리디스테이렌화규소, 히프록셀로스

【성 상】 백색이거나 거의 백색타원형의 필름코팅정제

【**이론 · 과학**】

- 유균군중
- *항생제도구균, *표피포도구균, 스트렙토코쿠스 피오게네스(그룹 A-베타용형성), 페렴연쇄구균, 스트렙토코쿠스 비리단스, 엔테로코쿠스 파이칼리스, 코리네택테균, 탄저균, 리스테리아 모노사이토제니스, 클로스트리듐, 캄토구균, 캄토연쇄구균, *대장균, *프로테우스 미라빌리스, *프로테우스 불가리스, *클레브시엘라, *살모넬라, *시겔라, 보르테텔라 백일해, *에르시니아 엔테로콜리타, 부루셀라, 수막염균, *입균, *모락셀라 가타랄리스, *인플루엔자균, 동물카사피렐라종 병원균, 광장감포박터, 콜레라균, *박테로이드(박테로이디즈 프라질리스 포함) (* : 암피실린 및 아목시실린에 내성이 있는 베타락타마제 생성균주 포함)
- 적응증
- 급·만성 기관지염, 대엽성 및 기관지 폐렴, 농흉(가슴고름집), 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이(가운데귀)염
 - 방광염, 요도염, 신우신염
 - 골반감염, 임질
 - 중기 및 농양, 연조직염, 상처감염
 - 골수염
 - 치과 감염

【용포 · 용량】

- 성인 및 12세 이상 또는 체중 40kg 이상 소아: 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 250mg/125mg, 1일 3회 8시간마다 경구투여하며 중증 및 호흡기 감염 시 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 500mg/125mg으로 증량할 수 있다.
- 신장장애에 있는 경우 크레아티닌청소율에 따라 적절히 증감한다.
- 성인:

크레아티닌청소율	용법·용량
10~30mL/min	아목시실린의 양으로서 1회 250~500mg을 12시간마다 경구투여한다.
10mL/min 이하	아목시실린의 양으로서 1회 250mg을 24시간 마다 투여하되 용량이 초과되지 않도록 한다.

- 단, 치과 감염 시는 아목시실린의 양으로서 1회 250mg, 1일 3회 5일간 투여한다.

【사용상의 주의사항】

- 1) 약의 성분 또는 배타타입(페니실린계, 세페믹)에 과민반응(예, 아나필락시스, 피부점막만후군(스티븐스-존슨 증후군), 쇼크 포함) 또는 병이 있는 환자(배타타입에 약물에 교차 과민반응의 우려가 있다.)
 - 2) 동반감염 바이러스 질환 특히 전연단핵구증 및 림프선병변을 환자(발진위험이 증가할 수 있다.)
 - 3) 약 또는 페니실린에 의한 황달 또는 간기능 장애의 병력이 있는 환자(재발할 수 있다.)
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 간장애 환자(간기능장애가 악화될 수 있다.)
 - 2) 중등도 또는 중증(심한중상) 신장애(신장장애) 환자(혈중 농도가 지속되므로 투여간격을 두고 사용한다.)
 - 3) 본인은 부부, 형제와 기관지천식, 발진, 두드러기 등 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자
 - 4) 경구 섭취가 불량한 환자, 비경구적 영양 환자, 고령자(노인), 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있다.)
 - 5) 구토 및 설사를 동반한 소화기계 질환자(약물의 충분한 흡수를 보장할 수 없다.)
 3. 이상반응
 - 1) 소화기계: 설사, 위장장애(구토, 소화불량, 구내염, 드물게 위염, 허염, 흑소설(검은털모양해), 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 복통, 복부팽만감, 변비, 복통, 위산증, 연변(흔반), 구내염(입안)의 증후 등이 나타날 수 있다. 또한 간디증, 항생물질로 인한 대장염(위약성 대장염 및 출혈성 대장염 포함)이 드물게 보고되고 있다. 혈변을 동반한 중증(심한중상)의 대장염이 나타날 수 있으므로 관찰을 주의하며 하고 복통, 변변한 설사가 나타나면 이상반응은 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 드물지만 구역현상이 고통량 복용 시 나타나는 가장 흔한 이상반응이다. 경구 투여로 발생하는 위장관계 이상반응은 식사 시간 및 식 약을 복용함으로써 경감될 수 있다. 다른 항생물질과 마찬가지로 위장관계 이상반응 발현(드러냄)은 2세 미만의 영아에서 발생할 수 있다. 그러나 임상 시험에서는 2세 미만 영아의 4%만이 치료를 중단하였다.
 - 2) 간장: 때때로 AST, ALT, ALP, LDH, 혈청빌리루빈의 상승, 드물게 간염, 담즙정체성(쓸개경주 정체) 황달이 나타날 수 있다. 이러한 증상은 다른 페니실린 제제보다 약을 사용하는 투여에 일반적이지 않았고, 임상적 중요성(노인)(특히 60세 이상), 남성의 경우에 더 빈번하다고 보고되어 있다. 이상반응의 징후 및 증상은 치료 중 발현(드러냄)을 수 있지만 치료 중단 후 최대 6주까지 뒤늦게 보고되는 예가 많다. 간에 대한 이상반응은 대체로 가역적이거나 극히 드물게 사망 예가 보고되어 있다. 이들 사망 예는 일반적으로 심각한 지방을 앓고 있으며, 일부는 드물게 병용한 약물(구아니딘)투여 약과도 관련되어 있다. 간에 대한 이상반응은 남성 및 고령자(K)에서 주로 보고되고 있으며, 이 이상반응은 14일 이상 장기투여 시 더 증가한다. 간생검에 의한 조직학적인 관찰에서 담즙정체성, 간세포 손상, 또는 담즙정체성 및 간세포성 초창성 변화가 보였다. 특히 소아에게서도 드물게 보고되었습니다. 투여기간은 적용중에 따라 적절한 검토해야 하며 검토없이 14일을 초과하지 않는다.
 - 3) 과민반응: 드물게 가려움, 다형성홍반, 피부점막만후군(스티븐스-존슨증후군), 독성피괴피사용해(리델증후군) 수포성박탈 피부염 그리고 급성 전신발진성증후군(고름물집)증이 드물게 보고되고 있다. 이러한 피부반응은 항히스타민제나 필요 시 코르티코이드 전신투여로 조절가능하다. 이러한 발진 증상이 발현(드러냄)한 경우에는 투여를 중지하고, 의사의 지시를 따른다. 다른 배타타입에 항생 물질과 마찬가지로 드물게 혈관부종, 아나필락시스 혈청병양 증후군(혈청병양 Ⅲ형 과민반응(면역복합체질환)은 발열, 발진(특히 입 주위 피부발진), 두드러기, 마진양 발진, 관절통, 부종, 림프절증상을 특징으로 한다.) 및 과민성 혈관염, 급성전신발진성증후군, 기관지경련을 동반한 호흡곤란, 후두부종, 아나필락시스 쇼크(과민성 쇼크)를 일으키는 혈압하강 증상 등이 보고되고 있다.
 - 4) 혈액계: 다른 배타타입에 항생물질과 같이 드물게 가역성 백혈구 감소(중증구 감소 및 과립구 결핍 포함), 가역성 혈소판 감소 및 용혈성 적혈구, 빈혈, 혈소판 감소성 자반, 오산구 자반, 백혈병, 무과립구증, 림프구 감소, 드물지만 경미한(가벼운) 혈소판 감소, 골수억제 등이 보고되고 있다. 또한 출혈성이나 폐포트롬빈 시간 연장이 드물게 보고되었다.
 - 5) 비뇨기계: 설사감(대변을 비롯하여 질가려움, 스라임, 변비등 증가 등이 나타날 수 있다.
 - 6) 중추신경계: 극히 드물게 중추신경에 대한 이상반응이 확인된 바 있다. 이상반응은 초조감, 발한, 행동변화, 착란, 졸음, 불면, 가역성 활동 항진증, 어지럼, 드물게 두통 및 경련이 있다. 경증 증상은 신기능 손상이나 고통량 투여현상에 따라 발생할 수 있다. 항부(목부위)경직, 발열, 구토, 구역·구토 또는 의식 혼탁 등이 수반되는 무균성수막염이 나타날 수 있으니 이와 같은 증상이 나타나 경우에는 투여를 중지하고 적절한 치료를 한다.
 - 7) 신장(중증): 드물게 급성 신부전, 간질성 신염(신장염), 이와 관련된 혈뇨 등 중증(심한중상) 신장애(신장장애)가 나타날 수 있으므로 정기검사를 하는 등 충분히 관찰하고, 이상이 나타났을 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 8) 골관대역: 드물게 구내염(입안염), 칸디다증이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타나 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 9) 비타민 결핍증: 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B3 결핍 증상(혀염, 구내염, 식욕부진, 신경병 등)이 나타날 수 있다.
 - 10) 기타: 드물지만 비삭 이상, 편대강 도발이 보고 되었다.
 - 11) 국내 시판 후 이상사례 보고자료(1989~2015)를 토대로 심리·정통 분석 · 평가결과 새로 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 피부 및 피부조직계: 피부염
 - 전신 및 투여 부위 이상: 구강부종
4. 일반적주의
 - 1) 약의 사용에 있어서 내성균의 발현(드러냄)을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소시간만 투여하는 것이 바람직하다.
 - 2) 페니실린을 투여한 환자에서 심각한, 때때로 치명적인 과민반응(아나필락시스모양 반응) 및 혈관부종이 나타날 수 있다. 이러한 반응은 페니실린 과민반응의 병력이 있거나 다량성 알레르기항원에 대해 감수성의 병력이 있는 환자에서 발생하기 쉬우며, 비경구적 요법에서 더 자주 발생한다 경구적 요법 시에도 발생한다.
 - 3) 아나필락시스 쇼크(과민성 쇼크)이 매우 드물게 나타날 수 있으므로 면밀히 모니터링하고 안정한 상태를 유지하도록 처리하여야 한다. 투여 후 환자를 안정한 상태로 유지하기 위해 충분한 관찰을 실시한다. 심각한 아나필락시스가 발생하는 경우에는 에피네프린과 같은 신속한 처치를 시작한다.

응급처치를 한다. 삽관을 포함한 산소, 코르티코이드의 정맥주사, 기도 확보 등의 처치를 의사의 지시에 따라 실시한다.

- 4) 항생제의 사용과 관련하여 위막성대장염이 경미한 수준에서 생명을 위협하는 수준까지 보고되고 있다. 따라서 항생제 사용 중 또는 사용 후 설사 발생한 환자에서 위막성 대장염이 고려되어야 한다. 장기간 또는 심각한 설사가 발생하거나, 환자에게 복부경련이 나타나면, 이 약의 사용을 즉시 중단하고 환자는 추가적으로 조사되어야 한다. 항생물질 사용에 의해 장내세균총이 변화를 일으켜 클로스트리듐의 과잉번식을 일으킬 수 있다. 연구에 의하면 클로스트리듐 다이에셀에 의해 생산되는 독소가 위막성대장염의 주 원인으로 알려졌다. 위막성대장염으로 진단이 내려지면 치료를 시작해야 한다. 경미한(가벼운) 위막성대장염은 투약중지에 의해 회복될 수 있다. 중등도 또는 중증(심한중상)의 경우에는 수액, 전해질, 단백질 보충 등의 처치를 하고 클로스트리듐 다이에셀에 대해 임상적으로 효과적인 항생물질로 치료한다.
 - 5) 장기 투여 시 때때로 비감수성균의 과잉 증식 등이 나타날 수 있으므로 14일 이상 투여할 경우에는 충분한 관찰한다.
 - 6) 일부 이 약 투약환자에서 간기능 검사 상 변동이 확인된 바 있다. 임상적 유의성은 불확실하나 간기능부진 징후가 있는 환자의 경우 주의하여 사용하여야 한다. 중증(심한중상)이나 대체로 가역적인 담즙 유체성(쓸개정체) 황달이 드물게 보고되고 있다. 치료중단 후 6주 경과 시까지 그 증상 및 징후가 외상성 발현(드러냄)되지 않을 수 있다.
 - 7) 이 약의 대부분은 신장으로 배설되므로 중등도 이상의 신장애(신장장애) 환자의 경우 용법 용량 항에 준하여 이 약 사용량을 조정하여야 한다.
 - 8) 혼란성 발진은 아콰시릴린 사용으로 발생하는 전염단핵구증(전염성단핵구)증과 관련되므로 전염단핵구증이 우려되는 경우 이 약 사용을 피하여야 한다.
 - 9) 두드러기, 피부발진, 혈청병과 같은 증상이 나타나는 경우에는 약물투여를 중지하고 의사의 지시에 따라 적절한 처치를 한다.
 - 10) 이 약은 페니실린계 항생물질 중에서는 비교적 낮은 독성을 나타내기는 하지만, 장기투약하는 경우에는 신기능, 간기능, 조혈기능 등에 대한 정기적인 관찰이 필요하다.
 - 11) 이 약물로 치료를 시작하기 전에 페니실린, 세팔로스포린 또는 다른 알레르기 항원에 대한 이전의 과민반응과 과민반응의 병력 등에 대한 문진이 필요하다.
5. 상호작용

5. 상호작용

- 프로베네시드의 병용(함께 복용(사용)) 투여는 바람직하지 않습니다. 이는 아목시실린의 신세노관 배설을 감소시킴으로써 아목시실린의 혈중농도가 상승 지속될 수 있으며 클라불란산은 무관하다.
2. 알로푸리놀과 아미피실린을 병용(함께 복용(사용)) 투여할 경우에는 아미피실린을 단독 투여한 환자에 비해 알레르기성 피부반응(발진) 발생 가능성이 높으나 알로푸리놀에 의한 것이지 고노산혈증(요산과다증)에 의한 것인지는 확실하지 않다.
3. 디실피라과 병용(함께 복용(사용))투여하지 않는다.
4. 이 약 투여한지 일주일에서 출혈기간 및 프로토프루민 신장 기능이 보고되었으므로 항응고요법 중인 환자의 경우에는 신중히 투여한다.
5. 장내세균총에 영향을 주어 경구괴양의 효과를 떨어뜨릴 수 있으므로 환자의 경우를 지니.
6. 이소티말리산산, 페니박톤 및 다량의 혈염요양제를 페니실린과 동시 투약하면 혈중농도가 증가된다.
7. 테트라사이클린제, 마크로라이드제, 설파온미드제, 클로람페니콜제를 포함한 경우도 화약물질 항생물질과의 병용(함께 복용(사용))투여 시 결합작용(약제작용, 대항작용)이 일어난다.
8. 설파살라진과 동시 투여 시 설파살라진의 혈장농도를 감소시킨다.
9. 아목시실린은 메토포레세이트의 신장 청소율을 떨어뜨린다.
10. INR(국제정제화혈성의 변화) : 이 약을 포함한 항생물질을 항응고제와 동시에 투여 받은 환자에서 항응고 활성의 증가가 보고되었다. 감시정질환(비교) 및 응집성 과정을 동반한, 환자의 연령과 일반적인 상태는 위험요소라 된다. 비록 이 약과 와파린의 상호작용이 임상 시험을 통해 밝혀지지 않았지만 INR 모니터링을 실시하여 하고, 필요한 경우 경우를 항응고제의 용량을 적절히 조절한다. 항생물질의 일부 종류를 특히 플루오로퀴놀론, 모니트라이드, 사이클린, 코트모독사과 일부 세팔로스포린의 경우는 더 신중하다.
11. 항생물질 사용이 장내세균총에 영향을 끼쳐 일부 환자에서는 감성대담제(디곡신)의 흡수가 증가될 수 있다.
12. 피코페놀레제 코트모페를 투여하는 환자나 경구 아목시실린/클라불란산결합을 병용한 직후, 수일동안 미코페놀산의 최저혈중농도(pre-dose, trough)가 약 50%로 감소한 사례가 보고되었다. 투여를 지속함에 따라 이러한 현상이 감소되었으며 투여 중단 후에는 소실되었다. 최저혈중농도 변화가 미코페놀산 노출도의 변화를 정확히 반영한다고 볼 수는 없으므로 이러한 현상에 대한 임상적 유의성은 분명하지 않다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 동물실험에서 기형발생작용은 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 위험성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여하며 특히 임신 초기 3개월 동안은 투여하지 않는다.
- 2) 수유 중 미량의 페니실린(안지혈제 포함)이 모유로 이행될 수 있다.
- 3) 수유부에 대한 투여로 인한 열아에게 설사, 점막의 진균(곰팡이)서식, 과민반응 발현(피부발진) 등의 위험이 나타날 수 있으므로 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
7. 소아에 대한 투여
- 투여대상(12세 이상 또는 체중 40kg 이상 소아) 외의 소아에게 권장하지 않는다(사용경험이 적다).
8. 고령자(노인)에 대한 투여
- 고령자(노인)에는 다음과 같은 점에 유의하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
- 1) 생리기능이 저하되어 있는 경우가 많기 때문에 이상반응이 나타나기 쉽다.
- 2) 비타민 K 결핍에 의한 출혈경향이 나타날 수 있다.
9. 임상감시자의 영향
- 1) 이 약은 요중으로 다량 배설되며 고농도의 요중 아미피실린은 배네티드트리아, 펠릭시트, 클리니테스트에 의한 요당검사에서 거짓양성이 나타날 수 있으므로 주의한다. 따라서 환자에게 이 약을 투여하는 동안 이러한 검사를 실시하는 것은 바람직하지 않다. 테스트이프시험은 이 약에 의해 영향을 받지 않는다.
- 2) 임부에 아미피실린 투여 시에 혈장내의 총 결합형 에스트리올, 에스트리올을 글루코코리나이드, 결합형 에스트론 및 에스트라디올 농도가 일시적으로 감소됨이 관찰되었다. 이러한 결과는 아목시실린 및 이 약 투여 시에도 관찰되었다.
- 3) 유로빌리노겐 검사에도 영향을 나타낼 수 있다.
- 4) 클라불란산은 적혈구막의 표면에 흡수되는 경향이 있다. 만약 약물에 대한 항체가 존재한다면 콕스시험 양성의 결과를 나타낼 수 있다.
- 5) 아목시실린 고농도 투여 시에 다음과 같은 경향이 있으므로 주의한다. : 유색반응으로 혈청의 총단백질비율을 결정하는데 간섭한다.
10. 과다투여시의 조치
- 1) 증상
- 1) 과량 투여에 의한 문제는 거의 발생하지 않으나 발생한 경우에는 소화기 증상(위통 및 복통, 설사, 구토 등) 및 전해과 전해질 평형 이상, 소수의 경우에는 발진, 활동항진증, 졸음이 나타날 수 있다.
- 2) 아목시실린 과량투여 시 드물게 소변검소증 빈부적으로 인한 간질성신염이 보고되기도 한다. 신부전증상은 이 약의 투여를 중지하면 가역적으로 회복되기도 한다. 아목시실린 및 클라불란산결합의 신장청소율 감소로 인해 신부전환자는 높은 혈중 농도를 유지하게 된다.
- 3) 페니실린을 고용량 투여하는 경우에는 간질성 뇌경련이 일어날 수 있다. 페니실린을 투여받은 환자에서 증독 증상은 아니지만 자주 일어날 수 있는 현상은 과민성 쇼크이다. 드물지만 급성이성시 지병환자 수 있다. 일반적으로 투여 직후 30분 안에 나타날 수 있다. 즉시 모든 가능한 치료를 실시하여 혈액순환을 정상화시켜야 한다.
- 4) 피부반응, 출혈, 범세포 감소 등 기타의 알레르기 반응도 일어날 수 있다.
- 2) 처치
- 이러한 경우에는 즉시 투여를 중지하고 증상에 따른 수분 전해질 평형에 주의하면서 처치한다. 이 약은 혈액투석으로 제거될 수 있다. 만약 과량투여사태가 발생한 지 얼마 지나지 않았고, 구토투여의 대상이 아니라면 구토 또는 위내용물 제거를 위한 다른 방법으로 실시가능하다. 과량 투여로 인한 경련이 있는 경우에는 디아제팜으로 진정시킨다.

11. 보란 및 칩상성의 주의사항
25℃ 이하 건조한 곳에 보관한다.
12. 기타
태아막의 조기파열 여성에 대해 예방의 목적으로 이 약을 투여하는 것이 신생아에게 괴사성 소장결장염 발생 위험의 증가와 관련이 있다고 생각되는 한 건의 연구사례가 있다. 만약 다른 약물과 마찬가지로 의사에 의해 필요한 것으로 판단되지 않으면 이 약의 사용은 피해야 한다.

【포장단위】 80정

【저장방법】 기밀용기(방습포장), 25℃이하의 건조한 곳에 보관

【유효기간】 제조일로부터 24개월

※ 유효기한은 제품 포장에 표시된 8자리 숫자「0000.△△.□□」로 표기되어 있으며 0000년 △△월 □□일 까지 복용가능한 의약품입니다.

- * 본 약품은 우수약품 제조관리기준(GMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부에서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약(주) 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.
- * 약품의 용어 설명 및 기타 자세한 약품 정보는 식품약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
- * 첨부에서 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품약품안전처(이디트릭-보그마당)-안전성정보->약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 제 조 자 : 보령제약(주) - 경기도 안산시 단원구 능랑로 107, 109
- * 제조의뢰자 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 문화2길 6-1
- * 이상반응보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ☞ 약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

개정년월일 : 2017년 9월 28일



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr