

위장장애 없는 안전한 빈혈예방 치료제

헨너지 캡슐

Ferritin은 순수한 말의 비장에서 분리 추출된 천연 철결합 단백질로서 Ferritin 1분자는 철(Fe)원자 약 3,000개와 결합하여 생체내에 존재하며 체내의 철분 요구량이 증가될 경우 철분이 단백질로부터 즉시 유리되어 생체내에 이용될 수 있는 유일한 저장철의 형태입니다. Ferritin은 생체조혈인자로 기존의 무기 유기합성철이 아닌 천연 추출물의 철단백이므로 생체내 이용률이 월등하고 체제제 복용시 문제가 되던 위장장애를 거의 일으키지 않는 장점을 지니고 있습니다. 헨너지캡슐은 혈구생성에 필수적인 Folic acid와 Cyanocobalamin이 복합 처방되어 있고 흡수가 빨라 우수한 빈혈 치료효과를 나타내는 철단백 조혈제입니다.

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

철단백추출물(별규).....	155.0mg
(페리친철로서 20mg)	
시아노코발라민(KP).....	500.0mg
폴산(KP).....	800.0mg
헨가제(보존제) : 파라옥시벤조산나트륨(KP) 0.005mg, 파라옥시벤조산나트륨(KP) 0.005mg, 파라옥시벤조산프로필(KP) 0.01mg	
동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유), 철단백추출물(말, 비정)	

【성상】 적갈색의 분말이 든 갈색의 경질캡슐

【약리작용 및 특장점】

1. 뛰어난 생체이용률과 위장장애를 해결한 경우 치료제

헨너지캡슐에 함유된 Ferritin은 체내 저장철단백 형태의 천연추출물이므로 기존의 합성철제제 복용시 수반되는 위장장애 등의 부작용이 거의 없으며 소장점막에서 직접 흡수되어 혈중의 transferrin에 의해 필요부위로 즉시 운반·공급되어지므로 치료 효과가 우수하고 치료기간이 단축됩니다.

2. 임신·수유기의 빈혈치료에 우수한 조절 영양제

임신·수유기에는 평상시보다 몇배 더 많은 양의 철분과 Vitamin이 요구됩니다. 헨너지캡슐은 천연단백질인 Ferritin extractive 외에도 임신·수유기에 필수적으로 요구되는 Cyanocobalamin과 Folic acid가 복합처방 되어 있어 임신·수유부의 빈혈치료에 부작용 없이 우수한 조절효과를 발휘합니다.

3. 복용이 간편하고 흡수가 빠른 이상적인 조절 영양제

헨너지캡슐은 복용하기 간편하고 또한 복용시 흡수가 빠르므로 치료 효과가 신속한 이상적인 조절 영양제입니다.

【효능·효과】 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

【용법·용량】 성인 및 12세 이상 1일 1회, 1캡슐 식후 복용

【사용상의 주의사항】

- 경고
철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
2) 12개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
3) 혈액소중(철 대사이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직 장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
4) 철 이용 장애(예 : 납중독으로 인한 빈혈, 철 불용성(녹지 않는) 빈혈, 지중해 빈혈, 만발성 피부 포피린증) 환자
5) 비철결핍성 빈혈 환자 (예 : 비타민 B12결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈)
6) 철 과잉증 환자
7) 감염이나 종양으로 인한 철 결핍성 빈혈 환자 (철이 세망 내피계에 축적되어 이용에 장애를 받을 수 있으므로 1차 질환이 치료된 후 복용하십시오.)
8) 만성 췌장(이자)염 환자
9) 간경변 환자
10) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 안산염, 칼슘염
2) 경구용테트라사이클린계 항생제
3) 제산제

- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
노자, 홍자 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유·유제품은 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
3) 심장·순환기계기능 장애 환자
4) 발작성 야간 혈색소노증 환자(용혈(적혈구 파괴)을 유발하여 병태(병의 상태)를 악화시킬 수 있습니다.)
5) 신장(콩팥)에(신장(콩팥)장애) 환자
6) 저단백혈증 환자
7) 철 함유제제(철분제, MRI용 간장 조영제 등)를 투여중인 환자
8) 항알도스테르제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)
9) 퀴놀론계, 페니실라민, 플레스티라민, 핵장(이자)엑스 및 비타민 D와 같은 물질을 복용하는 사람
10) 철분 제제와 디아스포산염류, 티록신, 세프디니르 제제를 동시 복용하는 사람(이 제제들의 흡수가 감소되므로 일정한 시간 간격(2~3시간 이상)두고 복용하십시오.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이첨부문서를 소지하십시오.
1) 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민 반응
2) 복부(배부분)·위통증, 위 경련, 위부불쾌감, 구토, 설사, 구역, 식욕부진, 변비, 흑변, 치아변색
3) 열, 혼수
4) 진단 또는 검사 시 AST, ALT의 상승, ALP 상승
5) 염산(폴산)이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
6) 과량 투여로 인해 구역, 구토, 변비, 설사 등의 위장증상, 식욕부진, 복통(배아픔), 토혈(혈액구토), 직장(곧창자)출혈, 무기력, 권태감, 졸음, 청색, 청색변, 순환장애 또는 과혈당증, 대사성 산증, 간효소 수치의 상승, 색소침착, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기), 혼수상태에 이르는 속, 중독 될 경우 소화기간의 협착(좁아짐) 유발
7) 과량 투여로 인한 위장관 장애와 순환부전을 수반한 허탈의 경우에는 구토를 시킨 후 탄산염과 우유를 복용시켜 위세척을 하십시오.
8) 국내에서 이 제제를 가지고 철결핍성 빈혈 환자 71명을 대상으로 유효성 및 안전성 재평가를 위한 임상 시험을 실시한 결과, 유효사례 발현(드러냄, 드러내 보임)율은 28.17%(20명, 35건)이었고, 소화기계 18.3%(13명, 13건), 전신증상 11.3%(8명, 8건), 피부관련 4.2%(3명, 3건), 통증관련 4.2%(3명, 3건), 눈관련 4.2%(3명, 3건), 호흡기계 1.4%(1명, 1건), 정신신경계 1.4%(1명, 1건), 심혈관계 1.4%(1명, 1건), 수술관련 0.71%(1명, 1건)으로 나타났습니다. 약물유해반응(본제(이 약)와 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해사례) 발현(드러냄, 드러내 보임)율은 5.6%(3명, 4건)이며, 변비 1.4%(1명, 1건), 상해물명의 복부(배부분)통증 1.4%(1명, 2건), 설사 1.4%(1명, 1건), 구역 1.4%(1명, 1건)였습니다. 이중 중대한 약물유해반응은 없었습니다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 합니다. 빈혈은 혈액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 합니다.(예 : 만성질환에 의한 빈혈은 철분 복용이 유효하지 않을 수 있습니다.)
3) 12세 이상 청소년에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
4) 밀정기간 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5) 투여 중에는 혈액 검사를 실시하고, 과량 투여하지 않도록 주의하십시오.
6) 아스코르빈산(비타민 C) 200 mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가 될 수 있습니다.
7) 이 약에 함유된 염산(폴산)은 약성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만 신경증상에 효과가 없으므로 약성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민 B12제와 병용(함께복용(사용))하십시오. 다만, 진단이 확립되지 않은 약성빈혈이 있는 환자의 경우에 혈액상태의 개선에 의해 약성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 되므로 주의하십시오.
8) 만성적인 알콜 과음은 철분의 재흡수를 증가시키고, 철분 과부하를 유발 할 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여 보관하십시오.
3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【포장단위】 60캡슐, 60캡슐x2

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 본 첨부문서 작성일자 이후에 변경된 내용은 소비자상담전화02-843-1500또는 02-568-0051에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품정보를 참조하십시오.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이제트릭) 보고 마당 → 안전성보고 → 의약품유해사례보고에 알려주시기 바랍니다.
- 본 제품을 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.
- 사용(유효)기간은 별도 표시되어 있습니다.
- 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- 본 제품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어보아, 첨부문서는 본 제품과 함께 보관하십시오.
- 제조사: 우리들제약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 50
- 판매사: 동화약품(주) / 서울특별시 중구 후암로98, 19층

소비자상담실 수신자부담전화 : 02-843-1500

개정연월일 2015.02.25