



효과 빠른 종합감기약 콜드큐 정

일반의약품


분류번호 : 114(해열, 진통, 소염제)

원료약품의 분량 1정(670mg) 중

클로르페니라민말레산염 (KP)	2mg
수도아페드린염산염 (KP)	30mg
아세트아미노펜 (KP)	500mg

성 상 : 백색의 장방형 필름 코팅정

용법 · 용량 : 성인 및 12세 이상의 어린이 : 매 6시간마다 2정 복용. 최대 하루 8정을 초과할 수 없습니다.



※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

※ 안전용기포장이므로 포켓부분을 강하게 눌러 주십시오.

효능 · 효과

감기의 증상상(여러 증상) (코물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

사용상의 주의사항

- 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 하고, 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있습니다.
- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 지금까지 이 약에 의한 과민증상(발진, 발적(홍충되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
 - 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키는 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
 - 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한사람 또는 고열이 있는 사람

- 5) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨(소변을 누)곤란이 있는 사람
 - 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
4. 복용시 다음 사항을 주의하십시오.
- 1) 용법 : 용량을 잘 지켜 주십시오.
 - 2) 다른 약물과 동시에 복용하지 마십시오. 진해(기침을 그치게 함)거담(가래)제, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시켜 주십시오.
 - 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
 - 5) 이 약의 복용에 의해 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - 1) 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 기슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족(손발)이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - 2) 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포(물집) 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 3) 천식이 나타난 경우
 - 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨(소변을 누)곤란, 현기증(머지러움) 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
 - 3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 4) 장기 연용(계속 복용(사용))하지 마십시오.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **사용기한** : 외부포장에 표기

포장단위 10정

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손되거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 설명서 작성일자(2011년 5월 2일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

제조사 : 알리코제약(주) / 충북 진천군 광혜원면 회죽리 160-17

제조의뢰자

서흥캡셀

경기도 부천시 소사구 송내1동 315, 317



판매원

유한양행

서울시 동작구 대방동 49-6