

홍삼과 생약 보강 어린이 종합 영양제



이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[제품 특징]

어린이들은 중요한 성장기에 있기 때문에 균형 있는 영양섭취가 필요합니다. 티라노골드슈퍼블랜드는 어린이의 정상적인 성장 발육에 꼭 필요한 12가지 필수 비타민과 미네랄, 질병에 대한 저항력을 강화시켜주고 기를 보충해주는 생약 성분인 홍삼, 작약, 황기 등이 복합 처방되어 있는 어린이 종합 영양제입니다. 홍삼은 기를 보하는 대표적인 약재로 다른 삼에 비하여 사포닌의 종류와 함량이 높으며, 제조과정에서 안정성과 소화흡수, 유효 활성도가 증가됩니다. 티라노골드슈퍼블랜드는 홍삼을 비롯한 생약 성분과 비타민, 미네랄이 효과적으로 배합된 성장기 어린이를 위한 종합 영양제입니다. 티라노골드슈퍼블랜드는 각 정마다 티라노 모양이 새겨져 있고, 딸기(분홍색), 포도(연두색), 오렌지(주황색)의 향과 맛으로 이루어진 씹어먹는 정제로 아이들이 거부감 없이 맛있게 복용할 수 있습니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

홍삼30%에탄올건조엑스 (별규)	2mg
작약엑스 (5.9→1) (별규)	5mg
황기엑스 (7.4→1) (별규)	5mg
건조초산레티놀과립 (별규)	2mg
(비타민A로서 1000 IU)	
콜레칼시페롤과립 (별규)	2.5mg
(비타민D3로서 250 IU)	
티아민질산염3배산 (KP)	3.1mg
(티아민질산염으로서 1mg)	
리보플라빈포스페이트나트륨 (KP)	1.15mg
피리독신염산염3배산 (KP)	4.15mg
(피리독신염산염으로서 1.35mg)	
니코틴산아미드3배산 (KP)	16.6mg
(니코틴산아미드로서 5.4mg)	
시아노코발라민1000배산 (KP)	3mg
(시아노코발라민으로서 3μg)	
제피아스코르브산 (별규)	31.3mg
(아스코르브산으로서 30mg)	
토코페롤아세테이트2배산 (KP)	10mg
(비타민E로서 5 IU)	
폴산 (KP)	0.1mg
무수인산수소칼슘 (KP)	100mg
(칼슘으로서 29.39mg)	
글리세로인산마그네슘 (BP)	10mg
(마그네슘으로서 1.25mg)	
스테아르산마그네슘(소, 우지), 유당수화물(소, 우유)	

[성상]

딸기향(분홍색), 포도향(연두색), 오렌지향(주황색)이 있는 원형 모양의 씹어먹는 정제입니다.

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 A, B₁, B₂, B₆, C, D, E의 보급
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후[병을 앓는 동안이나 회복 후]의 체력 저하시
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 비타민A (건조초산레티놀과립) : 눈의 건조감의 완화, 야맹증[밤에 잘 못보는 증상]
- 비타민D (콜레칼시페롤과립) : 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

[용법·용량]

- 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 2정
 - 36개월~12세 어린이 : 1일 2회, 1회 1정
- 임안에서 녹이거나 씹어서 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로, 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오. (비타민A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 고칼슘혈증 (hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장[콩팥]질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장[콩팥]결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
 - 6) 이 약은 유당[젖당]을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당[젖당]분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 3) 고옥살산뇨증환자 (hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현[기형발생] 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
 - ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장[콩팥]장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감심배당체를 투여중인 환자
- 9) 통풍환자 또는 신장[콩팥]결석이 있는 환자
- 10) 신장[콩팥]결석 병력이 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절 부종[부기]
 - 설사
 - 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적[충혈되어 붉어짐]
 - 묽은변
 - 식욕부진, 복부[배부분]팽만감
 - 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
 - 붉은 반점, 부전수축[심장박동정지], 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전[혈관 막힘]성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전[혈관 막힘]증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량투여에 의하여 소화성궤양을 촉진시키고 당내성 [포도당 내성] 손상(glucose tolerance impairment : 신체 의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종[부기] 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- 10) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증[뼈 엉성증] 위험을 높일 수 있습니다.
- 11) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용[함께 복용]투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
- 12) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 13) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킵니다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여

- 합니다.
- 3) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의합니다.
 - 4) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
 - 5) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 6) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 7) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피합니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다.
- 3) 오용[잘못 사용]을 막고 품질을 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)

[포장단위] 120정, 240정

- ※ 제품 개봉 후에는 인습되지 않게 뚜껑을 잘 닫아 보관하십시오.
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 작성일자 (2015년 11월 1일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.greencross.com)나 소비자상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조사



총복 음성군 금왕읍 무곡로65번길 26
TEL. 031)260-9300 소비자상담실 TEL. 080-260-0033