

말초작용성 진해제

【분류번호 : 222】
【전문 의약품】

드로피진[®] 정

(레보드로프로피진)

DROPIZIN[®] Tablet

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

레보드로프로피진(BP) 60mg

■ 성상

백색의 원형정제

■ 효능 · 효과

다음 질환에서의 기침 : 급 · 만성기관지염

■ 용법 · 용량

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여 합니다.

증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 사용하지 않습니다.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여합니다.

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계 : 심계항진
- 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있습니다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용 투여 시 주의합니다.

6. 임부 및 수유부에의 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않습니다.

7. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

■ 사용기한

외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ 포장단위

30, 100, 300정

■ 소비자상담

080-203-6000(수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성일(2014년 3월 12일) 이후 변경된 내용은 코오롱 제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) '의약품검색'란을 참조하세요.

최초 작성연월일 : 20070202

최종 개정연월일 : 20140312

❖ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45