

의약품은 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

급·만성 기관지염 진해제 레보로진 정 (레보드로프로핀)

K G M P	전문약품
적격업체	분류번호 : 222

LEVOROZINE Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 레보드로프로핀(EP) 60.0mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

다음 질환에서의 기침 : 급·만성 기관지염

【용법·용량】

성인 : 레보드로프로핀으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
 - 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
 - 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 5) 중증의 간장애환자
 - 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
 - 2) 고령자
 - 3) 만 2세 미만의 영아
- 이상반응
 - 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
 - 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
 - 3) 순환기계 : 심계항진
 - 4) 피부 : 매우드물게알레르기반응
- 일반적 주의
드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작시 주의하며, 특히 알코올과 병용시 작용이 증대될 수 있다.
- 상호작용
예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.
- 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

【포장단위】 30정/병, 300정/병

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 사용기한은 제품 포장에 표시된 6자리 숫자 「○○,△△,□□」로 표기되어 있으며 ○○년 △△월 □□일 까지 복용가능한 의약품입니다.

- * 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약(주) 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.
- * 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfd.s.go.kr>)을 참조하세요.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이디드려→보고마당→안전성정보→의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 이상반응보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- * 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

개정년월일 : 2018년 12월 10일

제조의뢰자



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr
충북 진천군 진천읍 문화2길 6-1

제조사



생명과학을 선도하는 기업

한국유니온제약(주)
UNION KOREA PHARM CO., LTD.
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246