

레보투스[®]정

(레보드로프로피진)

- * 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- * 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- * 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

레보드로프로피진(EP)..... 60mg

[성 성] 흰색의 원형정제

[효능 · 효과] 기침 : 급 · 만성 기관지염

[용법 · 용량]

성인 : 1회 1정(레보드로프로피진으로서 60mg), 1일 3회 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 사용하지 말 것.
 - 이 약에 과민증이 있는 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

심각한 신부전 환자
- 이상반응
 - 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
 - 중추신기계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
 - 순환기계 : 두근거림
 - 피부 : 아주 드물게 알러지 반응이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작시 주의할 것.
- 임부 및 수유부에서의 사용

임부 및 임신 가능자, 수유부에는 투여하지 말 것.
- 보관 및 취급상의 주의
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 30℃이하 실온에서 보관한다.
 - 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10, 30, 100정

- * 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- * 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적, 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
- * 오용을 막고, 품질을 보호, 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- * 이 사용설명서 개정년월(2010년 3월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 080-024-5525)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 : 현대약품주식회사
충청남도 천안시 동세면 남관리 200

☎제품문의처 : 080-024-5525
사용설명서 개정년월 : 2010. 3.

