

# 프로코푸 정

(레보드로프로피진)

전문의약품

분류번호 222

급·만성 기침에는

PROCOUGH Tablets

## ■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

레보드로프로피진 (EP) -----60mg

## ■ 성상

흰색의 원형 정제

## ■ 효능·효과

다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염

## ■ 용법·용량

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여 하십시오.

증상에 따라 적절히 증감하십시오.

## ■ 사용상의 주의사항

### 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액성모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

### 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)

### 3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계 : 심계항진(두근거림)
- 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

### 4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있습니다.

### 5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의 하십시오.

### 6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 마십시오.

### 7. 보관 및 취급상의 주의 사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 주의하십시오.

## ■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

## ■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

## ■ 포장단위 : 30정/병, 300정/병

## ■ 제조원 : (주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

- \* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.
- \* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용합니다.
- \* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일(2016년12월23일)이후 변경된 내용은 식물의약품안전처 온라인약 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)이나 소비자상담실 (080-611-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인하실 수 있습니다.



제조발매원

(주)동구바이오제약

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

[www.dongkoo.com](http://www.dongkoo.com)