

레피투스정



전문의약품

의약품 분류번호	222
진해거담제	

【성분·함량】 1정 중

레보드로프로피진(EP)..... 60mg
첨가제(동물유래):유당수화물(소·우유)

【성상】 흰색의 원형정제

【효능·효과】 기침 : 급·만성 기관지염

【용법·용량】 성인 : 1회 1정(레보드로프로피진으로서 60mg), 1일 3회
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 심각한 심부전 환자

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
- 3) 순환기계 : 두근거림
- 4) 피부 : 아주 드물게 알러지 반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나, 기계 조작시 주의할 것

5. 임부 및 수유부예의 사용

임부 및 임신 가능자, 수유부에는 투여하지 말 것

6. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 30°C이하 실온에서 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30°C)보관,

사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 300정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■제조의뢰자 : 대우제약(주) - 부산광역시 사하구 다대로 153 (신평동)

■제 조 자 : 삼익제약(주) - 인천광역시 부평구 청안로 13 (청천동)

최종개정년월일:2011. 09. 06

작성년월일:2012. 07. 11



대우제약(주)

부산광역시 사하구 다대로 153 (신평동)
http://www.daewoopharm.com

소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831

※ 이 첨부문서 작성일자(2012년 7월 11일)이후 변경된 내용은 http://www.daewoopharm.com
나 051-204-3831(대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.