

레보피린 정

(레보드로프로피진)

레보피린정은 말초성, 비마약성 진해제로서 효과가 빠르며, 중추에 작용하지 않아 약물의존성 및 탐닉성, 졸음 등의 부작용이 없어 보다 안전하며, 다른제제와 병용투여가 가능한 제제로 여러 가지 병인으로 발생하는 호흡기 질환(기침, 급·만성기관지염)등에 아주 효과적입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

레보드로프로피진(Levodropropizine) (EP) 60mg

· 첨가제(동물유래): 유당수화물(동물기원: 소, 사용부위: 우유)

【성 상】 흰색의 원형정제

【약리특장】

1. 레보피린정은 말초성진해제로 효과가 빠릅니다
2. 레보피린정은 마약성 진해제에 의해 나타나는 부작용 및 의존성, 금단증상이 없는 훌륭한 진해제입니다.
3. 레보피린정은 peak time 도달시간이 15~60분으로 다른 진해제에 비해 신속한 약효를 나타냅니다.
4. 레보피린정은 여러 가지 병인에 의해 발생하는 호흡기질환 특히 기침, 급·만성기관지염에 아주 효과적입니다.
5. 레보피린정은 약물상호작용이 없어 타약물과 병용투여가 가능하며 탁월한 상승효과를 나타냅니다.

【효능·효과】

다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염

【용법·용량】

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계 : 심계항진
- 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

* 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 설명서는 꼭 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

제품문의 (032) 812-8356

설명서개정연월 2014년 03월



제조발매원

영웅제약주식회사
인천광역시 남동구 학반로 333



본 의약품은 정부의 KGMP
(우수 의약품 관리기준)에
의거하여 엄격한 관리에
의해 생산된 제품입니다.