

경남 그린웰 연질캡슐

[일반의약품 | 분류번호:319]

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

우리의 몸에서는 호흡같은 정상적인 생리현상과정과 외부환경에 의해서 불가피하게 유리기(free radical)라는 유해물질이 생성됩니다. 유리기는 체내 세포를 손상시키는 독성이 있어 노화, 혈액순환 장애, 당뇨, 암, 자가면역질환, 알레르기 등의 원인이 된다고 알려져 있습니다. 이러한 유리기를 제거하는 것을 항산화작용이라고 합니다.

우리 몸에는 유리기를 제거할 수 있는 항산화 방어기전이 있지만 나이가 들수록 또는 질병상태에 따라 약해지므로 충분한 항산화효과를 위해서는 외부로부터 항산화물질을 공급해주는 것이 좋습니다.

경남 그린웰 연질캡슐은 항산화비타민 및 미네랄, 베타카로틴, 비타민C, 토코페롤, 셀레늄, 아연 그리고 코엔자임Q10이 이상적으로 배합되어 있으며 비타민B군(B1, B2, B6)도 첨가되어 육체피로, 눈의 피로, 구내염(입안염), 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 어깨, 목결림, 아연의 보급에 효과적인 제품입니다.

[제품명] 경남그린웰연질캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 200 IU)	200 mg
아스코르브산(KP)	450 mg
β -카로틴현탁액(30%(KP) β -카로틴으로서 3 mg)	10 mg
유비데카레논(KP)	5 mg
티아민질산염(KP)	12.5 mg
리보플라빈(KP)	6 mg
피리독신염산염(KP)	25 mg
산화아연(KP)(아연으로서 14 mg)	17.43 mg
셀레늄가루0.1%(KP)(셀레늄으로서 25 μ g)	25 mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호	

[성상] 적갈색의 내용물을 함유한 암색색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 A, B1, B2, B6, C, E의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복후)의 체력저하시, 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

·비타민A(β -카로틴현탁액 30%)

: 눈의 건조감 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 현상)

·비타민B1(티아민질산염)

: 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(오(허리)통, 건통(어깨통증) 등), 각기, 눈의 피로

·비타민B6(리보플라빈), 비타민B12(피리독신염산염)

: 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

·비타민C(아스코르브산)

: 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

·비타민E(토코페롤아세테이트)

: 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)

2. 아연의 보급

[용법·용량] 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 않는다.(비타민A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자

2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)

3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것).

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 과산화노증환자(hyperoxaluria:요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

3) 임부, 수유부

4) 심장·순환기계기능 장애 환자

5) 신장장애(신장장애) 환자

6) 저단백혈증 환자

7) 위장관질환

8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 부작용

1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. :구역, 구토, 묽은 변, 설사, 변비, 위부(상복부)불쾌감, 위장관장애, 소화장애, 상복부 통증, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 피부부, 땀·호흡기 악취, 탈모, 조급증, 저혈압, 폐부종

2) 이 약의 투여에 의해 생리각 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자에 비타민E를 투여할 경우에는 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy:말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.

4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼합되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 상호작용

1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.

2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다.

가) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

나) 레보도파

3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 임부에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 보고되어 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

8. 임상 검사치에의 영향

1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있다.

9. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

3) 오(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질의 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위(외부포장에 표기)

[제조자] (주)서흥 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

[제조외리자] 경남제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 기타주의

1. 허가된 효능,효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

2. PTP포장을 개봉하여 복용 시 가끔 캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으나 복용 시 캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하시기 바랍니다.

3. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사, 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.

소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁 해결기준" 에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관 「http://drug.mfds.go.kr」 → 「의약품검색」 을 참조하시기 바랍니다.

CLEMONA

경남제약(주)

Kyung Nam Pharm.Co.,Ltd.

첨부분서작성연월일 : 2015. 04. 22