

인술린 저항성 개선제

글루타존정

(원신포도글리타존)

【원시약품 및 분량：1정 중】

원신포도글리타존(분류구)..... 16.53 mg
(피오글리타존으로써 15 mg)

정가제(동물유래성)：유당수화물(건강한 소의 우유)

【성상】 흰색 내지 회백색의 불룩한 원통형 정제

【효능·효과】

이 약은 제2형 당뇨병 환자(인슐린비의존형) 혈당조절을 위하여 식사요법 및 운동요법과 함께 보조치료제로 사용된다. 이 약은 단독요법으로 사용할 수 있으며 필요에 따라서는 식사요법 및 운동요법과 함께 다른 약제를 사용 있음에도 불구하고 혈당개선효과를 보지 못했을 경우에는 설포닐우레아제, 메트포르민, 혹은 인슐린과 함께 병용요법도 가능하다. 제2형 당뇨병환자는 이 외에도 영양상담이 필요하며 경우에 따라서는 체중감량도 요구 되고, 운동요법도 실시하여야 한다. 제2형 당뇨병 환자가 있어서 이러한 노력들은 초기 치료뿐만 아니라 약물요법의 효력을 유지하기 위해서도 중요하다.

【용법·용량】

이 약은 식사에 관계없이 1일 1회 복용하여야 한다.

당뇨병의 관리는 각자 개인적으로 자발적 되어 실시하여야 한다. 가장 이상적인 방법은 FBG(공복식 혈당)보다는 대 정확한 진단방법인 HbA1c(당화혈색소) 수치를 보아가며 치료의 반응을 평가하여야 한다. HbA1c는 과거 2~3개월 간의 혈당상태를 반영한다. 임상적으로 이 약은 당뇨병환자가 혈당조절이 더 악화되지 않는다면 HbA1c의 변화를 평가하기에 적당한 기간은 (최소 3개월) 투여 하여야 한다. 18세 미만의 소아에서는 사용령칙이 없으므로 투여가 권장되지 않는다.

● 단독요법

이 약은 식사요법과 운동요법으로 혈당이 적절히 조절되지 않는 환자에게 단독요법으로 1일 1회 15mg으로 시작할 수 있다. 이 약의 초기 투여량으로 충분히 효과를 얻을 수 없는 경우에는 1일 1회 30mg까지 증량할 수 있다. 단독요법에 적절히 반응하지 않는 환자들에게는 병용요법을 고려하여야 한다.

● 병용요법

1. 설포닐우레아(sulfonylureas): 이 약은 설포닐우레아제 약물과 병용투여 할 수 있으며 이때 초기용량은 1일 1회 15mg을 병용한다. 이 약과 병용요법으로 사용할 경우 현재의 설포닐우레아제 약물은 동일한 용법용량으로 지속적으로 투여할 수 있다.

그러나 만약 환자가 저혈당증상을 보이면 설포닐우레아 투여량을 줄여야 한다.

2. 메트포르민(metformin): 이 약은 메트포르민과 병용투여 할 수 있으며 이때 초기용량은 1일 1회 15mg을 병용한다. 이 약과 병용요법으로 사용할 경우 현재의 메트포르민은 동일한 용법용량으로 지속적으로 투여할 수 있다. 이 약과의 병용요법은 있는 동안 저혈당증상 때문에 메트포르민 투여량을 조정할 필요가 있을 것 같지는 않다.

3. 인슐린: 이 약은 인슐린과 병용투여 할 수 있으며 이때 용량은 1일 1회 15mg을 투여한다. 이 약은 병용요법을 시작할 때도 현재의 인슐린 투여량을 지속적으로 유지할 수 있다. 그러나 이 약과 인슐린을 병용투여 받는 환자가 만약 저혈당증상을 보거나 혈장 글루코스 농도가 100mg/dL이하로 감소하게 되면 인슐린 투여량을 10%~25%까지 감량할 수 있다. 이후의 용량조정은 혈당의 조절상태에 따라 개별적으로 조절한다.

● 최대 권장용량

단일요법 또는 설포닐우레아, 메트포르민, 인슐린과의 병용요법의 경우 1일 1회 30mg을 초과하는 용량은 권장되지 않는다. 신기능부전증 환자에서의 투여량 조정이 권장되지 않는다.(약동학 및 약력데이터 참조). 치료법 시작시점에서 환자가 활동성 간질환이나 혈청 트랜스아미나제 수치 증가(ALT 정상 상한치의 2.5배 이상)의 임상적 증거를 보일 경우 이 약을 병용을 시작하면 안된다.(약작용-간, 특정질환-간기능부전증 참조). 이 약 요법을 시작하기 전과 그 후 정기적으로 모든 환자에서 간 효소 소모티피가 권장된다.(부작용-간 참조) 다른 thiazolidinedione과의 병용요법으로 이 약을 투여한 데이터가 없다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1) 이 약을 포함한 치아졸리딘디온계 약물은 일부 환자에서 유효성심부전을 일으키거나 악화시킬 수 있다. 이 약으로 치료된 것을 시판하거나 투여용량을 증가시킨 후에 심부전의 증상 및 징후(과도하고 급속한 체중변화, 호흡곤란, 부종 포함)에 대하여 환자를 주의깊게 관찰하여야 한다. 이러한 증상 및 징후가 나타난다면 심부전은 현재의 표준치료 요법에 따라 관리되어야 한다. 또한 이 약의 투여중지 또는 감량이 고려되어야 한다.

2) 중증의 심부전증상(뉴욕심장학회(NYHA) 분류 3, 4 심장상태인 환자)는 이 약으로의 치료를 시작해서는 안된다. 중증 심부전 환자에서 이 약의 투여는 권장되지 않는다.

3) 심부전증 및 심장에 대한 다른 작용

이 약은 다른 치아졸리딘디온계 약물(thiazolidinediones)과 마찬가지로, 단독 또는 인슐린 등의 다른 항당뇨병약물과 병용 투여할 때 체액 저류를 일으킬 수 있다. 체액 저류는 심부전증을 유발하거나 악화시킬 수 있다. 환자들은 심부전증의 증상이나 증상애 대하여 경각심을 받아야 한다. (5. 일반적 주의 중 환자를 위한 정보 참조). 심장 상태의 어떠한 악화라도 발생한 경우에는 이 약을 즉시 중단하여야 한다.

제 2형 당뇨병 환자 566명을 대상으로 한, 미국에서의 16주, 이중맹검, 위약대조 임상 시험에서, 인슐린과 이 약 15mg 및 30mg을 투여한 병용요법과 인슐린 단독요법과 비교하였다. 이 임상 시험은, 일례 계속된 당뇨병과 다음과 같이, 유병률이 높은 기존과 의학적 증상을 있는 환자들을 포함하였다: 동맥성 고혈압(57.2%), 당뇨병성 신증(22.6%), 관상 동맥질환(19.6%), 망막증(13.1%), 심근경색(8.8%), 백반 질환(6.4%), 협심증(4.4%), 뇌졸중 및/또는 일과성허혈성발작(4.1%), 및 유효성 심부전증(2.3%).

이 연구에서, 인슐린 단독요법에 대한 187명의 환자 중 아무도 유효성 심부전으로 전개되지 않았던 것과 비교할 때, 이 약 15mg과 인슐린을 투여 받은 191명의 환자 중 2명 (1.1%)과 이 약 30mg과 인슐린을 투여 받은 188명의 환자 중 2명(1.1%)이 유효성 심부전으로 전개되었다. 이 네 명의 환자를 모두가 관상 동맥 질환, 관상동맥우회술 이전(previous CABG procedures), 심근경색 등의 심혈관 이상의 병력을 가지고 있었다. 또한, 이 약과 인슐린을 병용투여한 24주의 용량조절 시험에서, 30mg 투여군의 0.3%(1/345) 및 45mg 투여군의 0.9%(3/345)가 중대한 이상반응으로 유효성 심부전을 보고하였다.

이 연구의 분석 데이터로부터, 인슐린과의 병용 요법시 유효성 심부전의 증가 위험을 예보할 수 있는 특이한 인자가 확인되지 않았다.

제2형 당뇨병이 있고, 기존에 주요한 대혈관 질환이 있는 75세 미만의 환자를 대상으로 피오글리타존 임상 시험관계 결과 변수 시험을 수행하였다. 피오글리타존 또는 위약을 기존의 항당뇨 및 심혈관계 요법에 추가하여 최대 3.5년간 투여하였다. 이 시험은 심부전의 보고가 증가하였음을 보여주었으나 이로 인해 이 시험에서 사망률이 증가하지는 않았다. 이러한 환자군에 대한 경향이 제한적이므로, 75세 이상의 환자에 대해서는 주의해서 사용해야 한다.

2) 제 2형 당뇨병 및 유효성 심부전(사망 가능형)

뉴욕심장학회 분류 2, 3 심부전 및 40 이하의 발작성성(치료된 단계에서 평균 발작성률 30%)를 가진 조절되지 않는 당뇨병 환자(치료된 단계에서 평균 HbA1c 8.8%)에서 이 약(262명)과 글리베틀 클라미드(256명)를 비교하기 위하여 24주 시판후 안전성 시험이 수행되었다. 본 시험과정 중에, 유효성 심부전에 대한 하트박 동간의 일일이 모니터링클라미드를 투여 받은 환자들 중 4.7%에 비해서 이 약을 투여 받은 환자들중에는 9.9%에 비해서 보고되었다. 저혈당 치어는 6주부터 관찰되었다. 이 약과 연관된 이상 반응들은 치료된 단계에서 심부전을 투여 받은 환자들 및 64세 이상의 고령 환자들에서 더 두드러졌다. 치료군들 사이에 심혈관 사망에서 차이는 관찰되지 않았다. 이 약이 제 2 형 당뇨병 및 수축기 심부전 환자들 (뉴욕심장학회 분류 2)에게 처방 되는 경우에는 허가된 가장 낮은 용량으로 시작되어야 한다. 이후 용량 상승이 필요하다면, 용량은 체중 증가, 부종 또는 유효성심부전 악화의 징후 및 증상애 대한 신중한 모니터링을 동반한 수 개월의 치료 이후에 서서히 증가되어야 한다.

대혈관 합병증 사례에 대한 전향적 피오글리타존 임상 시험(PROActive)
PROActive에서, 제 2형 당뇨병과 함께 이전에 대혈관 질환의 병력이 있는 5238명의 환자들에서 이 약(2,605명)를 1일 1회 15mg까지의 강제 적정(force-titration)하여 투여하거나 또는 위약(2,633명)을 투여하였다(이상 참조). 중대한 심부전증상 나타낸 환자의 비율은 이 약을 투여한 환자군(5.7%, 149명)에서 위약 투여군 환자(4.1%, 108명)에 비해 더 높았다. 중대한 심부전의 보고에 이어 사망의 발생율은 이 약 투여군 환자에서 1.5%(40명), 위약 투여군 환자에서 1.4%(37명)였다. 베스라린에서 이 약과 인슐린을 투여한 환자가 있어서 중대한 심부전의 발생률은 6.3%(54/864명)이고 그 위약에서는 5.2%(47명/896명)였다. 이 약과 설포닐우레아를 투여한 환자가 있어서 중대한 심부전의 발생률은 5.8%(94명/1624명)였고, 위약에서는 4.4%(71/1625명)이었다.

6) 방광암의 기암력이 있는 환자에게 투여하는 경우 이 약 사용으로 인한 암 제발에 대한 위험 대비 혈당 조절의 유익성을 고려하여야 한다.

7) 치료 중 육안적 혈뇨 또는 배뇨장애나 결박뇨와 같은 기타 증상의 징후가 발견되거나 증가되는 경우, 이러한 증상은 방광암에 기인한 것일 수 있으므로, 의사에게 즉시 알리도록 환자에게 지시해야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마라

- 이 약이나 이 약의 성분과 대하여 과민성이 알려진 환자
- 중증의 심부전질환 또는 심부전 병력 환자(뉴욕심장학회(NYHA) 분류 3, 4 심장상태인 환자)
- 혈당성 방광암 환자
- 간장애 환자
- 중증 신장애 환자
- 당뇨병제 케산산증 환자, 당뇨병성 혼수 및 전 혼수, 제1형 당뇨병 환자
- 수술 전후, 중증 감염증 환자, 중증 외상 환자
- 정제에서 이 약이 유당을 함유하고 있으므로 갈락타스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 글루코스-갈락타스 흡수장애 등 유전적인 문제가 있는 환자(유당 함유 제제에 한함)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 다른 경구용 혈당강화제와 병용투여되는 환자

- 폐경전 여성

- 부종이 있는 환자

4. 이상반응

- 외국 임상시험 및 시판후 조사

제 2형 당뇨병이 있는 8500명이 넘는 환자들이 무작위 배정, 이중맹검, 비교 임상시험에서 이 약을 투여받았다. 여기에는 PROActive 임상시험에서 이 약을 투여한 제 2형 당뇨병이 있는 2,605명의 환자와도 포함되었다. 6,000명이 넘는 환자에서 6개월 이상 투여를 받았고, 4,500명이 넘는 환자는 1년 이상 투여를 받았다. 3,000명이 넘는 환자들이 적어도 2년 이상 이 약을 투여하였다. 이 약 7.5mg, 15mg, 30mg, 또는 45mg을 1일 1회 단독 투여한 위약대조 임상시험에서 보고된 이상반응의 전체적인 발생빈도와 유형이 표 1에 나와 있다.
표 1 이 약을 단독 투여한 위약대조 임상시험연구: 이 약 투여 환자에서 5% 이상의 빈도로 보고된 이상 반응

(환자 %)	위약 (Placebo)		피오글리타존임상반
	259명	606명	
상기도 감염	8.5	13.2	
두통	6.9	9.1	
부비강염	4.6	6.3	
근육통	2.7	5.4	
치아질환	2.3	5.3	
당뇨병 악화	8.1	5.1	
인두염	0.8	5.1	

이 약은 단독요법 또는 군과 설포닐우레아, 메트포르민, 인슐린과의 병용 요법 투여군에서 대부분의 임상적 이상반응들에 대한 발생빈도가 유사하였다. 인슐린 단독투여와 비교하였을 때, 이 약과 인슐린을 투여한 환자들에서 부종의 발생이 증가하였다.

이 약과 인슐린 투약 임상시험 (379명)에서, 이 약과 인슐린을 투여한 10명의 환자들이 효용관란을 나타냈고, 또한 치료 기간 중 이 시험에서, 체중 변화 또는 부종을 나타냈다. 이 10명의 환자들 중 7명이 이러한 증상을 치료하기 위하여 이뇨제를 투여 받았다. 이것은 인슐린-위약 군에서는 보고되지 않았다.

과혈당증 이외의 이상 반응 때문에 임상시험을 중지한 발생률이 위약 (2.8%)이나 이 약 (3.3%)을 투여한 환자들에서 유사하였다.

설포닐우레아나 인슐린과의 병용 요법 동안 경증~중증도의 저혈당증이 보고되었다. (5. 일반적 주의 중 저혈당증 및 "용법용량" 참조). 미국에서 실시된 이중맹검 시험에서, 빈혈이 이 약과 설포닐우레아, 메트포르민 또는 인슐린을 병용 투여한 환자들의 2% 이하에서 보고되었다.

단독 요법 연구에서, 위약-투여 환자들의 1.2%에서 부종이 보고된 반면, 이 약 투여 환자들의 4.8%에서 부종이 보고되었다. 병용 요법 연구에서, 설포닐우레아를 단독 투여한 환자들의 2.1%에서 부종이 보고된 반면, 이 약과 설포닐우레아를 투여한 환자들의 7.2%에서 부종이 보고되었다. 메트포르민과의 병용 요법 연구에서, 메트포르민을 단독 투여한 환자들의 2.5%에서 부종이 보고된 반면, 병용 투여한 환자들의 6.0%에서 부종이 보고되었다. 인슐린과의 병용 요법 연구에서, 인슐린을 단독 투여한 환자들의 7.0%에서 부종이 보고된 반면, 병용 투여한 환자들의 15.3%에서 부종이 보고되었다. (5. 일반적 주의 중 부종 참조).

인슐린과 이 약의 병용요법에 대한 16 주간의 임상시험에서, 유효성 심부전이 인슐린 단독요법에서는 나타나지 않은 반면, 병용 요법 (1.1%)에서는 더 많은 환자에서 나타났다 (1. 경고 중 심부전 및 심장에 대한 다른 작용 참조).

근육통, 근육경직, 크레이티린 키나아제(크레아티닌 포스포키나아제)의 증가, 혈중 또는 뇨중 미오글로빈의 증가(혈색소를 미소)를 수반하는 횡근근용해증이 발생할 수 있다. 이런 경우, 이 약의 병용을 중단하고 적절한 조치를 취해야 한다.

대혈관 합병증 사례에 대한 전향적 피오글리타존 임상 시험(PROActive)
PROActive에서, 제 2형 당뇨병과 함께 이전에 대혈관 질환의 병력이 있는 5,238명의 환자들에서 표준 치료에 부가적으로 이 약(2605명)을 1일 1회 45mg까지의 강제 적정(force-titration)하여 투여하거나 또는 위약(2633명)을 투여하였다. 거의 모든 피험자(95%) 심혈관계 약물을 투여하고 있었다(베사라린, 안지오텐신 전환효소(ACE) 억제제, 안지오텐신수용제 차단제(ARBs), 칼슘 채널 차단제, 질산염(nitrates), 이뇨제, 아스피린, 스타틴, 피브레이트). 환자들과의 평균 연령은 61.8세였고, 평균 당뇨 유병 기간은 9.5년이었으며, 평균 당화혈색소(HbA1c)는 8.1%였다. 평균 추적 관찰 기간은 34.5개월이었다. 이 시험의 1차 목적은 대혈관 합병증 사례의 위험이 높은 제 2형 당뇨병 환자가 있어서 사망 및 대혈관 합병증 위험에 미치는 이 약의 영향을 조사하는 것이었다. 1차 주요성 변수는 심혈관계 복합 평가 변수에 어떤 사례도든 최초로 병원될 때까지 걸린 시간이었다(이제 표 2참조). 이러한 평가 변수 내에서 최초 사례의 3년 발생율에 있어서 이 약과 위약 간에 통계적으로 유의한 차이는 없었지만, 이 약 군에서 사망 또는 총 대혈관 사례는 증가하지 않았다.

	위약 군 2633명		이 약 2605명	
심혈관계 사례	최초 사례 (명)	전체 사례	최초 사례 (명)	전체 사례
임의의 사례	572	900	514	803
모든 원인의 사망	122	186	110	177
비특정적 심근경색증	118	157	105	131
뇌졸중	96	119	76	92
급성 관상 동맥 증후군	63	78	42	65
심혈관 죽상경화	101	240	101	195
다중 동맥 질환증	15	28	9	28
다른 혈관 죽상경화	57	92	71	115

이 약의 시판후 조사에서 시력 감소를 동반한 당뇨병성 황반 부종의 새로운 발현 또는 악화가 또한 보고되었다 (5. 일반적 주의 중 황반 부종 참조).

방광암:

2년간의 발암성 시험을 실시한 결과 수컷 랫트에서 방광 종양이 관찰되었다. 위약 또는 글리버리드를 대조약으로 한 이 약의 3년간의 임상 시험 2건에서, 이 약을 복용하지 않은 환자 3679명 중 5명 (0.14%)에서 방광암이 보고되었다. 이 약을 복용한 환자 3656명 중 16명(0.44%)에서 방광암이 보고되었다. 방광암 진단 당시 시험약에 대한 노출 기간이 1년 미만인 환자를 제외한 결과, 이 약의 경우 6건(0.16%), 위약의 경우 2건(0.05%)으로 나타났다. 방광암 발생 사례가 극히 적어서 그 인과관계는 확실히 할 수 없었다.

임상검사치에서의 영향

●혈액학: 이 약은 헤모글로빈과 헤마토크리트의 감소를 일으킬 수 있다. 모든 임상시험에 걸쳐 이 약 투여군에서 평균 헤모글로빈 값이 2% ~ 4%만큼 감소하였다. 이런 변화는 일반적으로 투여 여 4~12주에 일어나 발생하였고 그 이후에는 정상적으로 안정되게 남아 있다. 이러한 변화는 이 약 투여와 관련있는 혈청 용적의 증가와 연관성이 있을 수 있으며, 유의한 어떠한 혈액학적인 임상 효과들도 관찰되지 않았다.

●혈청 트랜스아미나제 수치: 미국에서 실시된 모든 임상시험에서 이 약 투여환자 4,780명 중 총 14명(0.30%)이 ALT가 정상 상한치의 3배 이상이었다. 추적 follow-up value를 가진 20 환자에서 ALT의 상승이 가벼워졌으나, 이 약으로 치료한 환자 모집단에서, 빌리루빈, AST, ALT, 알칼라인 포스파타제(ALP), 및 GGT(Gamma Glutamyl Transferase)의 평균 값들이 기준치와 비교했을 때 최종 방문시 감소하였다. 이 약으로 치료한 환자의 0.9%만이 간기능 검사 이상으로 미국에서 실시한 임상시험을 중지하였다. 허가 된 임상시험에서, 간 기능부전을 초래하는 특이대증상 악화발현을 관찰은 없었다 (5. 일반적 주의 중 간에 대한 작용 참조).

●크레아티닌 포스파티드 키나제(CPK): 임상시험에서 요구되는 심혈합력 검사를 하는 동안, CPK 값의 산발적이고 일회적인 증가가 관찰되었다. 정상 상한치의(2150~11400 IU/L)까지의 값 10배를 넘는 단독, 고혈청 증가가 9명의 환자에서 나타났다. 이들 환자 중 6명은 이 약 투여를 계속하였고, 나머지 3명은 증가한 값에서 연구 약물투여를 완료하였으며, 한명의 환자는 이 값의 상승으로 인하여 시험약물을 중단하였다. 이러한 증가는 눈에 띄는 임상적 후유증 없이 해결되었다. 이러한 반응들과 약 요법과의 연관성은 알려지지 않았다.

2) 국내 시판 후 조사

- 국내에서 재시판용을 위하여 13,454명을 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 2.80%(377/13,454명, 445건)로 보고되었고, 이 중 심혈관계 유해사례는 1.37%(184/13,454명)였다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해사례는 1.58%(212명/13,454명, 236건)로 조사되었다. 부종 0.54% (73명/13,454명, 74건), 체중증가 0.49%(62명/13,454명, 62건), 저혈당증 0.13%(17명/13,454명, 17건), 어지러움 0.07(9명/13,454명, 9명), 상기도감염 0.03% (4명/13,454명, 4건), 혈당증상 0.04%(6명/13,454명, 6건), ALT/AST 상승 0.03%(4명/13,454명), 식욕부진, 빈혈, 위궤瘍, 두통 0.02%(3명/13,454명, 3건), 가슴통증, 피로, 식욕, 소화불량, 오심, 기력, 가려움, 변비, 위궤瘍, 두통, 이뇨제, 가려움 0.01%(2명/13,454명, 2건), 가슴통증, 발열, 오심, 위장장애질환, 복통, 명치불량, 전진감, 가려움, 피로, 근육통, 머리통, 간 효소증가, 간질질환과, 두드러기, 습진, 관절염, 무릎염, 사팔짐증상, 단변노, 크레이티린니혈증 증가, 불안, 불면증, 졸림, 단순헤르페스, 시각각소, 무릎염, 심장기능이상, 기립성저혈압, 두근거림, 뇌졸중, 생리이상성, 심근경색증, 각 1건으로 나타났다. 이 중 중대한 임상현상에는 부종, 간질질환과, 무릎이상, 뇌졸중이 각 0.01%(13,454명, 1건)이었다. 사팔짐 임상현상에서 나타나지 않았던 새로운 약물유해사례는 0.41%(55명/13,454명, 63건)으로 어지러움 0.07%(9명/13,454명, 9건), 식욕부진, 변비, 위궤瘍이 0.02%(3명/13,454명, 3건), 가슴통증, 피로, 식욕, 소화불량, 오심, 기력, 가려움, 변비, 위궤瘍 0.01%(2명/13,454명, 2건), 가슴통증, 위장장애 질환, 명치불량, 복부팽만, 전진감, 오심, 근육통적, 머리통, 간질질환과, 두드러기, 습진, 관절염, 두통, 무릎 이상, 팔 질환증상, 단변노, 크레이티린 혈당증상, 불안, 불면증, 졸림, 단순헤르페스, 시각각소, 고혈압, 기립성저혈압, 두근거림, 뇌졸중, 생리이상성, 심근경색증, 복통, 심장기능이상성이 각 1건 보고되었다(재시판용과 병발).
- 치아졸리딘디온계 약물중 심혈관계 위험과 관련한 분석 결과, 전체 환자 13,454명 중 심혈관계 동반질환(뇌혈관 장애 포함)이 있는 환자는 3,224명(23.96%)이었으며, 심혈관계 동반질환이 없는 환자로는 10,230명(76.04%)이었다. 심혈관계 유해사례, 부종의 발현율이 심혈관계 동반질환이 있는 환자에서 통계학적으로 유의하게 높게 나타났다(표3 참조).

	심혈관계 동반질환이 있는 환자 (3,224명)	심혈관계 동반질환이 없는 환자 (10,230명)	
심혈관계 유해사례	2.48%(80명)	1.02%(104명)	
부종	1.15%(37명)	0.44%(45명)	
심혈관계 이외의 유해사례	2.67%(86명)	1.22%(125명)	
어지러움	0.25%(8명)	0.08%(8명)	

- 신장에 환자에서의 발현률(19.39%, 19/98명)은 신장애가 없는 환자에서의 발현율(2.69%, 358/13,356명)보다 통계적으로 유의하게 높았다 (p<0.0001, odds ratio=4.787).
- 간장애 환자에서의 발현율(6.33%, 23/276명)은 간장애가 없는 환자에서의 발현율(2.69%, 354/13,178명)보다 통계적으로 유의하게 높았다 (p<0.0001, odds ratio=1.719).

5. 일반적 주의

1) 이 약은 인슐린의 존재 하에서만 항혈당효과를 나타낸다. 그러므로, 이 약은 제1형 당뇨병 환자나 당뇨병성 케톤산증의 치료 목적으로 사용하면 안 된다. 또한, 인슐린 저항성이 추후되는 환자에게 한하여 투여한다. 인슐린 저항성 기준은 신제질량지수(BMI) 24 이상이거나 인슐린 분비장애가 공복식 혈중 인슐린 값으로 5uU/mL이상이다.

2) 방광암: 2년간의 발암성 시험을 실시한 결과 수컷 랫트에서 방광 종양이 관찰되었다. 위약 또는 글리버리드를 대조약으로 한 이 약의 3년간의 임상 시험 2건에서, 이 약을 복용하지 않은 환자 3679명 중 5명(0.14%)에서 방광암이 보고되었고, 이 약을 복용한 환자 3656명 중 16명(0.44%)에서 방광암이 보고되었다. 방광암 진단 당시 시험약에 대한 노출 기간이 1년 미만인 환자를 제외한 결과, 이 약의 경우 6건(0.16%), 위약의 경우 2건(0.05%)으로 나타났다.

현재 진행 중인 10년간의 관찰 코호트 시험에 대한 5년 중간 보고서에서, 이 약에 노출되지 않은 피험자들에 비해 이 약이 노출된 피험자들에 대한 방광암 위험 증가는 유의하지 않은 것으로 관찰되었(HR 1.2(95%CI 0.97, 1.5)). 이 약에 노출되지 않은 경우와 비교하여, 12개월 이상의 이 약 치료에 대한 노출은 위험 증가(HR 1.4 [95%CI 0.9, 2.1])와 관련이 있었고, 이 약을 24개월 이상 사용한 경우 통계학적으로 유의하게도 높았다(HR 1.4 [95%CI 1.03, 2.9]). 이 시험에 대한 중간 결과는 이 약을 12개월 이상 복용하는 것은 방광암 발생에 대한 상대적 위험을 40% 증가시킨다는 것이었으며, 이는 10,000명 당 3명이라는 절대적 증가율에 동등하다 (10,000명당 약 7건이 약을 복용하지 않은 경우에서 10,000명당 약 10건이 약을 복용한 경우임으로 증가). 피오글리타존이 방광암에 대한 중앙 추적인자인지 아닌지를 결정하기에는 자료가 부족하다. 따라서 이 약을 활동성 방광암 환자에게 사용해서는 안된다. 이 약을 방광암의 기암력이 있는 환자에서 투여하는 경우 이 약 사용으로 인한 암 제발에 대한 알려지지 않은 위험 대비 혈당 조절의 유익성을 고려하여야 한다.

3) 저혈당증: 이 약을 인슐린이나 경구혈당강화제와 병용투여 받는 환자는 저혈당증 위험이 있을 수 있으므로, 병용 약물의 투여량을 감량할 필요가 있을 수 있다.

4) 심혈관계: 뉴욕심장학회 분류 3, 4 심장상태인 환자들을 배제한 미국의 위약대조 임상 시험에서, 이 약을 단독요법으로 치료하거나 설포닐우레아 또는 메트포르민과 병용한 환자들 더 위약 투여 환자들에서, 유효혈량(volume expansion)과 연관된 중대한 심장 이상반응의 발생률이 증가하지 않았다. 인슐린 병용 연구에서, 이 약을 인슐린과 병용 투여하였을 때, 심장 질환 병력을 지닌 환자들 중 소수가 유효성 심부전으로 전개되었다 (1. 경고 참조). 이 약은 임상 시험에서 뉴욕심장학회 분류 3,

- 심장상태인 환자들에 대하여 연구되지 않았으며 치료 적용으로 하지 않는다.
- 이 약의 시판후 조사에서, 예전에 심장 질환이 있었다고 알려진 환자 및 알려지지 않은 환자 모두에서 유효성 심부전의 증세가 보고되었다.
- 부종: 이 약은 부종이 있는 환자에게는 주의하여 사용하여야 한다. 미국의 모든 임상 시험에서 위약-투여 환자들보다 이 약을 투여한 환자들에서 부종이 더 빈번하게 보고되었다 (4. 이상반응을 위한 참조). 시판후 조사에서 부종의 시각이나 악화가 보고되었다. 이 약을 포함한 치아졸리딘디온계 약물들은 체액 저류를 일으킬 수 있고, 이로 인해 유효성 심부전을 악화시키거나 발전시킬 수 있으므로, 심부전의 위험이 있는 환자에게 이 약을 주의해서 사용해야 하며, 환자들을 심부전 징후 및 증상애 대하여 모니터링해야한다. (1. 경고 및 2. 일반적주의 중 환자를 위한 정보 참조).
- 체중 증가: 이 약은 단독 투여시 또는 다른 혈당강화 약물들과 병용 투여시 유량과 연관성이 있는 체중 증가가 나타났다 (표 4 참조). 체중 증가의 기전이 불분명하지만 아마도 체액 저류 및 지방 축적은 복합적으로 포함될 것 같다. 일부의 경우, 체중 증가는 심부전의 증상일 수 있으므로 체중을 면밀하게 모니터링 하여야 한다. 식이 조절이 당뇨 치료의 한 방법이므로, 열량을 조절한 식이요법을 엄격하게 지키도록 교육해야 한다.

	위약	이 약 15 mg	이 약 30 mg	이 약 45 mg
	중간값 (25th / 75th percentile)	중간값 (25th / 75th percentile)	중간값 (25th / 75th percentile)	중간값 (25th / 75th percentile)
단독 요법	-1.4 (-2.7/0.0)	0.9 (-0.5/3.4)	1.0 (-0.9/3.4)	2.6 (0.2/5.4)
	256명	79명	188명	79명
설포닐우레아 (Sulfonylurea)	-0.5 (-1.8/0.7)	2.0 (0.2/3.2)	3.1 (1.5/4.7)	4.1 (1.8/7.3)
	187명	183명	529명	333명
병용 요법	-1.4 (-3.2/0.3)	미측량	0.9 (-0.3/3.2)	1.8 (-0.9/5.0)
메트포르민 (Metformin)	0.2 (-0.4/0.8)	미측량	1.6 (0.5/4.3)	4.0 (1.4/6.8)
인슐린 (Insulin)	0.2 (-1.4/1.4)	2.3 (0.9/3.4)	3.3 (0.9/6.3)	4.1 (1.4/6.8)
	182명	190명	522명	333명

주: 16세지 26주의 시험 기간

7) 배란: 다른 치아졸리딘디온계 약물(thiazolidinediones)과 마찬가지로, 이 약을 투여하는 몇몇 폐경 전 무배란증 여성들에서 배란을 일으킬 수 있다. 그 결과, 이러한 환자들은 이 약을 복용하는 동안 임신의 위험이 증가될 수 있다. 그러므로, 폐경전 여성들에게 적절한 피임법이 권장되어야 한다. 임상 시험에서는 이러한 가능성은 작용이 연구되지 않았기 때문에, 이에 대한 발생 빈도가 알려지지 않았다.

8) 간에 대한 작용: 전체적으로도 시판 전 임상 연구에서, 4,500명 이상의 피험자에 대하여 이 약이 투여되었다. 미국의 임상연구에서,

컴피보르질 : 2일동안 먼저 컴피보르질 (600mg 경구로 하루에 두번)이 투여된 10 명의 건강한 자원자들에서 CYP2C8 저해제인 컴피보르질 (600mg 경구로 하루에 두번) 및 이 약 (30mg 경구)의 병용 투여 시 피코글리타존의 AUC가 피오글리타존 단독투여에 비해 226%인 피오글리타존 노출(AUC₀₋₂₄)을 초래하였다.

리람핀 : 5일동안 먼저 리람핀 (600mg 경구로 하루에 한번)이 투여된 10 명의 건강한 자원자들에서 CYP2C8 유도제인 리람핀 (600mg 경구로 하루에 한번)과 이 약 (30mg 경구)의 병용 투여는 피오글리타존 AUC에서 54%의 감소를 초래하였다.

7. 입부 및 수유부에 대한 투여

1) 피오글리타존은 기관형성기 동안 랫드에서 80mg/kg까지 경구 투여량에서 또는 토끼에160mg/kg 까지 투여했을 때 폐기형성이 없었다 (mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 각각 약 17 배 및 40 배). 분만 지면 및 배자독성(하수생 손 실증, 발생 지연, 태아 체중 감소)이 경구 투여량 40 mg/kg/일 (mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 10 배) 이상을 투여한 랫드에서 관찰되었다. 랫드의 자손에서 기능적인 또는 행동적인 독성이 발견되지 않았다. 토끼에서 160 mg/kg (mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 40배)의 경구 투여량에서 배자독성이 관찰되었다. 10 mg/kg (mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 2 배)이상의 경구 투여량에서 랫드 자손의 경우, 체중 감소에 의한 출생 후 발육의 지연이 임신 후기와 수유기 동안 관찰되었다.

임산부를 대상으로 적절하게 잘 조절된 (well-controlled) 연구가 없다. 임신 중에는 잠재적인 이득이 태아에 대한 잠재적인 위험을 정당화하는 경우에만 이 약을 사용하여야 한다.

현재의 정보에 따르면 임신 중 비정상적인 혈당치가 신생아 유행병 및 사망물의 좋은 증거만 아니라, 선천성 기형이 높은 발생빈도와 관련이 있다고 강력히 제기되기 때문에, 대부분의 전문가들이 임신 중에 혈당치를 가능한 한 정상에 가깝게 유지하기 위하여 인슐린을 사용할 것을 권장한다.

2) 피오글리타존은 수유중인 랫드의 유즙으로 분비된다. 이 약이 인체의 유즙으로 분비되는지 여부는 알려지지 않았다. 많은 약물이 인체의 유즙으로 분비되므로, 이 약을 수유부에게 투여하면 안 된다.

8. 소아에 대한 투여

이 약의 안전성과 효용성이 소아 환자에서 확립되지 않았다.

9. 고령자에 대한 투여

이 약의 위약-비교 임상 시험에서 약 500명의 환자가 65세 이상이었다. 이 환자들과 더 젊은 환자들 간에 효용성과 안전성 면에서 유의한 차이가 발견되지 않았다.

10. 과량투여시의 조치

비교 임상 시험 중, 이 약을 과량 투여한 1건의 중태가 보고되었다. 남성 환자가 4일간 120mg/일씩 복용하였고, 다음 7 일간은 180mg/일씩 복용하였다. 그 환자는 이 기간동안 어떤 임상적인 증상도 부 인하였다.

과량투여 사건이 발생하면, 환자의 임상 징후와 증상에 따라 적절한 지지요법을 시작하여야 한다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 보관할 것

2) 의약품을 원래 용기에 대해 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣어 꼭 닫아 보관한다.

12. 기타

1) 발달상, 변이형성, 수태능

암수 랫드를 대상으로 63 mg/kg (mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구 용량인 45mg의 약 14 배)까지의 경구 투여량에서 2년간의 발암성 연구가 수행되었다. 방광을 제외하고 어느 기관에서도 악을 유도성 종양이 발견되지 않았다. 양성 또는 악성 변이성 세포 신생물이 4 mg/kg/일 이상 (mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량과 거의 동일) 투여할 수있 랫드에서 발견되었다. 암수 마우스를 대상으로 100mg/kg/일 (mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 11배)까지의 경구 투여량에서 2년간의 발암성 연구가 수행되었다. 어느 기관에서도 악을 유도성 종양이 발견되지 않았다.

피오글리타존 염산염은 복귀돌연변이시험, 고유류세포 염색체이상시험(CHO/HPT 및 ASS2/XPR1), CHL 세포를 이용한 세포유전학 분석, 비정기적인 DNA 합성시험(unscheduled DNA synthesis assay), 소화시험 등과 같은 일련의 유전 독성 연구에서 변이형성이 나타나지 않았다. 고배와 임신 전 및 전체기간동안 매일 염산피오글리타존을 경구용량으로 40 mg/kg까지(mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 9배) 투여한 암수 랫드에서 수정능에 대한 이상 반응 (adverse effects)이 전혀 관찰되지 않았다.

2) 동물 독성

임산 피오글리타존을 경구 투여한 마우스 (100 mg/kg), 랫드 (4 mg/kg 이상), 개 (3 mg/kg)에서 심장 확장이 관찰되었다 (마우스, 랫드, 개에서 mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 각각 약 11배, 1배, 및 2 배). 1년간의 랫드 연구에서, 명백한 심장 기능부전증에 의한 악열-연관성 초기 사망이 160 mg/kg/일 (mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 35 배)의 경구 투여량에서 발생하였다. 원인이 다른 13 주간의 연구에서 8.9 mg/kg (mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 4 배) 이상의 경구 투여량에서 심장 확장이 나타났으나, 32 mg/kg (mg/m²를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 13 배)까지의 경구 투여량에 대한 52주간의 연구에서는 나타나지 않았다.

3) 작용 기전

이 약은 그 작용 기전에 있어서 인슐린의 존재에 의존적인 티아졸리딘온(thiazolidinedione)계 항당뇨병 약물이다. 이 약은 말초와 간에서 인슐린 저항성을 저하시킨다 그 결과 인슐린의존성 글루코스 이용이 증가하고 간 글루코스 배출량이 감소된다. 설프닐우레아와 달리 피오글리타존은 인슐린 분비촉진물질이 아니다. 피오글리타존은 과산화소체 증식제-활성화 수용체-감파 (PPAR-γ/Peroxisome proliferator-activated receptor-γ)호르몬이다. PPAR-γ 수용체는 인슐린 작용에 매우 중요한 조절인 지방 조직, 골격근, 간 등에서 발견된다. PPAR-γ 핵 수용체의 활성화는 글루코스와 지질대사를 조절하는데 관여하는 다수의 인슐린 반응성 유전자의 전사를 조절한다. 동물 당뇨병 모델에서, 피오글리타존은 제 2형 당뇨병과 같은 인슐린-저항상태인 과당당증, 과인슐린혈증, 과트라이글리세라이드혈증 성질을 감소시킨다. 피오글리타존에 의하여 생성된 대사 변화는 인슐린-의존성 조직의 반응성을 증가시키고 인슐린 저항성을 어느 수많은 동물 모델에서 관찰된다.

피오글리타존이 (인슐린 저항성을 감소시키므로) 순환 인슐린의 효과를 증진시키기 때문에, 내인성 인슐린이 결핍된 동물 모델에서 혈당을 저하시키지 않는다.

4) 약동학 및 약물 대사

① 약동학

총 피오글리타존 (피오글리타존+활성 대사체)의 혈청 농도는 1일 1회 투여 후 24시간에 증가된 채 남아있다. 피오글리타존과 총 피오글리타존 모두의 항당장상태(steady-state) 혈청 농도는 7일 이내에 도달한다. 항당장상태(steady-state)에서 피오글리타존의 약리학 활성 대사체들 중 2가지인 대식체 III (M-III)와 IV (M-IV)가 피오글리타존과 동일하거나 그 이상인 혈청 농도에 도달한다. 건강한 지원자 및 제 2형 당뇨병환자 모두에서, 피오글리타존은 피크 총 피오글리타존 혈청 농도의 약 30%~50% 및 총 혈중악물중독과관련한(AUO)의 20%~25%를 구성한다.

피오글리타존과 총 피오글리타존에 대한 최대 혈청 농도(Cmax), AUC, 최소 혈청 농도(Cmin)가 1일 15mg, 30mg의 투여용량에 비례하여 증가한다. 1일 60 mg의 투여용량에서 피오글리타존과 총 피오글리타존에 대하여 비례치보다 약간 더 적은 증가가 있었다.

흡수: 경구 투여 후 질식 상태에서, 피오글리타존은 30분 이내에 혈청에서 처음 측정가능하며, 농도는 2시간 이내에 관찰된다. 식사가 피크 혈청 농도에 도달하는 시간을 3 ~4 시간까지 약간 지연시키지만 흡수 정도를 변화시키지는 않는다.

분포: 단위 투여 후 피오글리타존의 평균 체분비 분포용적 (Vd/F)은 0.63 ± 0.41 (평균 ± SD) L/체중kg이다. 피오글리타존은 사람 혈장에서, 주로 혈장 단백질에 광범위하게 단백질-결합성(0.99%)이다. 피오글리타존은 다른 혈청 단백질에도 결합하나 그 친화력은 낮다. 대사체 M-III와 M-IV도 혈청 알부민에 광범위하게 결합한다(0.98%).

대사: 피오글리타존은 광범위하게 수산화와 산화에 의하여 대사된다. 그 대사체는 또한 글루쿠로나이드나 황 포함체(conjugate)로 전환된다. 대사체 M-II와 M-IV (피오글리타존의 수산화 유도체) 및 M-III (피오글리타존의 카르보닐 유도체)는 제 2형 당뇨병 동물 모델에서 약리학적으로 활성이다. 피오글리타존 외에 M-III와 M-IV는 반복 투여 후 사할 혈청에서 발견되는 주된 약물-연관성 종류이다. 항당장상태(Steady-state)에서, 건강한 지원자 및 제 2형 당뇨병환자 모두에서, 피오글리타존은 피크 총 피오글리타존 혈청 농도의 약 30%~60% 및 총 AUC의 20%~25%를 구성한다. Expressed human P450 또는 사람 간 마이크로솜에 배양한 피오글리타존은 M-IV 및 훨씬 적은 정도 M-III을 형성한다. 피오글리타존의 간 대사에 관여하는 주된 시토크롬 P450 isoforms은 CYP2C8과 CYP3A4이고 주요 간의 CYP1A1(extrahepatic CYP1A1)을 포함하는 다양한 다른 isoforms 도 기여한다. 케토코나졸은 in vitro에서 피오글리타존과 동일 한 불능도로 피오글리타존의 간 대사를 85%까지 저해하였다. 피오글리타존은 사람 P450간 마이크로솜과 배양할 때 P450 활성을 방해하지 않는다. 피오글리타존에 의한 CYP3A4의 유도에 대하여 조사하기 위한 사람을 대상으로한 연구가 수행되지 않았다.

배설 및 제거: 경구 투여 후 약 15%~30%의 피오글리타존 투여량이 소변에서 발견된다. 피오글리타존의 신 소변은 무시할 정도이며, 약물이 주로 대사체 및 포함체(conjugates)로 배설된다. 경구 투여량의 대부분이 그대로 또는 대사체로서 담즙으로 배설되고 대변으로 제거된다고 추정 된다. 피오글리타존 및 총 피오글리타존의 평균 혈청 반감기는 각각 3~7 시간 및 16~24시간 범위 있다. 피오글리타존은 재산성 체분비 체소율 (CL/F)가 5~7 L/hr이다.

② 독성 징상

신장에 환자: 중독도 (크레아티닌 청소율 30~60 mL/분)-중증(크레아티닌 청소율 <30 mL/분)의 신장에 환자에서 정상 피험자와 비교하였을 때, 피오글리타존, M-III, M-IV의 혈청 제거 반감기가 변하지 않는다. 신 기능부전환자에서 혈액량의 조절이 권장되지 않는다 (용법 · 용량 참조).

간장애환자: 정상 대조군과 비교하였을 때, 간 기능장애에 피험자(Child-Pugh Grade B/C)는 피오글리타존 총 피오글리타존 평균 피크 농도에서 약 45%가 감소하였다. 평균 AUC 값은 변하지 않았다. 이 약의 요법은 환자가 만약 활동성 간 질환의 임상적 증거가 나타나거나 혈청 트랜스아미나아제 값(ALT)이 정상 상한선의 2.5배를 초과하면 시작하지 않아야 한다 (5. 일반적 주의 의 중간에 대한 작용 참조).

고령 환자: 건강한 고령의 피험자들에서, 피오글리타존과 총 피오글리타존의 피크 혈청 농도가 크게 다르지 않았으나, 젊은 피험자들보다 AUC 값이 약간 더 높았고 최종 반감기 값이 약간 더 길었다. 이러한 변화는 임상적으로 연관성 있다고 고려할 정도로 중대하지 않다.

소아 환자: 소아 집단에서의 약동학 자료가 이용 가능하지 않다.

성별: 여성에서 평균 Cmax, AUC값이 20%~60% 증가하였다. 단독요법과 설프닐우레아, 메트포르민, 인슐린과의 병용요법으로서, 이 약은 남성, 여성 모두에서 혈당 조절을 개선하였다. 비교 임상 시험에서 기존선으로부터 당화혈색소 (HbA1c)의 감소는 일반적으로 남성보다 여성에서 더 컸다 (HbA1c에서의 평균 차이: 0.5%. 혈당 조절을 성취하기 위하여 치료법이 각 환자마다 개별화되어야 하므로, 성별에만 근거한 투여량의 조정은 권장되지 않는다).

인종적 차이: 다양한 인종군 사이에서의 약동학 자료가 이용 가능하지 않다.

③ 약력학 및 임상적 효과

임상 연구 결과 이 약은 인슐린-저항성 환자에서 인슐린 감수성을 향상시킨다고 나타났다. 이 약은 인슐린에 대한 세포의 반응성을 증진시키고, 인슐린 의존성 글루코스 이용을 증가시키고, 인슐린에 대한 HbA1c를 증가시키며, 글루코스 항상성 장해를 개선한다. 제 2형 당뇨병환자에서, 이 약에 의해 생긴 인슐린-저항성 감소는 혈당 농도의 감소, 혈장 인슐린 농도의 감소 및 HbA1c값의 감소를 가져온다. 광범위 공개 임상시험에서 얻은 결과를 근거로, 이 약의 혈당강화 작용은 적어도 1년간 지속되는 것으로 보인다. 비록 임상시험에서 설프닐우레아, 메트포르민, 또는 인슐린과 병용투여한 이 약은 혈당 조절에 대한 추가적 작용을 나타내었다.

지질 이상 환자가 이 약 임상 시험에 포함되었다. 전체적으로, 이 약을 투여한 환자에서 트리글리세리드의 평균 감소, HDL 콜레스테롤의 평균 증가, LDL과 총 콜레스테롤의 일관되지 않은 평균 변화가 나타났다.

26주간, 위약대조 용량-범위 연구에서, 위약군의 평균 증가와 비교하였을 때, 평균 트리글리세리드 농도가 15 mg, 30mg, 45mg 용량 투여군에서 감소하였다. 평균 HDL 값이 위약 투여 환자보다 이 약 투여환자에서 훨씬 크게 증가하였다. 위약과 비교하였을 때 이 약 투여환자에서 LDL과 총 콜레스테롤에 대한 일관된 차이가 없었다.(표5 참조)

[표5] 26주 위약대조 용량-범위 연구에서 지질

	위약	이 약 15 mg 1일 1회	이 약 30 mg 1일 1회	이 약 45 mg 1일 1회
트리글리세라이드 (mg/dL)	79명	79명	84명	78명
기존선 (평균)	262.8	283.8	261.1	259.7
기존선에서의 % 변화 (평균)	4.8%	-9.0%	-9.6%	-9.3%
HDL 콜레스테롤 (mg/dL)	79명	79명	83명	77명
기존선 (평균)	41.7	40.4	40.8	40.7
기존선에서의 % 변화 (평균)	8.1%	14.1%	12.2%	19.1%
LDL 콜레스테롤 (mg/dL)	65명	63명	74명	62명
기존선 (평균)	138.8	131.9	135.6	126.8
기존선에서의 % 변화 (평균)	4.8%	7.2%	5.2%	6.0%
총 콜레스테롤 (mg/dL)	79명	79명	84명	77명
기존선 (평균)	224.6	220.0	222.7	213.7
기존선에서의 % 변화 (평균)	4.4%	4.6%	3.3%	6.4%

다른 2개의 단독요법 연구(24주 및 16주) 및 설프닐우레아 (16주), 메트포르민 (16주)과의 병용 투여의 결과는 위 자료와 일반적으로 일치하였다. 이 약 투여환자에서, 기존선으로부터 위약이 보정된 평균 % 변화가 트리글리세리드에 대하여는 5 %~26 %감소하였고, HDL콜레스테롤에 대하여는 6%~13% 증가하였다.

인슐린과의 병용요법(16주)에서 이 약 투여환자에 대한 트리글리세라이드 값의 경우, 기존선으로부터 위약-보정된 평균 % 변화가 역시 감소하였다. 15mg 투여량 군에 대하여 LDL콜레스테롤에서 기존선으로부터 위약-보정된 평균 변화가 7%로 관찰되었다. HDL과 총 콜레스테롤에 대하여 위에서 언급한 내용과 유사한 결과가 관찰되었다.

⑥ 임상시험

① 단독요법

미국에서, 3 개의 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 임상시험이 16~26주의 기간으로 제2형 당뇨병 환자에게서 단독요법으로 이 약 사용을 평가하기 위하여 수행되었다. 이 연구들은 865명의 환자에서 이 약 45mg 까지 또는 위약을 1일 1회로 투여량으로 검사하였다. 26주에 걸친 용량범위 연구에서, 제2형 당뇨병 환자 408명에 대하여 무작위적으로 이 약 7.5mg, 15mg, 30mg 또는 45mg, 또는 위약을 1일 1회 투여하였다. 이중맹검 기간 8주 전에 이전에 투여했던 어떤 항당뇨병요법도 중단하였다. 이 약 15mg, 30mg, 45mg 요법은 위약과 비교시 종로 시험에서 HbA1c 및 공복시혈당(FPG)을 통계학적으로 유의하게 개선하였다 (Figure 1, 표 6 참조).

Figure 1은 이러한 26주 연구에서 전체 연구 집단에서의 FPG와 HbA1c의 변화에 대한 시간 경과를 나타낸다.




표 6는 전체 임상연구 집단에 대한 HbA1c와 FPG 값을 나타낸다.

[표 6] 26주 위약대조 용량범위 시험 혈당 척도

	위약	이 약 15 mg 1일 1회	이 약 30 mg 1일 1회	이 약 45 mg 1일 1회
총 환자수	79명	79명	85명	76명
HbA1c (%)	79명	79명	85명	76명
기존선 (평균)	10.4	10.2	10.2	10.3
기존선에서의 % 변화 (조정평균*)	0.7	-0.3	-0.3	-0.9
위약과의 차이 (조정 평균*)		-1.0*	-1.0*	-1.6*
FPG (mg/dL)	79명	79명	84명	77명
기존선 (평균)	268	267	269	276
기존선에서의 % 변화 (조정평균*)	9	-30	-32	-56
위약과의 차이 (조정 평균*)		-39*	-41*	-65*

+ 기존선, pooled center, 요법 상호작용에 의한 pooled center에 대하여 조정됨.

* p < 0,050 대 위약.

본 연구 집단은 이전에 항 당뇨병약요법을 받지 않았던 환자(경형이 없는: 31%)와 연구 등록 시험에서 항 당뇨병약요법을 받은 환자 (이전에 치료 받았던: 69%)를 포함하였다. 이전에 항당뇨약요법을 받지 않았던 환자와 이전에 치료환자 부분집단의 자료는 표 7에 있다. 모든 환자는 이중-맹검 요법 8주 전에 washout/run-in 기간에 진입하였다. Run-in 기간은 이전에 항당뇨약물요법을 받지 않았던 환자에 대한 기존선까지의 선별검사법 (sampling)으로부터 HbA1c와 FPG값의 근소한 변화를 수반하였다. 그러나, 이전 치료 환자에게서 전에 받은 항당뇨약물요법의 washout이 혈당 조절의 악화와 HbA1c, FPG의 증가를 가져왔다. 이전 치료환자군의 대부분의 환자가 이 약 투여시 HbA1c, FPG가 기존선보다 감소했어도 불구하고, 많은 경우에 그 값이 연구 종료 때까지 선별검사 값으로 회복되지 않았다. 이 연구 계획은 다른 항 당뇨병약에서 이 약으로 바로 환자에 대한 평가는 허용하지 않았다.

[표 7] 26주 위약대조 용량범위 시험(Dose-Ranging Study)에서 혈당 척도

	위약	이 약 15 mg 1일 1회	이 약 30 mg 1일 1회	이 약 45 mg 1일 1회
이전에 항당뇨병요법을받지않았던환자				
HbA1c (%)	25명	26명	26명	21명
선별검사법 (평균)	9.3	10.0	9.5	9.8
기존선 (평균)	9.0	9.9	9.3	10.0
기존선에서의 % 변화 (조정평균*)	0.6	-0.8	-0.6	-1.9
위약과의 차이 (조정 평균*)		-1.4	-1.3	-2.6
FPG (mg/dL)	25명	26명	26명	21명
선별검사법 (평균)	223	245	239	239
기존선 (평균)	229	251	225	235
기존선에서의 % 변화 (조정평균*)	16	-37	-41	-64
위약과의 차이 (조정 평균*)		-52	-56	-80
이전에 항당뇨병요법을받은환자				
HbA1c (%)	54명	53명	59명	55명
선별검사법 (평균)	9.3	9.0	9.1	9.0
기존선 (평균)	10.9	10.4	10.4	10.6
기존선에서의 % 변화 (조정평균*)	0.8	-0.1	-0.0	-0.6
위약과의 차이 (조정 평균*)		-1.0	-0.9	-1.4
FPG (mg/dL)	54명	53명	58명	56명
선별검사법 (평균)	222	209	230	215
기존선 (평균)	285	275	286	292
기존선에서의 % 변화 (조정평균*)	4	-32	-27	-55
위약과의 차이 (조정 평균*)		-36	-31	-59

*기존선과 pooled center에 대하여 조정됨

24주 연구에서 제 2형 당뇨병 260명의 환자에게 무작위로 두 가지 중 하나의 강제적정 (forced-titration)이 약 투여 군이나 모의적정(mock titration) 위약군에 배정하였다. 이중맹검 기간 6주 전에 이전에 투여했던 어떤 항 당뇨병요법도 중단하였다. 이 약의 한 투여 군에서, 환자에게 초기 투여량 7.5mg을 1일 1회 투여하였다. 4주 후, 투여량을 1일 1회 15mg으로 증량하였고, 다른 4주 후, 연구의 나머지 기간(16주) 동안 투여량을 1일 1회 30mg으로 증량하였다. 두 번째 이 약 투여 군에서, 환자에게 초기 투여량 15mg을 1일 1회 투여하였고 1일 1회 30mg까지 적정하였고, 유사한 방법으로 1일 1회 45mg까지 적정하였다. 서술한 대로, 이 약 요법은 위약과 비교 시 종로시험에서 HbA1c 및 FPG를 통계학적으로 유의하게 개선하였다 (표 8 참조).

[표 8] 24주 위약대조 강제적정시험(Forced-Titration Study)에서 혈당 척도

	위 약	이 약 30mg* 1일 1회	이 약 45mg* 1일 1회
총 환자수			
HbA1c (%)	83명	85명	85명
기존선 (평균)	10.8	10.3	10.8
기존선에서의 % 변화 (조정평균**)	0.9	-0.6	-0.6
위약과의 차이 (조정 평균**)		-1.5*	-1.5*
FPG (mg/dL)	78명	82명	85명
기존선 (평균)	279	268	281
기존선에서의 % 변화 (조정평균**)	18	-44	-50
위약과의 차이 (조정 평균**)		-62*	-68*

+ 강제적정(forced titration)에서 최종 투여량

+ + 기존선, pooled center, 요법 상호작용에 의한 pooled center에 대하여 조정됨.

* p < 0,050 대 위약.

이전에 항 당뇨병약물요법으로 치료 받은 적이 없는 환자(24%)에 대하여, 선별검사법에서의 평균값은 HbA1c에 대하여 10.1%이었고, FPG에 대하여 238 mg/dL이었다. 기존선에서 평균 HbA1c는 10.2%이었고, 평균 FPG는 243 mg/dL이다. 위약과 비교시, 최종 투여량 30mg과 45mg까지 적정하여 이 약으로 치료한 결과, 평균 HbA1c에서는 기존선으로부터 각각 2.3%와 2.6% 만큼 감소하였고, 평균 FPG에서는 기존선으로부터 각각 83 mg/dL와 95 mg/dL 만큼 감소하였다. 이전에 항 당뇨병약물요법으로 치료했던 환자(76%)에 대하여, 선별검사시 그 요법을 중단하였다. 선별검사시 평균 값은 HbA1c에 대하여 9.4%이었고, FPG에 대하여 216 mg/dL이었다. 기존선에서 평균 HbA1c는 10.7 %이고 평균 FPG는 290 mg/dL이었다. 위약과 비교시, 최종 투여량 30 mg과 45 mg까지 적정하여 이 약으로 치료한 결과, 평균 HbA1c에서는 기존선으로부터 각각 1.3 %와 1.4 % 만큼 감소하였고, 평균 FPG에서는 기존선으로부터 각각 55 mg/dL와 60 mg/dL 만큼 감소하였다. 이전에 치료했던 많은 환자들에 대하여, 임상연구 종로시험까지 HbA1c와 FPG가 적격심사 수준으로 회복되지 않았다.

16 주 임상 연구에서, 제 2형 당뇨병 환자 137 명에게 이 약 30 mg이나 위약을 매일 무작위 투여하였다. 이전의 어떠한 항당뇨병 약물요법이라도 이중맹검 기간 6 주 전에 중지하였다. 이 약 30 mg 투여한 결과, 위약과 비교하였을 때 종로시험에서 HbA1c와 FPG가 통계학적으로 유의하게 개선되었다 (표 9 참조).

[표 9] 16주 위약대조 연구에서 혈당 척도

	위 약	이 약 30 mg 1일 1회
총 환자수		
HbA1c (%)		
기존선 (평균)	83명	100명
기존선에서의 % 변화 (조정평균*)	10.3	10.5
위약과의 차이 (조정 평균*)	0.8	-0.6
FPG (mg/dL)		
기존선 (평균)	91명	99명
기존선에서의 % 변화 (조정평균*)	270	273
위약과의 차이 (조정 평균*)	8	-50
위약과의 차이 (조정 평균*)		-58*

+ 기존선, pooled center, 요법 상호작용에 의한 pooled center에 대하여 조정됨.

* p < 0,050 대 위약.

이전에 항 당뇨병 약물치료를 받은 적이 없는 환자 (40%)의 경우, 스크리닝기에서의 평균 값이 HbA1c는 10.3 %이고 FPG는 240 mg/dL이었다. 기존선에서, 평균 HbA1c는 10.4%, 평균 FPG는 254 mg/dL이었다. 위약과 비교 시, 이 약 30 mg으로 치료한 결과, 평균 HbA1c는 기존선으로부터 1.0 % 감소하였고, 평균 FPG는 기존선으로부터 62 mg/dL 감소하였다. 이전에 항당뇨병 약물치료를 받은 환자들 (60 %)은 스크리닝 시험에서 이전의 항당뇨병 약물치료를 중지하였다. 스크리닝 시험의 평균 값이 HbA1c는 9.4 %이고 FPG는 218 mg/dL이었다. 기존선에서 평균 HbA1c는 10.6%, 평균 FPG는 287 mg/dL이었다. 위약과 비교시, 이 약 30 mg으로 치료한 결과, 평균 HbA1c는 기존선으로부터 1.3 % 감소하였고, 평균 FPG는 기존선으로부터 46 mg/dL 감소하였다. 이전에 치료했던 많은 환자들에 대하여, 임상연구 종로시험 이 HbA1c와 FPG가 적격심사 수준으로 회복되지 않았다.

② 병용 요법

설프닐우레아, 메트포르민, 혹은 인슐린에 의한 현행의 치료법에도 불구하고 조절이 부적절하게 조절된 (HbA1c ≥ 8 %) 제 2형 당뇨병 환자들에서, 혈당 조절에 대한 이 약의 효과를 평가하기 위하여 3 개의 16 주에 걸친, 무작위, 이중맹검, 위약대조 임상시험이 수행되었다. 이전의 당뇨병 치료는 단독요법 혹은 병용 요법에 이용할 수 있다.

이 약과 설프닐우레아의 병용요법

이 약과 설프닐우레아의 병용 요법에 대하여 두 개의 임상시험들이 수행되었다. 두 개의 시험들은 설프닐우레