

 KGMP 한국약학계 지킴이	 전문의약품 분류번호:396
---	---

제2형 당뇨병 치료제 그루타존정 15mg 피오글리타존염산염(Pioglitazone Hydrochloride)

그루타존정은 1일 1회 투여로 당뇨병 환자의 인슐린 저항성을 개선하고 인슐린 분비세포를 보호시켜 근근적인 치료를 가능하게 하는 우수한 혈당강화 효과를 나타내는 제2형 당뇨병 치료제입니다. 그루타존정은 인슐린 분비를 자극하지 않으며 체중증가 보호를 통한 당뇨병자의 장기치료안제로 적합하며, 이 외에도 심혈관 질환의 독립적 위험인자인 중성지방을 감소시키며, HDL-콜레스테롤을 증가시켜 동맥경화의 예방에도 도움을 줍니다

【**원료약품의 분량**】1정 중 피오글리타존염산염(분량) 16.53mg (피오글리타존으로서 15mg)
참가제(동용량래) : 유당수화물

【**성**상】백색 내지 회백색의 불룩한 원통형 정제

【**효능·효과**】

이 약은 제 2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.

1. 이 약은 단독요법으로 투여한다.

2. 이 약은 다음의 경우 병용요법으로 투여한다.

다른 경우용 혈당강화제를 사용했음에도 불구하고 혈당개선효과를 보지 못했을 경우에는 설포닐우레아제, 메트포르민 혹은 인슐린과 함께 병용투여

제2형 당뇨병환자는 이 외에도 영양 상담이 필요하며 경우에 따라서는 체중감량도 요구되고, 운동요법도 실시하여야 한다. 제2형 당뇨병 환자에 있어서 이러한 노력들은 초기치료뿐만 아니라 약물요법의 효력을 유지하기 위해서도 중요하다.

【**용법·용량**】

이 약은 식사에 관계없이 1일 1회 경구투여한다.

당뇨병의 관리는 각자 개인적으로 처벌화 되어 실시하여야 한다. 가장 이상적인 방법은 공복혈당(FBG)보다는 더 정확한 진단방법인 당화헤모글로빈(HbA1c) 수치를 보아야하며 치료의 반응을 평가하여야 한다. 당화헤모글로빈은 과거 2 ~ 3개월 간의 혈당상태를 반영한다. 임상적으로 이 약은 당뇨병환자가 혈당절정이 더 악화되지 않는다면 당화헤모글로빈의 변화를 평가하기에도 적당한 기간(최소 3개월)은 되어야 하한다. 18세 미만의 소아에게 사용경험이 없으므로 투여가 권장되지 않는다.

1. 단독요법

이 약은 식사요법과 운동요법으로 혈당이 적절한 조절되지 않는 환자에게 단독요법으로 피오글리타존으로서 1일 1회 15mg으로 시작할 수 있다. 이 약의 초기 투여량으로 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우에는 이 약으로서 1일 1회 30mg까지 증량할 수 있다. 단독요법에 적절한 반응하지 않는 환자들에게는 병용요법을 고려하여야 한다.

2. 병용요법

1) 설포닐우레아 : 이 약은 설포닐우레아제 약물과 병용투여 할 수 있으며 이때 초기용량은 1일 1회 15mg을 투여한다. 이 약과 병용요법으로 사용할 경우 환자의 설포닐우레아제 약물은 동일한 용법용량으로 지속적으로 투여할 수 있다.

그러나 만약 환자가 저혈당 증세를 보이면 설포닐우레아 투여량을 줄여야 한다.

2) 메트포르민 : 이 약은 메트포르민과 병용투여 할 수 있으며 이때 초기용량은 1일 1회 15mg을 투여한다. 이 약과 병용요법으로 사용할 경우 현재의 메트포르민은 동일한 용법용량으로 지속적으로 투여할 수 있다. 이 약과의 병용요법을 하는 동안 저혈당 증세 때문에 메트포르민 투여량을 조정할 필요가 있을 것 같지는 않다.

3) 인슐린 : 이 약은 인슐린과 병용투여 할 수 있으며 이 때 용량은 1일 1회 15mg을 투여한다. 이 약은 병용요법을 시작할 때에 현재의 투여량을 지속적으로 유지할 수 있다. 그러나 이 약과 인슐린을 병용투여 받는 환자가 만약 저혈당 증세를 보이거나 혈당 글루코즈 농도가 100mg/dl 이하로 감소하게 되면 인슐린 투여량을 10 ~ 25%까지 감량할 수 있다. 이후의 용량조정은 혈당의 조절상태에 따라 개별적으로 조절한다.

• 최대 권장용량

단일요법 또는 설포닐우레아, 메트포르민, 인슐린과의 병용요법의 경우 1일 1회 30mg을 초과하는 용량은 권장되지 않는다. 신기능부전증 환자에서의 투여량 조정이 권장되지 않는다면반적 주의항 신장에 환자 참고).

치료법 시작시점에서 환자가 활동증 강질이나 혈청 아마노전달효소 수치 증가(ALT 정상상한치의 2.5배 이상)의 임상적 증거를 보일 경우 이 약 요법을 시작하면 안된다(이상반응 및 일반적 주의항의 간에 대한 작용 참고). 이 약 요법을 시작하기 전과 그 후 정기적으로 모든 환자에서 간 효소 모니터링이 권장된다. 다른 티오졸리딘디온과의 병용요법으로 이 약을 투여한 데이터가 없다.

【**사용상의 주의사항**】

1. 경고

1) 이 약을 포함한 티아졸리딘디온계 약물은 일부 환자에서 올혈형심부전을 일으키거나 악화시킬 수 있다. 이 약으로의 치료를 시작하거나 투여량을 증가시킨 후에 심부전의 증상 및 징후(과도한 급속한 체중변화, 호흡곤란, 부종 포함)에 대하여 환자를 주의깊게 관찰하여야 한다. 이러한 증상 및 징후가 나타나다면 심부전은 현재의 표준치료 요법에 따라 관리되어야 한다. 또한 이 약의 투여중지 또는 강량이 고려되어야 한다.

2) 심부전 환자는 이 약으로의 치료를 시작해서는 안된다. 중후성 심부전 환자에서 이 약의 투여는 권장되지 않는다.

3) 심부전증 및 신장에 대한 다른 작용

이 약은 다른 티아졸리딘디온계 약물(thiazolidinediones)과 마찬가지로, 단독 또는 인슐린 등의 다른 항 당뇨병약들과 병용 투여할 때 체액 저류를 일으킬 수 있다. 체액 저류는 심부전증을 유발하거나 악화시킬 수 있다. 환자들은 심부전증의 징후나 증상에 대하여 관찰 받아야 한다(일반적 주의 항 환자를 위한 정보 참고). 이러한 증상 및 징후가 나타날 경우, 심부전은 현행 표준 치료법에 따라 관리되어야 한다. 또한 이 약의 투여 중단이나 용량 강소가 고려되어야 한다.

제 2형 당뇨병 환자 566명을 대상으로 한, 미국에서의 16주, 이중맹검, 위약대조 임상 시험에서, 인슐린과 이 약 15mg 및 30mg을 투여한 병용요법과 인슐린 단독요법을 비교하였다. 이 임상시험은, 오래 계속된 당뇨병과 다음과 같이 유발률이 높은 기존의 의학적 증상을 갖는 환자들을 포함하였다. : 동맥성 고혈압(57.2%), 말초 신경병증(22.6%), 관상 동맥질환(19.6%), 망막증(13.1%), 심근경색(8.8%), 혈관질환(6.4%), 협심증(4.4%), 뇌졸중 및/또는 일과성허혈성발작(4.1%), 및 올혈형심부전(2.3%).

이 연구에서, 인슐린 단독요법에 대한 187명의 환자 중 아무도 올혈형심부전으로 진단되지 않았던 것과 비교할 때, 이 약 15mg과 인슐린을 투여 받은 191명의 환자 중 2명(1.0%)과 이 약 30mg과 인슐린을 투여 받은 1188명의 환자 중 2명(1.1%)이 올혈형심부전으로 진단되었다. 이 네 명의 환자들은 모두가 관상 동맥 질환, 관상동맥우회술 이전(previous CABG procedures), 심근경색 등의 심혈관 이상의 병력을 가지고 있었다. 또한, 이 약과 인슐린을 병용투여한 24주의 용량조절 시험에서, 30mg 투여군의 0.3%(1/345) 및 45mg 투여군의 0.9%(3/345)가 중대한 이상반응으로 올혈형심부전을 보고되었다.

이 연구의 분석 데이터로부터, 인슐린과의 병용 요법시 올혈형심부전의 증가 위험을 예방할 수 있는 특이한 인자가 확인되지 않았다.

제2형 당뇨병이 있고, 기존에 주요한 대혈관 질환이 있는 75세 미만의 환자를 대상으로 피오글리타존의 심혈관계 결과 변수 시험을 수행하였다. 이 약 또는 위약을 기존의 혈당제 및 심혈관계 요법에 추가하여 최대 3.5년간 투여하였다. 이 시험은 심부전의 보고가 있었음을 보여주었으나 이로 인해 이 시험에서 사망률이 증가하지는 않았다. 이러한 환자들에 대한 경향이 제한되었으나, 75세 이상의 환자에 대해서는 주의해서 사용해야 한다.

4) 대혈관 합병증 사례에 대한 전향적 피오글리타존 임상시험(ProActive)
PROActive에서, 제2형 당뇨병과 함께 이전에 대혈관 질환의 병력이 있는 5,238명의 환자들에서 이 약2(6.05명)을 1일 1회 45mg/까지의 강제 적정(force-titration)하여 투여하거나 또는 위약(2.633명)을 투여하였다(이상반응을 참고). 중대한 심부전증을 나타낸 환자의 비율은 이 약을 투여한 환자군(6.7%, 149명)에서 위약 투여군 환자(4.1%, 108명)에 비해 더 높았다. 중대한 심부전의 보고에 이어 사망의 발생률은 이 약 투여군 환자에서 1.5%(40명), 위약 투여군 환자에서 1.4%(37명)였다. 배이스리얼에서 이 약과 인슐린을 투여한 환자에 있어서 중대한 심부전의 발생률은 6.3%(54명/864명)이고, 위약에서는 5.2%(47명/896명)였다. 이 약과 설포닐우레아를 투여한 환자에 있어서 중대한 심부전의 발생률은 5.8%(94명/1,624명)였고, 위약에서는 4.4%(71명/1,626명)이었다.

5) 치료 중 육안적 혈뇨 또는 배뇨장애나 질박뇨와 같은 기타 증상의 징후가 발견되거나 증가되는 경우, 이러한 증상들은 방광염에 기인한 것일 수 있으므로, 의사에게 즉시 알리도록 환자에게 한시하여 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대하여 과민반응이 알려진 환자

2) 심부전 환자 또는 심부전 병력 환자(동실실험에서 순환혈장량의 증가를 동반한 대상성 변화라고 생각되는 중량의 증가가 나타났으며, 임상적으로는 심부전을 악화 또는 발병시켰다는 보고가 있다.)

3) 활동성 방광암 환자 또는 방광염 병력 환자

4) 간장애 환자

5) 중증 신장애 환자

6) 당뇨병성 개탄산증 환자, 당뇨병성 혼수 및 전 혼수, 제1형 당뇨병 환자

7) 수술 전후, 중증 감염증 환자, 중증 외상 환자(인슐린 주사에 의한 혈당관리가 바람직하므로 이 약의 투여는 적절하지 않다.)

8) 소사지식 않은 육안적 혈뇨 환자

9) 입부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

10) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자(경우)에는 신중히 투여할 것.

1) 다른 경우용 혈당강화제를 복용중인 환자

2) 폐경전 여성

3) 부종이 있는 환자

4) 심부전 발병 우려가 있는 심근경색, 협심증, 심근증, 고혈압성 심질환 등의 심질환이 있는 환자(순환혈장량의 증가에 의해 심부전을 발생시킬 우려가 있다.)

5) 신기능장애 환자

6) 뇌하수체기능부전 또는 부신기능부전 환자

7) 영양불균형증, 기아상태, 불규칙적인 식사섭취, 식사섭취량의 부족 또는 식약상태 (저혈당을 일으킬 우려가 있다.)

8) 격렬한 근육운동(저혈당을 일으킬 우려가 있다.)

9) 과도한 알코올 섭취자(저혈당을 일으킬 우려가 있다.)

10) 고령자

4. 이상반응

1) 외국 임상시험 및 시판후 조사

(1) PROActive 임상시험에서 이 약을 투여 받은 제2형 당뇨병 및 대혈관 질환이 있는 2,605명의 환자를 포함하여, 8,500명 이상의 제2형 당뇨병 환자들이 무작위 배정, 이중 눈가림, 대조 임상시험에서 이 약을 투여 받았다. 이들 임상시험에서 6,000명 이상의 환자들이 6개월 이상 동안 이 약을 투여 받았고, 4,500명 이상의 환자들이 1년 이상 동안 이 약을 투여 받았으며, 3,000명 이상의 환자들이 최소 2년 동안 이 약을 투여 받았다. 16~26주 위약대조 단독요법 시험 및 16~24주 병용요법 임상시험 3건을 통합하였을 때, 이상반응으로 인한 시험 중단 발생률은 이 약을 투여 받은 환자의 경우 4.5%였고, 대조 약을 투여 받은 환자의 경우 5.8%였다. 시험 중단을 유발한 가장 흔한 이상 반응은 부적절한 혈당조절과 관련되어 있었으나 이들 이상 반응의 발생률은 위약(3.0%)에 비해 이 약(1.5%)에서 더 낮았다.

PROActive 임상시험에서 이상반응으로 인한 시험 중단 발생률은 이 약을 투여 받은 환자의 경우 9.0%였고, 위약을 투여 받은 환자의 경우 7.7%였다. 올혈형심부전은 시험 중단을 유발한 가장 흔한 중대한 이상 반응이었으며, 이 약을 투여 받은 환자의 1.3%, 위약을 투여 받은 환자의 0.6%에서 발생하였다.

(2) 흔한 이상반응 : 16~26주 단독요법 임상시험
이 약에 대한 16~26주 위약대조 단독요법 임상시험 3건을 통합하였을 때 보고된 흔한 이상반응의 발생률 및 종류는 표1과 같다. 아래에 요약된 반응은 5%를 초과하여 발생한 이상 반응 및 위약을 투여 받은 환자에 비해 이 약을 투여 한 환자들에서 더 흔하게 발생한 이상반응을 나타낸다. 이들 이상 반응 중 어떤 것도 이 약의 용량과 관련되지 않았다.

표1 이 약에 대한 16~26주 위약대조 단독요법 임상시험 3건 통합 자료 : 5%를 초과하여 발생한 이상반응 및 위약을 투여 받은 환자에 비해 이 약을 투여 받은 환자들에서 더 흔하게 발생한 이상반응			
	환자 비율(%)		
	위 약(259명)	이 약(606명)	
상기도 감염	8.5	13.2	
두통	6.9	9.1	
부비동염	4.6	6.3	
근육통	2.7	5.4	
인두염	0.8	5.1	

(3) 흔한 이상반응 : 16 ~ 24주 병용요법 임상시험
설포닐우레아에 이 약을 병용 투여한 임상시험들에서 보고된 흔한 이상반응의 전체적인 발생률 및 종류는 표2와 같다. 아래에 요약된 반응은 5%를 초과하여 발생한 이상반응 및 시험된 최고 용량으로 이 약을 투여 받은 환자에서 더 흔하게 발생한 이상반응을 나타낸다.

표2 설포닐우레아에 이 약을 병용 투여한 16 ~ 24주 임상시험들			
	환자 비율(%)		
	16주 위약대조 임상시험 5%를 초과하여 발생한 이상반응 및 위약 + 설포닐우레아를 투여 받은 환자에 비해 이 약 30mg + 설포닐우레아를 투여 받은 환자에서 더 흔하게 발생한 이상반응	16주 위약대조 임상시험 5%를 초과하여 발생한 이상반응 및 위약 + 설포닐우레아를 투여 받은 환자에서 더 흔하게 발생한 이상반응	
	위약 + 설포닐우레아 (187명)	이 약 15mg + 설포닐우레아 (184명)	이 약 30mg + 설포닐우레아 (189명)
부종	2.1	1.6	12.7
두통	3.7	4.3	5.3
복부팽만	0.5	2.7	6.3
체중 증가	0	2.7	5.3

24주 비-대조, 이중 눈가림 임상시험 5%를 초과하여 발생한 이상반응 및 이 약 30mg + 설포닐우레아를 투여 받은 환자에 비해 이 약 45mg + 설포닐우레아를 투여 받은 환자에서 더 흔하게 발생한 이상반응			
	환자 비율(%)		
	이 약 30mg + 설포닐우레아(351명)	이 약 45mg + 설포닐우레아(351명)	
저혈당	13.4	15.7	
부종	10.5	23.1	
상기도 감염	12.3	14.8	
체중 증가	9.1	13.4	
요로 감염	5.7	6.8	

단, 말초부종, 전신부종, 오목부종 및 체액 저류에 대한 용어는 “부종”이라는 용어로 통합되었다.

(4) 메트포르민에 이 약을 병용 투여한 임상시험들에서 보고된 흔한 이상반응의 전체 발생률 및 종류는 표3과 같다. 아래에 요약된 반응은 5%를 초과하여 발생한 이상반응 및 시험된 최고 용량으로 이 약을 투여 받은 환자에서 더 흔하게 발생한 이상반응을 나타낸다.

표3 메트포르민에 이 약을 병용 투여한 16 ~ 24주 임상시험들			
	환자 비율(%)		
	16주 위약대조 임상시험 5%를 초과하여 발생한 이상반응 및 위약 + 메트포르민을 투여 받은 환자에 비해 이 약 + 메트포르민을 투여 받은 환자에서 더 흔하게 발생한 이상반응	환자 비율(%)	
	위약 + 메트포르민(160명)	이 약 30mg + 메트포르민(168명)	

부종	2.5	6.0
두통	1.9	6.0
상기도 감염	12.4	13.5
부종	5.8	13.9
두통	5.4	5.8
체중 증가	2.9	6.7

단, 말초부종, 전신부종, 오목부종 및 체액 저류에 대한 용어는 “부종”이라는 용어로 통합되었다.

(5) 인슐린에 이 약을 병용투여한 임상시험들에서 보고된 흔한 이상반응의 발생률 및 종류는 표4와 같다. 아래에 요약된 반응은 5%를 초과하여 발생한 이상반응 및 시험된 최고 용량으로 이 약을 투여 받은 환자에서 더 흔하게 발생한 이상반응을 나타낸다.

표4 인슐린에 이 약을 병용 투여한 16 ~ 24주 임상시험들			
	환자 비율(%)		
	위약 + 인슐린(187명)	이 약 15mg + 인슐린(191명)	이 약 30mg + 인슐린(188명)
저혈당	4.8	7.9	15.4
부종	7.0	12.6	17.6
상기도 감염	9.6	8.4	14.9
두통	3.2	3.1	6.9
체중 증가	0.5	5.2	6.4
요통	4.3	2.1	5.3
어지럼증	3.7	2.6	5.3
복부팽만	1.6	3.7	5.3
	24주 비-대조, 이중 눈가림 임상시험 5%를 초과하여 발생한 이상반응 및 이 약 30mg + 인슐린을 투여 받은 환자에 비해 이 약 45 mg + 인슐린을 투여 받은 환자에서 더 흔하게 발생한 이상반응	환자 비율(%)	
	이 약 30mg + 인슐린(345명)	이 약 45mg + 인슐린(345명)	
저혈당	43.5	47.8	
부종	22.0	26.1	
체중 증가	7.2	13.9	
요로 감염	4.9	8.7	
설사	5.5	5.8	
요통	3.8	6.4	
혈중 크레아티닌키나아제(CK) 상승	4.6	5.5	
부비동염	4.6	5.5	
고혈압	4.1	5.5	

단, 말초부종, 전신부종, 오목부종 및 체액 저류에 대한 용어는 “부종”이라는 용어로 통합되었다.

(6) PROActive 임상시험에서 보고된 흔한 이상 반응의 전체 발생률 및 종류는 표5와 같다. 아래 요약된 반응은, 5%를 초과하여 발생한 이상 반응 및 위약을 투여 받은 환자들에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서 더 흔하게 발생한 이상 반응을 나타낸다.

표 5: PROActive 임상시험: 이 약을 투여 받은 환자의 >5%에서 보고된 이상 반응 및 위약에 비해 더 흔하게 보고된 이상 반응의 발생률 및 종류			
	환자 비율(%)		
	위약(2633명)	이 약(2605명)	
저혈당	18.8	27.3	
부종	15.3	26.7	
심부전	6.1	8.1	
사지 통증	5.7	6.4	
요통	5.1	5.5	
홍통	5.0	5.1	

평균 환자 추적 기간은 34.5개월이었다.

(7) 올혈형심부전 : 16 ~ 24주 동안 설포닐우레아에 병용 투여한 임상시험, 16 ~ 24주 동안 인슐린과 병용 투여한 임상시험, 그리고 16 ~ 24주 동안 메트포르민에 병용 투여한 임상시험에 대한 올혈형심부전과 관련된 이상반응 발생률은 표6과 같다. 이들 이상반응 중 치명적인 것은 없었다.

표6 기타 이상 반응(올혈형심부전)					
설포닐우레아에 병용하여 이 약 또는 위약을 투여 받은 환자					
	환자수(%)				
	위약대조 임상시험 (16주)		비-대조, 이중 눈가림 임상시험 (24주)		
	위약 + 설포닐우레아 (187명)	이 약 15mg + 설포닐우레아(184명)	이 약 30mg + 설포닐우레아(189명)	이 약 30mg + 메트포르민 (351명)	이 약 45mg + 메트포르민 (351명)
최소 1건 이상의 올혈형심부전 사례	2(1.1%),	0	0	1(0.3%),	6(1.7%),
입원	2(1.1%),	0	0	0	2(0.6%),
인슐린에 병용하여 이 약 또는 위약을 투여 받은 환자					
	환자수(%)				
	위약대조 임상시험 (16주)		비-대조, 이중 눈가림 임상시험 (24주)		

	위약 + 인슐린 (187명)	이 약 15mg + 인슐린 (191명)	이 약 30mg + 인슐린 (184명)	이 약 30mg + 인슐린 (345명)	이 약 45mg + 인슐린 (345명)
최소 1건 이상의 올혈형 심부전 사례	0	2(1.0%),	2(1.1%),	3(0.9%),	5(1.4%),
입원	0	2(1.0%),	1(0.5%),	1(0.3%),	3(0.9%),
메트포르민에 병용하여 이 약 또는 위약을 투여 받은 환자					
	환자수(%)				
	위약대조 임상시험 (16주)		비-대조, 이중 눈가림 임상시험 (24주)		
	위약 + 메트포르민 (160명)	이 약 30mg + 메트포르민 (168명)	이 약 30mg + 메트포르민 (411명)	이 약 45mg + 메트포르민 (416명)	
최소 1건 이상의 올혈형심부전 사례	0	1(0.6%),	0	1(0.2%),	
입원	0	1(0.6%),	0	1(0.2%),	

(8) 제2형 당뇨병 및 NYHA 분류 2 또는 3(초기)의 올혈형심부전 환자들이 무작위 배정되어 24주 동안 이 약 1일 용량 30 ~ 45mg을 투여 받게나(n = 262) 글리부리드 1일 용량 10 ~ 15mg (n = 256) 이중 눈가림으로 투여 받았다. 이 임상시험에서 보고된 올혈형심부전 관련 이상반응의 발생률은 표7과 같다.

표 7 이 약 또는 글리부리드를 투여 받은 NYHA 분류 2 또는 3의 올혈심부전 환자에서의 기타 이상반응(올혈심부전)		
	피험자 수(%)	
	이 약 (262명)	글리부리드 (256명)
심혈관계 소인으로 인한 사망(판결됨)	5(1.9%)	6(2.3%)
올혈심부전 악화로 인한 1박 입원(판결됨)	26(9.9%)	12(4.7%)
올혈심부전으로 인한 응급실 방문(판결됨)	41(5.5%)	31(1.2%)
시험 기간 동안 올혈심부전 진행을 경험한 환자	35(13.4%)	21(8.2%)

표11 PROactive 임상시험에서 이중 눈가림 치료 기간 동안 이 약을 투여 받은 피험자 vs 위약을 투여 받은 피험자에서의 체중 관련 중요감량		
	위약	이 약
	중앙값 (25th/75th%)	중앙값 (25th/75th%)
최중 방문 시 기저치로부터의 체중 변화 (kg)	-0.5 (-3.3, 2.0) n = 2,581	+3.6 (0.0, 7.5) n = 2,560

단: 이 약 및 위약 모두에 대한 노출 기간 중앙값은 2.7년이었다.

(12) 부중: 이 약 복용으로 유발된 부중은 이 약을 중단할 경우 가역적이다. 올혈성부전을 함께 알고 있는 경우가 아닌 이상 부중으로 인한 입원은 필요하지 않다. 이 약에 대한 임상 연구에서 발생한 부중 관련 이상 반응의 빈도 및 중증은 표 12와 같다.

표 12 이 약을 투여 받은 피험자에서의 부중 관련 이상 반응	피험자 수(%)				
	위약	이 약 15mg	이 약 30mg	이 약 45mg	
단독요법 (16~26주)	3 (1.2%) n = 259	2(2.5%) n = 81	13 (4.7%) n = 275	11 (6.5%) n = 169	
	설폐닐우레아	4 (2.1%) n = 187	3(1.6%) n = 184	61 (11.3%) n = 540	81 (23.1%) n = 351
병용요법 (16~24주)					
	메트포르민	4 (2.5%) n = 160	N/A	34 (5.9%) n = 579	58 (13.9%) n = 416
	인슐린	13 (7.0%) n = 187	24(12.6%) n = 191	109(20.5%) n = 533	90 (26.1%) n = 345

단, 말초부중, 전신부중, 오목부중 및 체액 저류에 대한 용어는 “부중”이라는 용어로 통합되었다.

표13 PROactive 임상시험에서 피험자에서의 부중 관련 이상반응		
피험자 수(%)		
위약 2,633명	이 약 2,605명	
419(15.9%)	712(27.3%)	

단, 말초부중, 전신부중, 오목부중 및 체액 저류에 대한 용어는 “부중”이라는 용어로 통합되었다.

(13) 간에 대한 작용: 현재까지의 이 약에 대한 대조 임상시험 자료에서 이 약에 의한 간독성 에 대한 근거는 없었다. 임상시험의 첫 48주 동안은 9주마다, 이후에는 12주마다 혈청 ALT 수치를 측정하였는데, 혈청 ALT 수치가 정상범위 상한치의 3배를 초과하여 상승한 경우에 대한 발생률을 평가하기 위해 이 약을 메트포르민 및 인슐린 요법에 병용 투여한 것을 클리브라드와 비교한 한 건의 무작위 배정, 이중 눈가림, 3년 임상시험이 특별히 설계되었다. 이 약을 투여 받은 피험자 1,051명 중 중 3명(3.3%), 클리브라드를 투여 받은 피험자 1,046명 중 9명(0.9%)이 정상범위 상한치의 3배를 초과한 ALT 수치를 나타냈다. 전례까지 이 약 대조 임상시험 자료에서 이 약을 투여 받은 피험자 중 정상범위 상한치의 3배를 초과한 혈청 ALT 수치 및 이에 상응하는 정상범위 상한치의 2배를 초과하는 총 빌리루빈 수치를 보인(이 둘의 조합은 중증 약물 유발 간 손상 가능성을 입함) 피험자는 없었다.

(14) 저혈당: 이 약 임상시험에서 저혈당 이상 반응은 시혈당의 임상적 판단에 근거하여 보고되었으며, 소가림 지니혈당검사 (fingerstick glucose test) 확인은 연구되지 않았다. 설폐닐우레아에 병용 투여한 16주 임상시험에서 보고된 저혈당 발생률은 이 약 30mg의 경우 3.7%, 위약의 경우 0.5%였다. 인슐린에 병용 투여한 16주 임상시험에서 보고된 저혈당 발생률은 이 약 15mg의 경우 7.9%, 이 약 30mg의 경우 15.4%, 위약의 경우 4.8%였다. 설폐닐우레아에 병용 투여한 24주 임상시험(15.7% vs. 13.4%) 및 인슐린에 병용 투여한 24주 임상시험(47.8% vs. 43.5%) 모두에서 보고된 저혈당 발생률은 이 약 30mg에 비해 이 약 45mg(2%) 더 높았다.

이들 42건의 임상시험에서 3명의 피험자가 저혈당으로 인해 입원하였다. 3명의 피험자는 모두 인슐린에 병용 투여한 24주 임상시험에서 이 약 30mg(0.9%)을 투여 받고 있었다. 추가로 14명의 피험자들이 입원이 필요하지 않은 중증 저혈당(피험자의 평소시 혈당이 상당한 장기로 유입하는 것으로 정의됨)을 보고하였다. 이들 피험자들은 설폐닐우레아와 병용하여 이 약 45mg(2%) 또는 인슐린과 병용하여 이 약 30mg 또는 45mg(12명)을 투여 받고 있었다.

(15) 방광암: 2년간의 발암성 시험을 실시한 결과 수컷 랫트에서 방광 종양이 관찰되었다. 위 약 또는 클리브라드를 대조약으로 한 이 약의 3년간의 임상시험 2년에서, 이 약을 복용하지 않은 환자 3,679명 중 5명(0.14%)에서 방광암이 보고되었다. 이 약을 복용한 환자 3,656명 중 16명(0.44%)에서 방광암이 보고되었다. 방광암 진단 당시 시혈당이 없는 경우와 기간이 1년 미만인 환자를 제외한 결과, 이 약의 경우 62인(0.16%), 위약의 경우 22인(0.05%)으로 나타났다. 방광암 발생 사례가 극히 적어서 그 인과관계는 확인할 수 없었다.

(16) 임상경색치에의 영향

- 혈액학: 이 약은 헤모글로빈과 헤마토크리트의 감소를 일으킬 수 있다. 위약대조 단독요법 임상시험에서 위약을 투여 받은 환자의 경우 평균 헤모글로빈 수치 변화가 -1% ~ +1%인 것에 비하여, 이 약을 투여 받은 환자들에서 방광 동맥질환 환자 2% ~ 4%를 감소하였다. 이러한 변화는 치료 시작 후 첫 4 ~ 12주 이내에 주로 발현되었으며 이후에 상대적으로 일정하게 유지되었다. 이러한 변화는 이 약 투여와 관련된 혈당증상 증가와 연관성이 있을 수 있으며, 임상적으로 유의한 혈액학적 영향과 관련성이 있을 것 같지는 않다.
- 크레아티닌지니제(Cr) 수치: 임상시험에서 혈청 크레아티닌지니제(Cr)를 임상시험 계획서에 명시된 바에 따라 측정하는 동안 정상범위 상한치의 10배를 초과하는 Cr 단독 상승이 이 약을 투여 받은 피험자 9명(0.2%)에서 수치 2.150 ~ 11.400 IU/L 관찰되었고, 대조약을 투여 받은 피험자에서는 관찰되지 않았다. 이들 환자 중 5명은 이 약 투여를 계속하였고, 2명은 투여 마다만 낮게 Cr 상승이 발견되었으며, 한명의 환자는 이 값의 상승으로 인하여 시혈당만을 중단하였다. 이러한 증가는 노예 때의 임상적 유우증 없이 해결되었다. 이러한 반응과 이 약 요법의 연관성은 알려지지 않았다.

2) 시판 후 경험

이 약의 시판 후 사용 기간 동안 다음 이상반응들이 확인되었다. 이들 이상반응들은 불명확한 크기의 집단으로부터 자발적으로 보고된 것이기 때문에 해당 이상반응의 발생률을 신뢰성 있게 추정하거나 약물 노출과의 인과 관계를 확립하는 것은 일반적으로 가능하지 않다.

- 식욕 감소를 동반한 당뇨병성 황반부종의 발병 또는 악화
 - 치명적 및 비-치명적인 간부전
- 이 약을 투여 받은, 이전에 심장 질환의 병력이 있거나 투여 후에도 모두 및 인슐린을 병용 투여하거나 하지 않은 환자 모두에서 올혈성부전을 동반한 부종 환자가 보고되었다. 시판 후 경험에서 임상시험에서 일반적으로 관찰된 증상을 초과하여 비정상적으로 빠른 체중 증가에 대한 보고가 있었다. 이러한 체중 증가를 경험한 환자들은 과다한 부종 및 올혈성부전과 같은 체액 축적 및 용적 관련 사례에 대하여 평가되어야 한다.

3) 국내 시판 후 조사

(1) 국내에서 제1상사를 위하여 13,454명을 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 2.80%(377/13,454명, 4452건로 보고되었고, 이 중 심혈관계 유해사례는 1.37%(184/13,454명)였다. 이 약과 인슐린의 병용조합을 배제할 수 있는 약물유해사례는 1.58%(212명/13,454명, 236건로 조사되었으며, 부중 0.54%(73명/13,454명, 742건), 체중증가 0.46%(62명/13,454명, 622건), 저혈당증 0.13%(17명/13,454명, 17건), 어지럼 0.07%(9명/13,454명, 9명), 상기도감염 0.03%(4명/13,454명, 4건), 혈당증가 0.04%(6명/13,454명, 6건), ALT/AST 상승 0.03%(4명/13,454명), 식욕부진 0.03%, 위약 복용, 두통 0.02%(3명/13,454명, 3건), 가슴통증, 피로, 식욕, 소화불량, 구역, 호흡곤란, 가려움, 0.01%(2명/13,454명, 2건), 가슴불쾌, 떨림, 오한, 위장지질한, 복통, 명치불편, 저리간, 떨림, 근육경직, 머리불편, 간효소 증가, 간질환 악화, 두드러기, 습진, 관절통, 무릎이상, 팔뚝염있음증, 단맥노, 혈중크레아티닌 증가, 발진, 불면증, 졸림, 단순헤르페스, 각막이상, 고혈압, 심장기능상실, 기립저혈압, 무주거, 뇌졸중, 상기능이상, 심근경색증, 각 1건으로 나타났다. 이 중 중대한 약물유해사례는 부중, 간질환악화, 무릎이상, 뇌졸중등이 각 0.01%(1명/13,454명, 1건)이었다. 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 약물유해사례는 0.41%(55명/13,454명, 63건)으로 지니혈OG.07%(9명/13,454명, 9건), 식욕부진, 위약, 비위, 복통이 0.0%(3명/13,454명, 3건), 가슴통증, 피로, 식욕, 소화불량, 구역, 기침, 가려움, 떨림 0.01%(2명/13,454명, 2건), 가슴불쾌, 위장자 질환, 명치불편, 복부팽만, 저리간, 오한,

근육경직, 머리불편, 간질환악화, 두드러기, 습진, 관절통, 무릎이상, 팔 힘없음증, 단맥노, 혈중 크레아티닌 증가, 불면, 불면증, 졸림, 단순헤르페스, 시각이상, 고혈압, 기립저혈압, 무주거, 기립, 뇌졸중, 상기능이상, 심근경색증, 복통, 심장기능상실이 각 1건 보고되었다(자심사결과 반영).

(2) 티아졸리디딘온계 약물의 심혈관계 위험과 관련한 분석 결과, 전체 환자 13,454명 중 심혈관계 동반질환(뇌혈관 장애 포함)이 있는 환자는 3,224명(23.96%)이었으며, 심혈관계 동반질환이 없는 환자는 10,230명(76.04%)이었다. 심혈관계 유해사례, 부종의 발현율이 심혈관계 동반질환이 있는 환자에서 통계학적으로 유의하게 높게 나타났다(대 14 참조).

표14 심혈관계 동반질환 유무에 따른 심혈관계 유해사례 및 심혈관계 이외의 유해사례		
	심혈관계 동반질환이 있는 환자 (3,224명)	심혈관계 동반질환이 없는 환자 (10,230명)
심혈관계 유해사례	2.48%(80명)	1.02%(104명)
부중	1.15%(37명)	0.44%(45명)
심혈관계 이외의 유해사례	2.67%(86명)	1.22%(125명)
어지럼	0.25%(8명)	0.08%(8명)

(3) 신장에 환자에서의 발현율(19.39%, 19/98명)은 신장애가 없는 환자에서의 발현율(2.68%, 358/13,356명)보다 통계적으로 유의하게 높았다 (p < 0.0001, odds ratio = 4.787).

(4) 간장애 환자에서의 발현율(8.33%, 23/276명)은 간장애가 없는 환자에서의 발현율(2.69%, 354/13,178명)보다 통계적으로 유의하게 높았다(p < 0.0001, odds ratio = 1.719).

5. 일반적 주의

1) 이 약은 인슐린의 존재 하에서만 혈당하향 효과를 나타낸다. 그러므로 이 약은 제1형 당뇨병 환자나 당뇨병성 케톤산증의 치료 목적으로 사용되어 안 된다. 또한, 인슐린 저항성이 추정되는 환자에 한하여 투여한다. 인슐린 저항성 기준은 신장염상수(BMI) 24이상이거나 인슐린 분비 상태가 급속히 열중 인슐린 값으로 5μ U/mL이상이다.

2) 방광암: 2년간의 발암성 시험을 실시한 결과 수컷 랫트에서 방광 종양이 관찰되었다. 위약 또는 클리브라드를 대조약으로 한 이 약의 3년간의 임상시험 2년에서, 이 약을 복용하지 않은 환자 3,679명 중 5명(0.14%)에서 방광암이 보고되었다. 이 약을 복용한 환자 3,656명 중 16명(0.44%)에서 방광암이 보고되었다. 방광암 진단 당시 시혈당이 없는 경우와 기간이 1년 미만인 환자를 제외한 결과, 이 약의 경우 62인(0.16%), 위약의 경우 22인(0.05%)으로 나타났다. 현재 진행 중인 10년간의 관찰 코호트 시험에 대한 5년 중간 보고서에서, 이 약에 노출 되지 않은 피험자들에 비해 이 약에 노출된 피험자들에 대한 방광암 위험 증가는 유의하지 않은 것으로 관찰되었다(-HR 1.21(95% CI 0.9 ~ 1.5)). 이 약에 노출되지 않은 경우와 비교하여, 12개월 이상의 이 약 치료에 대한 노출은 위험 증가(-HR 1.4 [95% CI 0.9 ~ 2.1])와 관련이 있었고, 이 약을 24개월 이상 사용한 경우 통계학적 유의성에 도달하였다(1.4(95% CI 1.03 ~ 2.0)). 이 시험에 대한 중간 결과는 이 약을 12개월 이상 복용하는 것은 방광암 발생에 대한 상대적 위험을 40% 증가시킴을 나타냈으며, 이는 10,000명 중 3명이라는 절대적 증가율과 동일하다(10,000명당 약 7건)이 약을 복용하지 않은 경우에서 약 10,000명당 약 10건이 약을 복용한 경우(으로 증가). 피오글리타존이 방광암에 대한 중앙 촉진자인지인지 아닌지를 결정하기에는 자료가 부족하다. 따라서 이 약을 활동성 방광암 환자에게 사용해서는 안 되며 이 약을 방광암 환자 및 방광암의 병력이 있는 환자에게 사용해서는 안 된다.

3) 저혈당증: 인슐린 또는 다른 항 당뇨병 약물(특히 설폐닐우레아와 같은 인슐린 분비 촉진제)과 이 약을 병용 투여 받은 환자들은 저혈당증 위험을 일으킬 수 있으므로, 저혈당 위험을 줄이기 위해 병용 투여되는 항당뇨병 약물의 용량 감소가 필요할 수 있다.

4) 심혈관계: 뉴욕심장학회 분류 3, 4 심장상태인 환자들을 배제한 미국의 위약대조 임상시험에서, 이 약을 단독요법으로 치료받은 환자나 설폐닐우레아 또는 메트포르민과 병용한 환자를 대 위약-투여 환자들에서, 용적확장(volume expansion)과 연관된 중대한 심장 이상반응의 발생률이 증가하지 않았다. 인슐린 병용 연구에서, 이 약을 인슐린과 병용 투여하였을 때, 심장 질환 병력을 지닌 환자들 중 3수가 올혈성 심부전으로 진단되었(검고한 참조). 이 약은 임상시험에서 뉴욕심장 학회 분류 3, 4 심장상태인 환자들보다 연두되지 않았으며 치료 증상증으로 하지 않는다. 이 약의 시판후 조사에서, 예전에 심장 질환이 있었다고 알려진 환자 및 알려지지 않은 환자 모두에서 올혈성부전의 증거가 보고되었다.

5) 부중: 대조 임상시험에서, 위약을 투여 받은 환자에 비해 이 약을 투여 받은 환자에서, 부종이 더 빈번하게 보고되었으며, 용량과 관련이 있었다. 시판후 경험에서, 부종의 새로운 발병이나 악화가 보고되었다. 부종이 있는 환자들의 경우 이 약을 주의하여 사용하여야 한다(이상반응항 참조). 이 약을 포함한 티아졸리디딘온계 약물은 체액 저류를 유발할 수 있으며, 이는 올혈성부전을 유발하거나 악화시킬 수 있으므로, 올혈성부전에 대한 위험이 있는 환자에서는 이 약을 주의하여 투여 하여야 한다. 이 약을 투여 받은 환자들은 올혈성부전의 증상 및 징후에 대해 모니터링 되어야 한다.

6) 배란: 다른 티아졸리디딘온계 약물(thiazolidinediones)과 마찬가지로, 이 약을 투여하는 몇몇 폐경전 무배란증 여성들에서 배란을 일으킬 수 있다. 그 결과 이러한 환자들에서 이 약을 복용하는 동안 임신의 위험이 증가될 수 있다. 그러므로 폐경전 여성들에게 적절한 피임법이 권장되어야 한다. 임상시험에서 이러한 가능성 있는 작이 연구되지 않았기 때문에, 이에 대한 발생 빈도가 알려지지 있지 않다.

7) 간에 대한 작용: 이 약을 복용하는 환자들에서 치명적 및 비치명적 간부전에 대한 시판 후 보고 가 있었으나, 이러한 보고들은 인과관계 확립에 필요한 충분한 정보를 포함하고 있지 않았다. 이 약에 대한 현재까지의 대조 임상시험 자료에서는 약물로 유발된 간독성에 대한 근거는 없다. 제2형 당뇨병 환자들은 지방간이나 무알성 올혈성부전을 동반한 심장 질환을 가지고 있을 수 있는데, 두 질환 모두 간 검사시약을 유발할 수 있고 또한 간 질환의 다른 형태를 보일 수 있으며, 이 중 많은 형태는 치료되지만 관리될 수 있다. 따라서 이 약으로의 치료 시작 전에 간 검사 수치 (혈청 ALT, AST, ALP 및 총 빌리루빈)를 구하여 환자를 평가하는 것이 권장된다. 간 검사 이상이 있는 환자의 경우 이 약 치료 시작 시 주의하여야 한다. 피로, 식욕감퇴, 우측 상복부 불편감, 복색노 또는 황달을 포함하는 간손상을 나타낼 수 있는 증상을 보고하는 환자들에서는 신속히 간 검사를 수행한다. 이러한 임상적 상황에서 환자가 간 검사 수치 이상(정상범위 상한치의 3배 이상인 수치)을 나타내는 경우, 이 약 치료를 중단하고 가능한 원인을 알아내기 위한 조사가 이루어져야 한다. 간 검사 이상에 대한 다른 원인이 없는 경우 이러한 환자들에서 이 약 투여를 재개해서는 안 된다.

다른 병인이 없고, 혈청 ALT 수치가 정상범위 상한치의 3배 이상이고, 혈청 총 빌리루빈 수치가 정상범위 상한치의 2배 이상인 환자는 중증 약물-유발 간 손상의 위험이 있으므로 이 약 투여를 재개해서는 안 된다. 혈청 ALT 또는 빌리루빈 수치 1을 상승되어 있고 다른 사유가 없는 환자의 경우 주의하여 이 약으로의 치료를 사용해야 한다.

(8) 항부방증: 이 약의 시판 후 조사에서 항부 부종이 피오글리타존 또는 다른 티아졸리디딘온계 약물을 투여 받고 있는 당뇨병 환자들에서 보고되었다. 일부 환자들은 시야 동통 또는 시력 감소 등을 나타냈으며, 다른 환자들은 정기적인 안과 검사에 진단을 받았다. 대부분의 환자들은 황반 부종이 진단되었을 당시에 말초 부종을 나타냈다. 일부 환자들은 티아졸리디딘온계 약물 중단 후 황반 부종 증상이 개선되었다. 당뇨병 환자들은 현재의 표준 치료법에 따라 안과인의 의에 의한 정기적인 안 검사를 받아야 한다. 어떤 종류의 시력 증상을 보고한 당뇨병 환자들은 환자의 병력 약을 또는 다른 신체적 조건과 상관없이 신속하게 안과인에게 진료를 받아야 한다(이상반응항 참조).

9) 골절: PROactive시험에서, 제2형 당뇨병 및 대혈관 질환의 병력이 있는 5,238명의 환자가 표준 치료에 부가적으로 이 약(n = 2,605), 이 약 용량을 1일 45mg까지 강제 적정 또는 위약 (n = 2,633)으로 무작위 배정되었다. 34.5개월의 평균 추적 기간 동안, 여성에서의 골절 발생률은 위약의 경우 2.5%(23/905)였는데 비해, 이 약의 경우 5.5%(44/780)였다. 이러한 차이는 치료 첫 해 후에 관찰되었으며, 시한 기간 동안 지속되었다. 여성 환자에서 관찰된 골절의 대부분은 하지와 원위 상지(distal upper limb)를 포함한 비특정 골절이었다. 이 약(1.7%)로 치료 받은 남성에서는 위약(2%)보다 낮은 골절 발생률 증가가 관찰되지 않았다. 이 약으로 치료 시, 특히 여성 환자의 경우, 골절 위험을 고려하여야 하며, 현재의 표준 치료법에 따라 뼈 건강 상태를 평가하고 유지하는 데 주의를 기울여야 한다.

10) 대혈관 합병증: 이 약 또는 다른 당뇨병증제에 의해 대혈관 합병증의 위험이 감소하는데 이에 대한 임상시험은 이루어지지 않았다.

11) 실험실 검사: 혈당 조절과 이 약에 대한 치료 반응을 모니터링하기 위하여 정기적으로 공복식 혈당(FPG) 및 당화혈색소(HbA1C)측정이 수행되어야 한다. 모든 환자에게 이 약 요법을 시작하기 전에 간 효소 모니터링이 권장되며, 그 후에는 의사의 임상적 판단에 따라 정기적인 모니터링이 권장된다(이상반응 및 일반적 주의 중)에 대한 작용 참조).

2) 신장애 환자: 중등도 (크레아티닌창소율 30 ~ 60 mL/min) ~ 중증(크레아티닌창소율 < 30 mL/분)의 신장애 환자에서 정상 피험자와 비교하여도, 메, 피오글리타존, M-III, M-IV의 혈청 반감기가 변하지 않는다. 신 기능부전환자에서 투여량의 조정이 권장되지 않는다(대용법 · 용량 참조).

13) 환자를 위한 정보

환자들에게 식이요법 교육대로 준수할 것과 정기적으로 혈당 검사 및 당화헤모글로빈(HbA1C)도 당화헤모글로빈 검사를 받을 것을 교육하여 그 것이 중요하다. 열, 외상, 감염, 혹은 외과수술 같은 스트레스를 받는 기간 동안, 의학적 필요조건이 변할 수 있으므로, 환자에게 신속히 의사의 진찰을 받도록 설득시켜야 한다.

이 약 투여 기간 동안 보통과는 다른 신속한 체중의 증가나 부종을 경험한 환자, 또는 숨가쁨이나 심부전의 다른 증상들로 전개된 환자들은, 이러한 증상들을 즉시 자신들의 의사와에게 보고하여 야 한다.

치료 시작 전 및 정기적으로 이후에 의사의 임상적 판단에 따라서 간기능 혈액검사를 실시할 것임을 환자에게 알려주어야 한다. 미유가 발견되지 않은 구역, 복통, 복통, 식욕부진, 어두운 소변에 대하여 즉시 의사의 진찰을 받도록 환자에게 충고하여야 한다. 환자에게 이 약을 1일 1회 복용하고라고 알려주어야 한다. 이 약은 식사와 함께 혹은 식사를 하지 않고 복용할 수 있다. 만약 하루에 1회 복용량을 걸었을 경우에는 다음 날 배를 복용하면 안 된다.

인슐린이나 경구 혈당강화제와 병용 투여할 경우, 저혈당증의 위험, 그 증상과 처치법, 그 증상으로 전개하는 증상 조건 등을 환자와 그 가족 구성원들에게 설명하여야 한다. 다른 티아졸리디딘온계 약물(thiazolidinedones)과 마찬가지로, 이 약의 요법이 몇몇 폐경전 무배란성 여성에게 배란을 일으킬 수 있다. 그 결과, 이러한 환자들에서 이 약을 복용하는 동안 임신의 위험이 증가될 수 있다. 그러므로 폐경전 여성들에게 적절한 피임법이 권장되어야 한다. 이러한 가능한 작용이 임상시험에서 연구되지 않았기 때문에, 이에 대한 발생 빈도가 알려지지 않았다. 치료 중 육안적 혈뇨 또는 배뇨증상이나 질내노출과 같은 기타 증상의 징후가 발견되거나 증가되는 경우, 이러한 증상들은 방광암에 기인한 것일 수 있으므로, 의사와에게 즉시 알리도록 환자에게 지시해야 한다.

6. 상호작용

1) 강력한 CYP2C8 저해제

CYP2C8 저해제에, 겐피로비질)는 피오글리타존의 노출(혈청 농도-시간 곡선하 면적, 또는 AUC) 및 반감기를 유의하게 증가시킨다. 겐피로비질이나 다른 강력한 CYP2C8 저해제와 병용할 경우 이 약의 용량감소가 필요할 수 있다.

2) CYP2C8 유도제

CYP2C8 유도제(예, 리람페)는 피오글리타존의 노출(AUC)를 유의하게 감소시킨다. 따라서 이 약으로의 치료 중에 CYP2C8 유도제 투여를 시작하거나 중단할 경우 임상 반응에 근거하여 당뇨병 치료법을 변경할 필요가 있을 수 있다.

3) 약물-약물 상호작용

표1 다른 약물의 전신 노출에 대한 피오글리타존 병용 투여의 영향					
피오글리타존 투여 용량(mg)*		병용 투여된 약물			
		약물명 및 투여 용량	AUC변화†		Cmax변화†
와파린					
45mg (n = 12)	매일 투여 후 PT 및 INR 수치에 근거하여 유지 용량 투여 Quick's 수치 = 35 ± 5%	R-와르 파린	↓ 3%	R-와파 린	↓ 2%
		S-와르 파린	↓ 1%	S-와르 파린	↓ 1%
디곡신					
45mg (n = 12)	1일 2회 0.200mg 투여 후 (초기 용량) 1일 0.250mg 투여(유지 용량, 7일)		↑ 15%		↑ 17%
경구용 피임약					
21일 동안 1일 45mg 투여 (n = 35)	21일 동안 [에티닐 에스트라 디올(EE) 0.035mg + + 노르 에티드(NE) 1mg] 투여	EE	↓ 11%	EE	↓ 13%
		NE	↑ 3%	NE	↓ 7%
페소페나딘					
45mg (n = 23)	7일 동안 1일 2회 60mg 투여		↑ 30%		↑ 37%
클리피지드					
45mg (n = 14)	7일 동안 1일 1회5mg 투여		↓ 3%		↓ 8%
8일 동안 1일 1회 45 mg 투여 (n = 16)					
	8일째에 1,000mg 단회 투여		↓ 3%		↓ 5%
미다졸람					
45mg (n = 21)	15일째에 7.5mg 단회 투여		↓ 26%		↓ 26%
라니티딘					
45mg (n = 24)	7일 동안 1일 2회 150mg 투여		↑ 1%		↓ 1%
니페디핀 서방형					
4일 동안 1일 1회 45mg 투여 (n = 24)	4일 동안 1일 1회 30mg 투여		↓ 13%		↓ 17%
아토르바스타틴 칼슘					
45mg (n = 25)	7일 동안 1일 1회 80mg 투여		↓ 14%		↓ 23%
테오필린					
45mg (n = 22)	7일 동안 1일 2회 400mg 투여		↑ 2%		↑ 5%

* 따로 언급이 없는 한, 7일 동안 매일 투여

†% 변화(병용 약물 유무에 관계없이 변화가 없는 경우 = 0%); ↓ 및 ↑ 표시는 각각 증가 및 감소를 나타냄

‡피오글리타존은 프로트롬빈 시간에 대해 아무런 임상적으로 유의한 영향을 미치지 않았다.

표2 피오글리타존의 전신 노출에 대한 병용 약물의 영향		피오글리타존		
병용 투여된 약물	투여 용법(mg)*	AUC 변화†	Cmax 변화†	
겐피로비질 600mg 1일 2회, 2일간 투여(n = 605)	30mg 단회 투여	↑ 3.4배#	↑	↑ 6%
케토코놀 200mg 1일 2회, 7일간 투여(n = 28)	45mg	↑ 34%	↑	↑ 14%
리람핀 600mg 1일 1회, 5일간 투여(N=10)	30mg 단회 투여	↓ 54%	↓	↓ 5%
팩소페나딘 60mg 1일 2회, 7일간 투여(n = 23)	45mg	↓ 1%	0%	
라니티딘 150mg 1일 2회, 4일간 투여(n = 23)	45mg	↓ 13%	↓	↓ 16%
니페디핀 서방형 30mg 1일 1회, 7일간 투여(n = 23)	45mg	↓ 5%	↑	↑ 4%

아토르바스타틴 칼소 80mg 1일 1회, 7일간 투여 (n = 24)	45mg	↓ 24%	↓ 31%
테오필린 400mg 1일 2회, 7일간 투여(n = 22)	45mg	↓ 4%	↓ 2%

* 따로 언급이 없는 한, 7일 동안 일일 투여

†#겐피비질과 약물 유무에 관계없이 변화가 없는 경우 = 1배); % 변화(병용 약물 유무에 관계 없이 변화가 없는 경우 = 0%); ↓ 및 ↑ 표시는 각각 증가 및 감소를 나타냄

‡피오글리타존의 반감기는 겐피로비질 존재 시 6.5시간에서 15.1시간으로 증가되었다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 피오글리타존은 기관형성기 동안 랫트에서 80mg/kg까지 경구 투여량에서 또는 토끼에 160mg/kg까지 투여했을 때 기형발생이 없었다(mg/m2를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 각각 약 1배 및 4배). 분만 이전 및 배지독성(착상 후 손실 증가; 발생 지연, 태자 체중 감소)이 경구 투여량 40mg/kg/day(mg/m2를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 10배)의 환자를 투여한 랫트에서 관찰되었다. 랫트의 산자에서 기능적인 또는 행동적인 독성이 발견되지 않았다. 토끼에서 160mg/kg(mg/m2를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 40배)의 경구 투여량에서 배지독성이 관찰되었다. 10mg/kg(mg/m2를 근거로 한 인체 최대관장 경구용량의 약 2배) 이상의 경구 투여량에서 모든 자손의 경우, 체중 감소에 의한 출생 후 발육의 지연이 임신 후기와 수유기 동안 관찰되었다.

임산 여성에 대한 적절한과 잘 대조된 임상시험은 없다. 동물시험에서 최대 사람 권장 용량의 10배~40배 용량에서 착상 후 손실을 증가, 발생 지연, 태자 체중 감소 및 분만 지연이 나타났다. 잠재적 유익성이 태자에 대한 잠재적 위험을 정당화하는 경우에만 임신 중에 이 약을 사용하여 야 한다.

임산 중 비정상적인 혈당치는 신생아 유병률 및 사망률의 증가뿐만 아니라, 선천성 기형의 높은 발생빈도와 관련이 있다. 임신중요 혈당치를 가능한 한 정성에 가깝게 유지하기 위하여 인슐린 을 사용할 것을 권장한다.

2) 이 약이 인체의 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않다. 피오글리타존은 수유 중인 랫트의 유즙으로 분비된다.