

위 · 장관 소화기능 개선제
그랑파제에프 정
Grandpaze-F

분류번호: 239 (기타의 소화기관용약)

▶ 원료약품 및 분량 : 1정 중

말레인산트리메부틴(KPC)	100mg
데히드로콜산(KP)	25mg
판크레아틴(별규)	150mg
시메치콘(USP)	300mg
브로멜라인(별규)	50mg

식약청인정타르색소 (청색1호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크)

- ▶ 성 상 : 연녹색의 장방형 필름코팅정
- ▶ 효능 · 효과 :
- 위 · 십이지장성 소화불량, 담즙과 혈액의 분비기능 이상, 위절제 및 담낭절제 후의 소화불량, 과민성대장 증후군, 이완성 · 과연동성변비, 소화관 운동 저하에 의한 위장관 전이 항진성 설사
- ▶ 용법 · 용량 :
- 성인 1회 2정, 1일 3회 식전 30분에 복용한다.

▶ 사용상의 주의사항 :

1. 이상반응
 - 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 정신신경계 : 드물게 파로감, 열작감, 한기, 졸음, 현기, 권태감, 두통 및 약간의 최면상태가 나타날 수 있다.
 - 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
 - 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.
4. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

- ▶ 저장방법: 기밀용기, 실온(1 ~ 30℃)보관
- ▶ 포장단위: 자사포장단위
- ▶ 사용기한: 외부포장 참조

■ 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자피해보상규정에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다. 유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 약품은 교환하여 드리오니 담당사원을 통하여 폐사로 송부하여 주시기 바랍니다.

안국약품(주) • 소비자 상담실 TEL.(02)3289-4253 ~ 9 • 수신자부담 080-001-4125

※ 이 첨부문서 작성일자(2010년 7월 12일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ahn-gook.com)에서 확인할 수 있습니다. **AG100712**



• 본사: 서울특별시 영등포구 대림동 993-75 • 공장: 경기도 화성시 향남읍 상신리 903-2