

알셉트 정(도네페질염산염)

[성분·함량] 1정 중

도네페질염산염(법규) 10mg

첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크,

청색2호 알루미늄레이크

[성상] 노랑색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

알츠하이머 형태의 경도도, 중도도 내지 중증 치매증상의 치료 및 혈관성 치매(뇌혈관질환을 동반한 치매) 증상의 개선

[용법·용량]

- 성인 및 노인 : 이 약을 1일 1회, 1회 5mg씩 취침전 투여한다. 도네페질염산염의 농도가 투여 15일 후 정상상태에 도달하고 이상반응의 빈도가 증량 속도에 의해 영향을 받을 수 있으므로, 4 내지 6주간은 5mg 용량을 투여하도록 한다. 이 기간 동안의 임상적 반응을 평가한 후 10mg까지 증량할 수 있다. 이 약의 최대 투여량은 10mg이며 10mg 이상의 임상데이터는 없다. 이 약 투여를 중단시 서서히 효과가 감소하며 갑작스러운 투여중단에 의한 반동효과는 나타나지 않는다.
- 소아에의 투여 : 소아에의 사용경험은 없다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 도네페질염산염, 피페리딘 유도체 또는 이 약 구성성분에 과민증인 환자.

2) 임신부 및 수유부

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

다른 형태의 치매 또는 다른 형태의 기억력 장애(예 : 나이와 연관된 인지기능 저하)에 대한 이 약의 사용은 연구되지 않았다.

1) 마취사 : 골린에스테라제 제해제인 이 약은 마취중 석시발굴린형 근이완제의 작용을 극대화시키는 경향이 있다.

2) 심혈관계 : 이 약은 골린에스테라제 제해 작용으로 미주신경 긴장 효과를 가져와 서맥을 일으키고 심장차단(동방결절차단 또는 방실차단), QT구간의 연장과 같은 증상을 유발할 수 있다. 특히, 심장질환(예, 심근경색, 심장근육병증, 심장판막질환, 동부전증후군 또는 심실상부전전도 증상, 심방내 전도장애, 심방심실 접합부 전도장애)과 전해질 이상(예, 저칼륨혈증)을 가진 환자는 심각한 부정맥으로 진행될 수 있어 이 약의 사용시 특별히 주의해야 한다. 심혈관계 질환을 가진 환자들에게서 이 약의 사용으로 심신과 발작이 보고된 바 있다.

3) 소화기계 : 골린에스테라제 제해작용으로 위산을 증가시키거나 소화기관의 운동성을 증가시킬 수 있어 소화성궤양의 병력이 있거나 비스테로이드성 진통소염제를 투약받고 있는 환자는 그 증상에 대한 모니터링이 필요하다. 이 약의 임상연구에서 위약에 비해 위궤양 또는 위장관 출혈 증가는 없는 것으로 나타났다.

4) 비노생식기계 : 이 약의 임상시험에서는 나타나지 않았지만, 골린유사작용으로 인해 방광의 배뇨를 방해할 수 있다.

5) 정신신경계 : 골린유사작용으로 선택제에 골린성 신경의 운동을 자극함으로써 추체외로 장애증상(파킨슨병이나 파킨슨 신드롬과 같은 질환)을 유발 또는 악화시키거나 발작을 일으킬 가능성이 있지만 이러한 발작은 알츠하이머병으로 인한 것 일수도 있다.

6) 호흡기계 : 골린유사작용으로 기관지 평활근 수축을 증가시키거나 기관지 분비기능을 증가시킬 수 있으므로 천식 또는 기관지 질환이나 폐쇄성 폐질환의 병력을 가지고 있는 환자에게는 주의하여 처방한다.

7) 중증 간기능 장애 : 중증 간기능 장애 환자에 대한 데이터는 없다.

3. 이상반응

알츠하이머 형태의 경도도, 중도도 치매증상의 치료

1) 다음은 임상시험에서 보고된, 이 약과 인과관계가 있다고 판단되는 빈도불명의 중요한 이상반응이다. 다음과 같은 증상이 나타날 때는 투약을 중지하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

- 1 심신, 서맥, 심장차단, QT 구간의 연장, 심근경색, 심부전
- 2 소화성 궤양, 천공성 십이지장 궤양, 위장관 출혈
- 3 간염, 간기능 이상, 황달
- 4 대뇌발작, 대뇌출혈, 뇌혈관 장애
- 5 운동기능장애, 운동실조, 운동장애, 근간성이상, 진전, 불수의운동, 보행장애, 비정상 자세, 언어장애와 같은 추체외로 장애
- 6 심장 중추근 : 무동성 무연증, 극도의 근경직, 연하곤란, 빈맥, 혈압변동, 발한과 같은 증상이 나타날 수 있으며, 이와 같은 증상은 주로 고열과 동반된다. 이 경우 약물의 중단과 함께 열을 내리는 전신요법과 수액, 전해질 공급과 같은 집중적인 치료를 행하여야 한다. WBC와 혈청 CK(CPK)의 증가는 중증근무연증을 동반하는 신기근 장애를 유발할 수 있으므로 관찰을 요한다.
- 7 혈당공통증증이 나타날 수 있으므로 근육통, 식욕, 혈액과 뇨에서의 CK(CPK)의 증가를 주의깊게 관찰해야 한다. 혈당공통증증으로 인한 신기근 장애가 나타나는데에 대한 주의를 요한다.
- 8 호흡곤란
- 9 급성 폐장염
- 10 급성 신부전
- 11 원인을 알 수 없는 급사

2) 다음은 임상시험에서 보고된, 이 약과 인과관계가 있다고 판단되는 이상반응이다.

발현빈도 기관계	매우 흔함 (10%이상)	흔함 (10%~1%)	흔하지 않음 (1%~0.01%)	드물음 (0.01%미만)	빈도불명
감염질환 대사 및 영양	감기				
정신계	환각** 혼동** 공격적행동**	불안증, 불면증, 졸음, 성욕증가, 수다, 조증		악몽, 신경과민, 섬망, 망상, 우울증, 혼돈, 무관심, 운동과다증	

발현빈도 기관계	매우 흔함 (10%이상)	흔함 (10%~1%)	흔하지 않음 (1%~0.01%)	드물음 (0.01%미만)	빈도불명
신경계	심신*, 어지러움, 불면, 진전		발작*	추체외로증상	혼이
심혈관			서맥 심계항진증	동방차단 방실차단	고혈압, 저혈압, 심방세동
위장관	설사 오심	구토, 복부장애(복통포함)		위장관출혈, 위십이지장궤양, 변비, 타액분비	연하곤란, 대변실금
간-담즙				간염을 포함한 간장애***	
피부 및 피하조직		발진, 가려움증			
근골격계, 접합조직 및 뼈		근육 경련			근육통
신장 및 비뇨기계		요실금			빈뇨, 요정체
전신 및 투여부위	두통	피로 동통 치통	안면홍조, 권태감, 무기력증		부종(안면부종 포함) 발열, 체온감소
혈액계		헤마토크리트 감소	백혈구감소증		빈혈 혈소판감소증

* 심신이나 발작에 대한 임상연구시 심블록 또는 동유지 연장의 가능성이 고려되어야 한다.

** 환각, 혼돈 및 공격적 행동은 용량 강박 또는 치료 중단시 사라졌다.

*** 설명할 수 없는 간기능 장애의 경우, 이 약의 투여 중단이 고려되어야 한다.

3) 이 약과 인과관계에 상관없이 이 약의 투여 후 보고된 이상반응은 다음과 같다.

1) 혈관 및 위관관계 : 반상출혈

2) 신경계 : 비정상적 꿈

4) 국내 시판후 조사결과

국내에서 6년 동안 2,563명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사결과 이상반응은 인과관계와 상관없이 5.31%(136례/2,563례)로 보고되었다. 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 4.25%(109례/2,563례)이다.

이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된(또는 인과관계를 배제할 수 없는) 이상반응을 발현빈도율이 높은 순으로 다음과 같이 나타내었다.

오심(1.72%(44례/2,563례)로 가장 많았고, 구토 0.82%(21례/2,563례), 어지러움 0.62%(16례/2,563례), 설사 0.47%(12례/2,563례), 불면 0.39%(10례/2,563례), 복부통증 0.31%(8례/2,563례)의 순으로 나타났다. 식욕부진, 두통, 피로, 추체외로장애가 각 0.2%로 근간성이상, 배뇨장애가 각 0.1%로 보고되었으며, 0.1% 미만에서 불안증, 비정상적 꿈, 심계항진, 무기력증, 발한, 피부발진, 공격적행동, 진전, 보행장애, 불수의운동, 집중력저하, 정신둔함, 졸음, 심장정지나 보고되었다.

이 중 시판 전 임상시험에서 확인되지 않은 새로운 이상반응으로 심장정지 1건이 보고되었다.

알츠하이머 형태의 중증 치매증상의 치료

1) 투여중단의 원인이 된 이상반응

통제된 임상 시험에서의 이상반응으로 인한 약물 투여 중단율은 이 약의 투여군이 12%, 위약군이 7%였다. 투여 중단된 가장 빈번한 이상반응은, 이 약의 투여군의 최소 2%에서 발생했고 그 빈도가 위약군의 2배 이상으로 정의되며, 식욕 감퇴(이 약의 투여군 2%, 위약군 1%), 오심(이 약의 투여군 2%, 위약군 1% 미만), 설사(이 약의 투여군 2% 위약군 0%), 요로감염증(이 약의 투여군 2% 위약군 1%) 등이 해당되었다.

2) 이 약의 투여와 관련성이 있을 것으로 보이는 가장 빈번한 이상반응
이 약을 투여받은 환자에서 적어도 5%의 빈도를 보이고 위약군에 비해 2배 이상이며, 이 약의 골린유사작용에 기인한 것으로 추정되는 이상반응으로 정의한 가장 흔한 이상반응은 설사, 식욕감퇴, 구토, 오심과 반상출혈 등이 있었다. 이러한 이상반응은 주로 경도라고도 일시적이며 투여 기간 동안 용량 조절의 필요 없이 회복되었다. 다음 표는 위약대조군 시험에서 이 약을 투여받은 피험자 중 적어도 2% 이상에서 보고되고 위약 투여군에 비해 발생율이 더 높은, 투여로 인한 징후나 증상을 목록화한 것이다.

통제된 임상시험에서 보고된 이상반응

중증의 알츠하이머형 치매에 대한 통제된 임상시험에서, 이 약을 투여받은 피험자 중 최소 2%에서 보고되고 위약 투여군에 비해 발생율이 높은 이상반응	신체기관	이상반응	위 약(n=392)	본 제제(n=501)
1가지 이상의 이상반응을 경험한 피험자 수			73	81
전신	사고		12	13
	감염		9	11
	두통		3	4
	통증		2	3
	등통증		2	3
	발열		1	2
	홍조		<1	2
심혈관계	고혈압		2	3
	출혈		1	2
	심신		1	2
소화기계	설사		4	10
	구토		4	8
	식욕 감퇴		4	8
	오심		4	6
	오심		2	6

신체기관	이상반응	위 약(n=392)	본 제제(n=501)
혈액 및 림프계	반상 출혈	2	5
대사 및 영양계	크레아닌 포스포크리에닌 증가 탈수 고지혈증	1 1 < 1	3 2 2
신경계	불면증	4	5
	적각성	2	3
	신경질	2	3
	환각	1	3
	졸음	1	2
	현기증	1	2
	우울증	1	2
	혼란	1	2
피부 및 피부 부속기관	감정 불안정성	1	2
	성적 이상	1	2
피부 및 피부 부속기관	습진	2	3
비뇨기계	요실금	1	2

3) 임상시험 동안 보고된 다른 이상반응
이 약은 3건의 이중 맹검 위약 대조군 시험(예 중 한 건의 임상시험은 공개 라벨시험으로 확장되었음)을 포함하여 최소 6개월 이상 진행된 임상시험에서 600명이 넘는 중증 알츠하이머병의 피험자에게 투여되었다. 아래 표에는 적어도 2번 이상 발생한 모든 이상반응을 포함시키되, 상기 표에서 이미 목록화된 이상반응과, COSTART 용어가 너무 일반적이어서 유익한 정보를 제공하지 않거나, 혹은 의약품과의 관련성이 적은 것은 제외하였다. 이상반응은 COSTART 용어집을 사용하여 신체 기관에 따라 분류되었다. 다음의 정의에 따라 목록화하였다 :

흔한 이상반응 : 1% 이상 ; 흔하지 않은 이상반응 : 0.1% ~ 1%.

이러한 이상반응은 반드시 이 약의 투여와 관련성이 있는 것은 아니며, 대부분의 경우 통제된 임상시험에서 위약 투여군에서의 빈도와 유사하였다.

신체기관	흔 함(1%이상)	흔하지 않음(0.1% ~ 1%)
전 신	복통, 무력증, 골공이 감염, 인플루엔자 증후군	알러지 반응, 붓기와적열, 권태, 패혈증, 얼굴 부종, 탈장
심혈관계	저혈압, 서맥, ECG 이상, 심부전	심근경색, 협심증, 심방세동, 울혈성 심부전, 말초 혈관 질환, 상심실성 기외수축, 심실성 기외수축, 심장 비대
소화기계	변비, 위장염, 대변실금, 소화불량	감마 글루타미드 트랜스퍼민아제 증가, 위염, 연하곤란, 치주염, 위궤양, 치질의 농양, 고창, 간기능 이상, 트림, 식도염, 항문출혈
내분비계	당뇨	
혈액 및 림프계	빈혈	백혈구 증가증
대사 및 영양계	체중 감소, 말초 부종, 부종, 유당 탈수소효소 증가, 알칼리 포스파타아제 증가	고콜레스테롤혈증, 저칼륨혈증, 저혈당증, 체중증가, 빌리루빈혈증, BUN 증가, B12 결핍성 빈혈, 약독성, 크레아티닌 증가, 동통, 지나트륨증, 저단백혈증, 혈결핍성 빈혈, SGOT 증가, SGPT 증가
근골격계	관절염	관절증, 골 관절, 관절통, 다리 경련, 골 다공증, 근육통
신경계	흥분, 불안, 진전, 경련, 유주성의 정신 이상, 보행 이상	무감정, 현기증, 망상, 공이성, 뇌혈관 이상, 타액 분비 증가, 운동 실조증, 다행증, 혈관확장, 두개내출혈, 뇌경색, 뇌허혈, 치매, 추체외로증상, 대발작경련, 반신불수, 긴장 항진, 운동감소증
호흡기계	인두염, 폐렴, 기침 증가, 기관지염	호흡 곤란, 비염, 천식
피부 및 피부 부속기관	발진, 피부 궤양, 가려움증	건선, 피부 변색, 대상 포진, 건조한 피부, 발한, 두드러기, 수포성 발진
특수감각기계	결막염, 녹내장, 시각 이상, 이통, 눈물 이상	
비뇨생식기계	요로감염증, 방광염, 혈뇨, 당뇨	질염, 배뇨장애, 빈뇨, 단백뇨

4. 상호작용

- 이 약은 주로 CYP450에 의해 대사되며 부분적으로 CYP2D6과 관련한다. 저해나 유도 정도는 아직까지 알려지지 않았지만 아래 약물과 병용시 주의해야 한다.
 - CYP3A4 저해제(예, 이트라코나졸, 에리스로마이신)와 CYP2D6 저해제(예, 퀴니딘, 플루옥세틴)는 이 약의 대사를 방해하고 약효를 증가시킬 수 있다.
 - CYP3A4 유도제(예, 리팜피신, 페니토인, 카바마제핀, 벡사메타손, 페노바비탈, 알콜)는 이 약의 대사를 증가하고 약효를 감소시킬 수 있다.
- 이 약은 석시닐콜린형 근이완제나 다른 신경근육 차단제의 작용을 강화시킬 수 있다.
- 콜린성 약물(예, 카프로늄, 베타네콜, 아클리리돈, 나피타실레이트) 또는 아세틸콜린 에스테라제 저해제(예, 알레보늄, 디스티그민, 피리도스티그민, 네오스티그민)와의 병용투여는 콜린성 작용을 증가시킬수 있어 피해야 한다.

- 이 약과 할 콜린성 약물(예, 아트로핀, 스코폴라민, 트리헥시페니딜, 피로헨틴, 비페리딘)은 길항작용으로 인해 약효를 감소시킬 수 있다.
- 이 약은 테오필린, 와르파린, 시메티딘, 디곡신의 대사를 저해하지 않으며, 디곡신이나 시메티딘과의 병용에 이 약의 대사는 영향을 받지 않는다.
- 심장전도도에 영향을 주는 베타 차단제와 같은 약물과의 병용 투여로 상승작용을 일으킬 수 있다.
- NSAIDs와의 병용은 콜린제 작용으로 위산의 분비를 증가시켜 소화성 궤양을 일으킬 수 있다.

5. 일반적 주의

- 알츠하이머병과 다른 유형의 치매를 구분함에 있어 진단의 주의를 요한다. 치료는 알츠하이머 치매의 진단과 치료에 있어 경험있는 의사에 의해 시작되고 감독되어야 한다. 진단은 인정된 지침(예 : DSM IV, ICD 10)에 따라 이루어져야 한다. 도네패질 치료는 보호자들이 환자의 약물 복용을 정기적으로 관찰할 수 있을 때에만 시작되어야 한다. 유지가 치료는 환자 생존에 치료적 효과가 있는 동안만 계속되어야 한다. 즉, 도네패질의 임상적 효과는 정기적으로 재평가되어야 한다. 특히 이 약 투여를 시작하거나 용량을 증량할 때 피로, 어지럼증, 근육 경련이 일어날 수 있다. 의사는 주기적으로 이 약을 사용하는 환자의 운전능력이나 복잡한 기계사용 능력을 확인해야 한다.
- 혈관성 치매 임상시험에서의 사망률 : NINDS-AIREN 분류에서 혈관성 치매(VaD)로 의심되거나 가능성이 있는 환자들을 대상으로 37가지의 6개월 임상시험이 진행되었다. NINDS-AIREN 분류에 따라 순수 혈관성 치매환자를 진단하고 알츠하이머 치매 환자를 제외시켰다. 첫번째 연구에서, 도네패질염산염 5mg군에서의 사망률은 2/198(1.0%), 도네패질염산염 10mg군에서의 사망률은 5/206(2.4%), 위약군에서의 사망률은 7/199(3.5%)였다. 두번째 연구에서, 도네패질염산염 5mg군에서의 사망률은 4/208(1.9%), 도네패질염산염 10mg군에서의 사망률은 3/215(1.4%), 위약군에서의 사망률은 1/193(0.5%)였다. 세번째 연구에서, 도네패질염산염 5mg군에서의 사망률은 11/648(1.7%), 위약군에서의 사망률은 0/326(0%)였다. 세 종류의 혈관성 치매 연구에서 전체 사망률은 위약군에서(1.7%) 위약군(1.1%)보다 수치상으로 높았으나, 통계적으로 유의하지는 않았다. 투약군 또는 위약군에서의 주요 사망 원인은 혈관성 질환을 가진 노령 인구에서 나타날 수 있는 여러 혈관성 원인에 기인하였다. 모든 중대한 혈관성 이상반응에 대한 분석에서 위약군은 위약군과 발생률에 있어 차이를 보이지 않았다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임부 : 임신한 여성에 대한 이 약의 임상 자료가 없기 때문에 꼭 필요한 경우가 아니라면 임신중 이 약을 사용해서는 안된다. 동물실험에서 초기형성을 일으키지 않았지만 어린 새끼의 생존율과 사산율에 영향을 주었다. 임신부에 대한 잠재적인 위험은 알려지지 않았다.
- 수유부 : 이 약은 젖의 모유에 이행되었다. 도네패질염산염의 모유로의 이행여부는 알려져 있지 않으며 수유부 여성에 대한 연구 결과는 없다. 따라서 수유부에 이 약을 사용해서는 안되며, 반드시 투여되어야 할 경우에는 모유수유를 치료기간동안 중단하여야 한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에서의 안전성은 아직 확립된 바 없다(소아에서의 사용경험 없음).

8. 임상검사치에의 영향

임상시험결과 실험실 수치에서 주목할 만한 이상은 없었으나 이 약의 투여로 인해 근육 CK(CPK), LDH, AST(GOT), ALG(GPT), γ-GPT, ALP, BUN, 총콜레스테롤, 총지질, 아밀라아제, 소변아밀라아제의 농도가 약간 증가할 수 있다.

9. 과량투여시의 처리

- 증상 : 콜린에스테라제 저해제의 과량투여로 중증의 구역, 구토, 타액분비과다, 발한, 서맥, 저혈압, 호흡곤란, 쇠약, 경련 등의 콜린성 작용과 관련된 위험이 나타날 수 있다. 근육 쇠약증상이 일어날 수 있으며 호흡기계 근육이 이완되어 사망할 수도 있다. 미우스 소아와 컷트의 동물실험에서 치사용량의 중앙값은 45mg/kg과 32mg/kg로 각각 사람에 대한 치사용량(10mg/1일)의 225배와 160배였다. 동물실험에서의 용량 대비 콜린성 자극증상은 자발적 행동의 감소, 옅어진 자세, 비틀거리는 걸음, 유두, 간대성 경련, 호흡곤란, 타액분비, 축동, 성욕억제, 체표온도 저하 등이었다.
- 처리 : 과량 투여하였을 때 일반적인 방법으로 처리한다. 3차 항콜린제(예, 황산아트로핀)를 이 약의 과량 투여에 대한 해독제로 사용 할 수 있다. 황산아트로핀의 경우 초기 용량 1.0mg ~ 2.0mg로 정맥투여 한 후 임상 반응에 따라 용량을 증가시킨다. 다만, 4차 항콜린제와 콜린성 약물(예, 글리코피롤레이트)을 병용투여하였을 때 혈압과 심박수에 있어서 비전형적인 반응 발현에 대한 보고가 있었다. 도네패질염산염과 그 대사물질이 투석(혈액투석, 복막투석, 혈액여과)으로 제거되는지 여부는 알려져 있지 않다.

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】

30정

- ※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서의 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제제는 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품이 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr> → 정보마당 → 의약품등 정보)을 참조하십시오.
- ※ 본 제제 첨부서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.