

히알루미니™ 점안액

0.1 % (1회용)

(히알루론산나트륨)

전문약품

의 약 품	131
분류번호	안과용제

히알루미니점안액0.1%(1회용)은 안구의 초자체 및 방수 성분에 포함된 생체 성분인 히알루론산(N-acetyl-D-glucosamine, D-glucuronic acid 가 반복된 다당체)을 주성분으로 하는 점안액으로 작열감 없이 각결막 손상치유를 촉진 시키며 보수 지속 효과 및 누액 안정화 작용을 나타내어 안구 건조증 및 외상, 하드콘택트렌즈 착용 등에 의한 각결막상피장애에 사용할 수 있습니다.

【원료약품의 분량】 1mL 중
유효성분 : 히알루론산나트륨(KP)..... 1mg
첨가제(안정제) : 에데트산나트륨수화물
첨가제(용제) : 주사용수
첨가제(등장화제) : 염화나트륨
첨가제(pH조절제) : 수산화나트륨
첨가제(완충제) : 아미노카프로산

【성 상】 무색 플라스틱 용기에 든 무색투명하고 점조성이 있는 수용성 점안액이다

【효능 · 효과】

다음 질환에 의한 각결막 상피장애 :

- 쇼그렌증후군, 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 건성안증후군과 같은 내인성 질환
- 수술 후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등에 의한 외인성 질환

【용법 · 용량】


1회 1방울 1일 5~6회 점안한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

보통 0.1% 제제를 투여하고 증증 질환 등에서 효과가 불충분한 경우에는 0.3% 제제를 투여한다.

점안 후 남은액과 용기는 바로 버린다.

【사용법】



손을 깨끗이 씻고 점안할 1회용 용기를 분리합니다. 분리하고 남은 나머지 1회용 용기는 보관되어 있던 박스에 넣습니다.



개봉시의 용기 파편을 제거하기 위하여 최초 사용 시 1~2방울은 점안하지 않고 버립니다.



용기를 세워서 잡고 약액이 용기의 하단에 있는지 확인합니다.



용기의 끝이 직접 눈에 닿지 않도록 주의하여 점안합니다.



제품상단의 손잡이와 제품하단의 손잡이를 잡고 돌리면 용기와 뚜껑이 분리됩니다. 이 때 약액의 오염 방지를 위하여 뚜껑 및 약액이 흘러나오는 용기 끝 부분에 손이 닿지 않게 합니다.



무균제품으로서 개봉 후 1회만 즉시 사용하고, 남은 약액과 용기는 바로 버립니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약의 구성성분 및 단백질계 약물에 과민반응 환자

2. 이상반응

- 1) 눈 : 때때로 안검 소양감(눈꺼풀 가려움), 눈자극감, 결막염, 충혈, 결막충혈, 미안성 표층각막염 등의 각막장애, 이물감 등이 나타날 수 있고, 드물게 안지(눈곱), 안구 통증이 나타나는 경우가 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 2) 과민반응 : 때때로 안검염, 안검피부염이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 3) 국내 시판후조사결과 다음 병용약제 투여시의 이상반응 발현율이 병용약제를 투여하지 않았을 경우 보다 유의하게 높게 나타났다.
 - 스테로이드제제(corticosteroids), 안구건조치료제(dry eye preparations), 항균제(anti-infectives), 녹내장제제(glaucoma preparations), 항알레르기제제(anti-allergy), 백내장제제(cataract preparations), 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs), 스테로이드+항균제(antiseptics with corticosteroids)
- 4) 외국에서 승인사까지의 조사 및 사용성적 조사의 총 증례 4,208례 중 이상반응이 확인된 것은 74례(1.76%)였다. 주된 이상반응은 안검 가려움 19례(0.45%), 눈 자극감 15례(0.36%), 결막 충혈 10건(0.24%), 안검염 7건(0.17%) 등 이었다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

3. 상호작용

이 약은 다른 점안제와 동시에 사용하지 않도록 한다. 함께 사용할 경우에는 다른 점안제를 사용하고 약 30분 후에 이 약을 점안한다.

4. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 점안용으로만 사용한다.
 - 2) 용기의 끝이 눈꺼플 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 진균 등에 의해 약액이 오염될 수 있으므로, 직접 눈에 닿지 않도록 주의 한다.
 - 3) 1회용 제품의 경우 최초 사용 시 1~2방울은 점안하지 않고 버린다(개봉시의 용기 파편을 제거하기 위함.).
 - 4) 개봉한 후에는 1회만 즉시 사용하고, 남은 액과 용기는 바로 버린다.
 - 5) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
5. 보관 및 취급상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30개(0.5mL/튜브×6×5개)/카톤, 30개(0.8mL/튜브×6×5개)/카톤

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

- ※ 사용자 편의상 용기 내 빈공간이 존재하며 제품의 용량은 표시사항과 동일합니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
- ※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
2. 먹지 마십시오. 코, 구 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2017. 07. 31

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장) 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.