



【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정 중

카르베딜롤(EP) 12.50mg
첨가제(제올룰루라): 유당수화물(소-우유)

【성 상】 적갈색의 원형정제

【효능·효과】

1. 본태고혈압
2. 만성 안정형심증

【용법·용량】

의사의 지시없이 용량을 증가시키거나 복용을 중단하여서는 안된다.

1. 본태고혈압

- 1) 성인
(1) 처음 이들은 카르베딜롤로서 1일 1회 12.5mg씩 경구투여하고 이후 1일 1회 25mg을 경구투여한다.
(2) 통상 1일 1회 25mg을 2주간 경구투여한다. 증량이 필요할 경우 1회 25mg을 1일 2회로 늘린다. 1회 최대복용량은 25mg, 1일 최대복용량은 50mg이다.
- 2) 고령자
일부 고령자의 경우 1일 1회 12.5mg 투여로 충분한 효과를 나타낼 수 있다. 단, 2주 투여 후 효과가 충분치 않을 경우 증량할 수 있다.

2. 만성 안정형심증

- 1) 처음 이들은 이 약으로서 1회 12.5mg 1일 2회 경구투여하고 이후 1회 25mg을 1일 2회 경구투여한다.
(2) 통상 1회 25mg을 1일 2회로 2주간 투여한다. 증량이 필요한 경우(고령자는 제외) 1회 50mg을 1일 2회까지 증량할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에서는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 병력 환자
- 2) 심장성 쇼크 환자(순환 부전증이 악화될 우려가 있다.)
- 3) 중증의 서맥(50회/분 미만), 방실차단(2, 3도), 동방차단, 동기능부전증후군(sick-sinus syndrome) 등 심장전도가 특히 흥분되어 있거나 차단된 환자
- 4) 폐심장증(Cor pulmonale) 환자(폐고혈압에 의한 우심부전이 있는 환자에서 심박출량이 억제되어 증상이 악화될 우려가 있다.)
- 5) 당뇨병에 의한 케톤산증, 대사산증 환자(심근 수축력 억제작용이 커질 수 있다.)
- 6) NYHA(New York Heart Association) Class IV의 심기능 보상이 전신성 질환자 등 심근력이 쇠약한 자 혹은 불안정심부전 환자
- 7) 천식환자, 만성폐쇄 폐질환 등 기관지 경련이 있는 호흡기 질환자 혹은 그 병력 환자(기관지 근육을 수축시킬 수 있으므로 증상을 유발, 악화시킬 수 있다. 정제에서 천식지속상태에 의한 사망이 보고된 바 있다.)
- 8) 이차고혈압 환자
- 9) 프린트페탈협심증 환자(통통을 유발할 수 있다.)
- 10) 급성 폐쇄성 색전증 환자
- 11) 크론친폐포증 환자(이 약의 단독투여에 의해 급격하게 혈압이 상승할 우려가 있다.)
- 12) MAO억제제 복용자(MAO-B억제제 제외)
- 13) 수축기 혈압 90mmHg 이하의 심한 저혈압 환자
- 14) 중증 간기능 손상 환자
- 15) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 16) 말초순환장애(예, 레이노증후군, 간헐파행 등) 환자(말초혈관확장을 억제하고 혈류장애증상을 악화시킬 수 있다.)
- 17) 성문부종 환자
- 18) 합병증을 동반한 심장발작 환자
- 19) 정맥내 근육수축제를 필요로 하는 현저한 체액저류 환자 혹은 과부하 환자
- 20) 알레르기 비염 환자
- 21) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자(경우)에는 신중히 투여할 것.

- 1) 당뇨병 환자
- 2) 심한 과민반응 병력이나 민감성을 줄이는 치료를 받는(hyposensitization therapy) 환자(베타차단제는 알레르기항원에 대한 민감성과 과민반응을 증가시킨다.)
- 3) 베타차단제에 의한 건선 병력이 있는 환자 또는 이러한 기복력이 있는 환자
- 4) 저혈압(수축기혈압 100mmHg 이하)과 함께 허혈성질환의 병발성 혈관질환, 또는 신기능 부전 등 이 있는 환자(이 약을 투여시 가역적인 신기능 장애가 나타날 수 있다.)
- 5) 불안정형심증 환자(임상경험이 적으므로 이러한 징후나 증상을 보이는 환자에게 이 약을 투여시 주의한다.)
- 6) 만성 울혈성심부전 환자(울혈성심부전 환자에게 이 약을 증량할 때 심부전이 악화되거나 체액 저류가 나타날 수 있다.)
- 7) 중증의 신장장애 환자(이 약의 혈중농도 증가가 보고된 바 있다.)
- 8) 1도 방실차단 환자(방실전도 시간이 연장되고 증상을 악화시킬 우려가 있다.)
- 9) 경증에서 중등도 사맥환자
- 10) 인약형태의 베타차단제 투여중인 환자
- 11) 고령자
- 12) 자세변화시 혈압강하하는 경향이 있는 환자
- 13) 급성 염증성 심장병, 심장판막 혹은 심혈관의 변화 환자
- 14) α₁-수용체 길항제 혹은 α₂-수용체 작용제와 병용하는 환자

- 12) 이 약의 첫 복용용, 치료 첫 주, 그리고 용량 증가시 혈압과 심전도를 주기적으로 검사할 것이 권장되며 유효용량에 도달하면 신장기능의 주기적인 검사도 실시할 것을 권장한다. 심신 혹은 과도한 혈압강하를 줄이기 위해 이 약은 낮은 용량에서 시작해서 점차적으로 증량하며, 음식과 함께 복용할 것이 권장된다. 치료 시작시 환자는 운전 혹은 위험한 작업을 수행하지 않아야 한다.
- 13) 이 약은 도핑검사 시 실시되는 테스트들에서 양성 반응을 초래할 수 있는 유효성분을 포함하고 있다.
- 14) 심부전의 경우, 이 약의 치료가 2주 이상 중단되면 치료 용량은 다시 1일 2회 3.125mg(서방 캡슐제)의 경우 1일 1회 8mg)이 권장되며 위의 용량 증량에 맞춰 용량을 증량시킬 것이 권장 된다.
- 15) 이 약은 당뇨병환자에게 투여시 급격한 혈당강하가 은폐되거나 적게 나타날 수 있고, 혈당조절이 어려워질 수 있으므로 복용을 시작할 때, 혹은 혈당강하요법을 조절 할 때 규칙적으로 혈당을 모니터링해야 한다.
- 16) 이 약을 투여시 가역적인 신기능 장애가 나타날 수 있으므로 투여시작, 증량할 때 신기능을 모니터링해야 하며, 신기능이 악화되는 경우 이 약의 용량을 줄이거나 복용을 중지한다.
- 17) 울혈성심부전 환자에게 이 약을 증량할 때 심부전이 악화되거나 체액 저류가 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타나면 이노제 용량을 조절해야 하고 임상적으로 안정될 때까지 이 약을 증량해서는 안 된다. 때때로 이 약을 감량하거나 중단할 필요가 있다.
- 18) 환자에 따라 어지럼, 졸음 등이 나타날 수 있으며 각성상태에 영향을 미치므로 운전, 기계조작 등에 주의하며, 특히 이약의 투여시작, 용량변화, 치료변화, 알코올복용 시 주의한다.

5. 상호작용

- 1) 이 약은 P-당단백질의 기질이며 억제제이기 때문에 P-당단백질을 통해 운반되는 약물들의 생체이용률은 이 약을 병용투여하게 되면 증가할 수 있다. 그리고 이 약의 생체이용률은 P-당단백질의 유도제 또는 억제제에 따라 변할 수 있다.
- 2) CYP2D6와 CYP2C9의 억제제와 유도제는 입체선택적으로 이 약의 대사를 변화시켜 R-과 S- 이성질체의 혈장 농도를 증가시키거나 감소시킬 수 있다.
- 3) 다른 혈압강화작용이 있는 약물이나 이상반응 중 혈압강하가 있는 약물(예, 바르비투르산염, 페노티아진 등의 진정제, 항우울제, 혈관확장제, 알코올 등의 작용이 증가될 수 있으며, 레세르핀, 구아네티딘, 메틸도파, 클로니딘, 구안파신, MAO억제제 등과 병용시 심박수가 더욱 감소, 중증의 서맥이 나타날 수 있다.
- 4) 딜티아젠티, 베타차단제 투여시 심장의 전도장애(드물게 혈액학적 손상과 함께)가 보고되었다. 베라파밀, 딜티아젠티 등 칼슘채널차단제, 아미오다론 등 부정맥치료제와 병용투여시 심박이 느려질 수 있고, 과도한 심기능 억제가 나타날 수 있으며, 방실전도장애의 위험을 높일 수 있으므로 심전도와 혈압을 주의깊게 모니터링해야 하며, 병용하여 정맥주사하여서는 안된다.
- 5) 고혈압환자에게 다국산과 병용투여시 다국산의 혈중농도가 약 15%(최대 60%) 상승되었다는 보고가 있으므로, 이 약의 복용을 시작, 중단할 때 및 용량을 조절할 때 다국산 농도를 모니터링해야 한다. 또한 감심배당체와 병용시 심박수가 현저하게 적어지고 방실전도가 지연될 수 있다.
- 6) 시클로옥시게나제 억제제(예, 아세틸살리실산, 코르티코스테로이드 등)는 이 약의 혈압강화효과를 낮출 수 있다.
- 7) 인슐린 또는 경구혈당당하제의 효과를 증강시킬 수 있으며, 저혈당증상(특히 심박수의 증가)이 은폐될 수 있다. 인슐린 또는 경구혈당당하제를 복용하는 환자의 경우 정기적으로 혈당을 모니터링해야 한다.
- 8) Mixed function oxidase를 유도시키는 물질(예, 리튬피신 등)은 이 약의 혈장농도를 감소시키며, 상기 효소의 억제제(예, 시메티딘 등)는 간대사를 낮추어 이 약의 혈장농도를 증가시킬 수 있다.
- 9) 이 약을 마취제, 마약과 함께 복용 시 각각의 수축력 감소 효과와 혈압강화 효과를 상충시킬 수 있으므로 마취하는 동안 활력징후를 주의깊게 모니터링해야 한다.
- 10) 경구용 시클로스포린 제제를 복용하는 신장이식환자와 심장이식환자를 대상으로 실시한 두 개의 임상시험에서 이 약을 복용하기 시작한 후 시클로스포린의 혈장농도가 상승하였다. 이 약은 장에서 P-당단백질 활성을 저해하여 시클로스포린의 경우 흡수를 증가시키는 것으로 나타났다. 시클로스포린의 치료학적 농도를 유지하기 위해 시클로스포린의 용량을 평균 10~20% 감량하는 것이 필요하다. 시클로스포린 농도의 개인간 차이가 크기 때문에 이 약을 투약하기 시작한 후 시클로스포린의 농도를 모니터링해야 한다.
- 11) 12명의 건강한 피험자를 대상으로 한 임상시험에서 리튬피신의 투여는 주로 P-당단백질의 유도를 통해 이 약의 혈장농도를 감소시켜 이 약의 장 흡수를 감소시키고 항고혈압 효과를 감소시켰다.
- 12) CYP2C9의 억제제인 아미오다론은 카르베딜롤의 S-이성질체의 혈장농도를 2배 이상 증가시켰다. 따라서 아미오다론과 같은 CYP2C9의 억제제를 병용하는 경우 베타차단효과가 증가될 위험이 있으므로 서맥 또는 심정지 등의 징후를 관찰해야 한다.
- 13) 베타차단제와 카테콜아민을 소실시키는 약물(예, 레세르핀, MAO억제제)을 복용하는 환자는 저혈압 그리고/또는 중증의 서맥 증상을 신중히 관찰해야 한다.
- 14) 비스테로이드소염진통제(NSAID)와 베타차단제를 병용투여시 혈압이 증가하고 혈압이 잘 조절되지 않을 수 있다.
- 15) 심장 비선택적인 베타차단제는 베타효능 기관지확장제의 기관지확장효과를 방해하므로 기관지확장제를 복용하는 천식환자의 경우 신중히 모니터링해야 한다.
- 16) 항콜린에스테라제와 병용시 지나친 서맥의 위험이 있다.
- 17) 바르로펜과 병용시 혈압강화효과가 커지고 특히 기립저혈압의 위험이 있다.
- 18) 삼한계 항우울제 및 신경안정제와 병용시 혈관확장작용 및 기립저혈압의 위험 증가의 위험이 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 투여하지 않는다. 베타차단제는 태반관류를 막아서 태아의 자궁 내 사망 혹은 기형아 출산, 조기 출산이 일어날 수 있다. 또한 신생아에게도 저혈당증, 서맥, 호흡저하, 그리고 고열 등을 일으킬 수 있다. 또한 급성폐부종 혹은 입원을 필요로 하는 심부전까지 나타날 수 있다.
- 2) 이 약의 대사물은 모유로 이행되므로, 이 약 복용 시 수유하지 않는다. 수유하는 여성에게는 이 약을 투여하지 않는다.

7. 소아에 대한 투여

18세 미만 소아 및 청소년에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않다. 중증 심부전이 있는 유아 및 소아에서 이 약의 투여에 의해 심한 저혈당 증상이 나타나 사망에 이르는 예도 보고된 바 있다.

- 15) 염분 혹은 수분 결핍 환자(예, 고용량의 이노제 투여)
- 16) 감심배당제 투여중인 환자
- 17) 베라파밀, 딜티아젠티 등 비-디하이드로피리딘계 칼슘채널차단제 혹은 항부정맥제 투여 중인 환자
- 18) 금식 환자
- 19) 갑상샘기능항진 환자
- 20) 콘택트렌즈 사용 환자
- 21) 18세 미만의 소아 및 청소년
- 22) 급성심근경색 발병환자 중 혈액학적 불안정 환자
- 23) 관상동맥심장질환이 있는 고혈압 환자

3. 이상반응

- 1) 중추신경계 : 때때로 어지럼, 두통, 피로, 드물게 무력감이 나타나는데 이런 증상은 보통 경증이며 특히 치료초기에 발생한다. 드물게 환각, 착란, 우울, 수면장애, 악몽, 정신병 등이 나타날 수 있다.
- 2) 심혈관계
(1) 고도의 서맥, 쇼크, 완전한 방실차단, 심부전(급성을 포함), 심장정지 등과 같은 중대한 이상 반응이 일어날 수 있으므로 심기능검사를 정기적으로 실시하고 그러한 증상이 나타나면 감량 또는 투여중지 등 적절한 조치를 취한다.
(2) 때때로, 특히 이 약을 처음 복용하거나 증량할 때 또는 갑자기 일어설 때 어지럼, 눈앞이 캄캄한 등의 증상과 함께 혈압이 현저하게 낮아질 수 있으며, 드물게 의식을 상실할 수 있다.
(3) 때때로 맥박수가 감소할 수 있으며, 드물게 사지냉감이 나타난다. 이러한 증상은 간헐파행, 레이노병, 협심증, 부종 환자의 경우 악화될 수 있다.
(4) 심부전 환자는 어지럼이 나타날 수 있고, 때때로 다양한 병소와 크기의 부종이, 드물게(특히 용량 증가시) 방실차단, 심부전의 악화가 나타날 수 있다.
(5) 신장 : 전신적인 혈관장애가 있거나 신기능이 손상된 자는 신기능이 악화되거나 드물게 심부전이 나타날 수 있다.
(6) 호흡기계 : 호흡기도의 저항성이 증가될 수 있다.
(7) 소화기계 : 때때로 구역, 설사, 복통, 구토가 드물게 변비가 나타날 수 있다.
(8) 피부 : 두드러기, 가려움, 편평태선 유사반응(lichen planus-like reaction) 등이 보고되었으며, 드물게 알레르기 발진이 나타날 수 있다. 베타차단작용을 가지는 약물은 심상성 건선을 유발하거나, 이 질병의 증상을 악화시키거나, 건선양 발진을 나타낼 수 있다.
(9) 혈액계 : 혈청 아미노전달효소 등 간기능지표의 변화, 혈소판감소증, 백혈구감소증이 드물게 보고되었다.
(10) 내분비계 : 베타차단제의 특성상 갑상선의 당뇨병이 발생할 수 있으며, 발현된 증상이 악화되거나 혈당조절이 억제될 수 있고 저혈당이나 갑상선의 과다기능(높은 심박수 등)이 은폐될 수 있다. 심기능부전환자는 고혈당, 체중증가, 혈중 콜레스테롤치의 증가(이미 당뇨병을 앓고 있는 경우)가 나타날 수 있다.
(11) 순환기계 : 서맥, 저혈압, 숨찬, 어지럼이 나타날 수 있고(0.1~5% 미만), 드물게 협심증 환자에서 고혈압이 나타날 수 있다.
(12) 간장 : AST, ALT, γ-GTP의 상승 등을 수반하는 간기능장애 및 황달이 나타날 수 있다. 간기능장애 증상(예, 짙은 소변색, 지속적 식욕부진, 황달, 오른쪽 상부와 압박 통증, 설명할 수 없는 독감증세 등)이 나타나면, 신중히 검사해야 하며 간손상이나 황달이 확실하다면 이 약의 사용을 중단해야 한다.
(13) 기타 : 때때로 사지의 통증, 눈물감소, 드물게 감각장애(착각각증, 감각이상), 시각장애, 눈의 자극, 구강건조, 배뇨장애(요실금 포함), 성기능장애, 알레르기 반응이 나타날 수 있다.
(14) 국내 시판용 조식결과(울혈성심부전 : 721례, 만성안정형심증 : 661례) 보고된 이상반응 : 다음 이상반응 모두 0.1% 미만으로 드물게 발현되었으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다
(1) 울혈성심부전 : 뇌혈관장애, 객담증가, 빈맥, 과혈당증, 흉통, 백혈구증가증, 혈뇨
(2) 만성안정형심증 : 심근경색, 고칼륨혈증

4. 일반적 주의

- 1) 장기투여시는 심기능검사(맥박, 혈압, 심전도, X선 등)를 정기적으로 한다. 특히 서맥 및 저혈압을 일으킨 경우에는 감량하거나 투여를 중지한다. 또한 간기능, 신기능, 혈액상 등에 주의한다.
- 2) 베타차단제(프로프라놀롤염산염)를 투여중인 협심증 환자로서 갑자기 투여를 중지했을 때 증상이 악화되거나 심근경색을 일으킨 증례가 보고되어 있으므로 휴약이 필요한 경우에는 천천히 감량하면서 관찰을 충분히 한다. 의사의 지시없이 중단하지 않으며, 고령자에서 특히 주의한다.
- 3) 열류 및(또는) 체액이 부족한 자(이노제 고용량 투여 등), 70세 이상 고령자, 초기 수축기 혈압 100mmHg 이하의 저혈압환자에게 처음투여 및 용량증가시 혈압강화효과가 증폭될 수 있으므로 투여 후 2시간까지 주의하여 관찰한다.
- 4) 클로니딘과 병용투여를 중단해야 할 때에는 이 약을 일단 중단한 후 수일동안 클로니딘의 용량을 점차적으로 줄여야 한다. 또한 클로니딘에서 이 약으로 변경하는 경우 클로니딘을 중단하고 며칠 후부터 이 약을 투여할 것이 권장된다.
- 5) 급격하게 투여를 중단하여서는 안되며(특히 만성안정형심증, 허혈성질환이 있는 환자는 협심증 발작의 빈도와 통증이 심해질 수 있으며, 드물게 심근경색 또는 일시적인 혈압상승이 일어날 수 있다.), 2주간 점차적으로 중단한다. 협심증 악화를 막기 위해 필요할 때 항협심증약을 투여한다.
- 6) 심박수가 분당 55회 이하로 떨어지는 경우 용량을 점차 줄이고 분당 50회 이하로 떨어지는 경우 이 약 치료가 중단되어야 하며, 1도 방실차단인 있는 경우 주의하여 투약한다.
- 7) 다른 베타차단제와 마찬가지로 감심생기능항진증 증상을 은폐할 수 있다. 또한 갑상샘기능항진증 환자는 갑자기 투여를 중단하면 증상을 악화(예, 갑상샘항진증상 악화, 갑상샘독성발작 등)시킬 수 있으므로 중단이 필요한 경우 환자의 상태를 충분히 관찰하며 1~2주에 걸쳐 단계적으로 감량해야 한다. 또한 감량시 환자에게 신체적 활동을 줄이도록 한다.
- 8) 콘택트렌즈를 사용하는 자는 눈물이 감소될 수 있다.
- 9) 한국인을 대상으로 한 연구결과 CYP2D6 extensive metabolizer 보다 poor metabolizer 환자에서 카르베딜롤의 체내 동태가 높게 관찰되었는 바, CYP2D6 poor metabolizer 환자에서 주의하여 사용한다.
- 10) 수술 전 48시간은 투여하지 않는 것이 바람직하다. 심근기능을 감소시키는 마취제 투여시 매우 신중해야 한다.
- 11) 이 약의 복용량 적정 단계 동안 심근 수축력 감소로 심부전증의 악화를 초래할 수 있다.

8. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 간에서 대사되는 약물이며, 중증 간장애 환자에서 혈중 농도 상승이 보고된 바 있다. 일반적으로 고령자는 간기능이 저하되어 있는 경우가 많기 때문에 혈중 농도가 상승할 우려가 있으며, 고령자에서 과도한 혈압강하는 뇌경색 등이 일어날 우려가 있어 바람직하지 않다. 따라서 고령자에게 투여시 낮은 용량에서 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 충분히 관찰하며 신중히 투여할 것이 권장된다.

9. 과량투여시의 처치

과량투여시 혈압의 뚜렷한 강하, 심박이 느려짐, 심근약화, 심장성 쇼크, 심장정지, 호흡곤란, 기관지경련, 구토, 의식장애, 전신발작 등이 일어날 수 있다. 이러한 증상이 발생하면 즉시 의자에게 보고하여 적절한 조치를 취한다. 과량 투여시 환자는 바로누운자세를 취하도록 하고 위세척, 구토유도 등으로 약을 제거한다. 이 약은 혈액 투석에 의해 제거되기 어렵다. 쇼크증상과 함께 중증 증후의 경우, 이 약의 제거반감기가 꽤 길기 때문에, 해독제와 함께 보조적 치료가 충분히 오랫동안 지속되어야 한다. 해독제 치료 기간은 과잉 투여의 위중도에 따라 달라진다. 보조 치료는 환자의 회복때까지 지속되어야 한다.

10. 적응상의 주의

- 1) 이 약은 좌심방발출률 45%이하, 휴식시 심박수가 분당 65회 이상이며 기본적인 심부전치료가 최소 4주이전에 안정된 환자 (NYHA class나 기본 치료에 변동이 없으며 증상악화로 입원하는 경우가 발생하지 않는 경우)에게 투여한다.
- 2) 증량시마다 의사는 반드시 환자의 심부전 증상의 악화, 혈관확장으로 인한 이상반응(혈압강하, 어지럼)이 나타나는지 확인하며, 정기적인 검진(심기능, 체중, 혈압, 심박수 등)을 실시해야 한다. 일시적으로 심부전 증상이 악화되거나 체액이 저류되는 경우에는 이노제의 용량을 높여 치료하며, 때때로 이 약의 용량을 줄이거나 일시적으로 투약을 중단한다. 2주 이상 휴약하였다가 다시 복용하기 시작할 경우에는 초기용량(1일 2회 3.125mg(서방캡슐제)의 경우 1일 1회 8mg)부터 시작하며 '용량 용량'에 따른다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 빛에 노출되면 변색되므로 차광기밀용기에 보관한다.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않도록 주의한다.
- 3) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【포장단위】 100정 / PTP

【저장방법 및 사용(유효)기간】 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터36개월

【제조지】 ㈜대우제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

【제조외의지 및 판매】 ㈜바이넥스 부산광역시 사하구 다대로 368-3

- * 이 약은 빛에 노출될 경우 변색될 우려가 있으므로 케이스 안에 보관하십시오.
- * 습기에 민감하므로 PTP상태로 조제하십시오.
- * 내부포장이 파손 · 변질되어있으면, 복용하지 마십시오.

- * 본 의약품은 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 불량, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 이 약을 사용하기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.
- * 첨부문서의 개정연월일 이후로 변경된 허가사항은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 혹은 당사 홈페이지(www.bi-nex.com)나 전화(080-263-3151)로 문의하시면 확인하실 수 있습니다.

<http://www.bi-nex.com>

☎080-263-3151

개정연월일 : 2016년 10월 28일



S16J0500H