

레보폴정

(Levopol Tab.)

분류번호

222

전문의약품

[원료약품 및 그 분량] 1정중

레보드로프로피진(EP)..... 60.0mg

첨가제(동물유래) : 유당(젖당)수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

[성 상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과] 다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염

[용법·용량]

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60 mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)

증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증(심한 증상)의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 중증(심한 증상) 심부전 및 중증(심한 증상) 신장부전 환자
- 2) 고령자(노인)
- 3) 만 2세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계 : 심계항진(두근거림)
- 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용(함께 복용(사용)) 시 작용이 증대 될 수 있다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

[저장 방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용(유효)기한] 제조일로부터 36개월

[포장 단위] 자사포장단위

* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 약을 사용하시기 전에 반드시 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참조하시기 바랍니다.

* 이 제품설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.swpharm.com)의 제품 정보 또는 (<http://ezdrug.mfds.go.kr>)의 정보마당을 통해 확인하실 수 있습니다.

[설명문안 제정일] 2013. 08. 20



제조의뢰자·판매원

성원애드콕제약(주)

본사 : 서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 302호

Tel. 02)3665-2872(대) Fax. 02)3665-2874

공장 : 경기도 김포시 통진읍 가현로 182-4

Tel. 031)982-2872 Fax. 031)988-2873

<http://www.swpharm.com>

제조사

위더스제약(주)

경기도 안성시 미양면 제2공단2길 103