

말초혈행장애 및 갱년기증상에

안티노을 연질캡슐**ANTINOEUL Soft Capsule**

안티노을 연질캡슐은 현대 문명 생활을 영위하고 있는 문화인들의 생활에 있어서 발병되는 여러 병인들로부터 생체기능을 방어할 뿐 아니라 생체기능을 더욱더 강화시킴으로써 보다 활기차고 건강한 삶을 유지하여 주는 항산화비타민이 함유되어 있으며 최근 미국은 물론 유럽 등지에서 각광을 받고 있는 우수한 약효를 갖고 있는 항산화비타민제입니다.

또한 하루 1캡슐 복용만으로도 충분한 양의 비타민을 공급하므로 복용이 용이하고 편리합니다. 연질캡슐 제형으로 빛, 열, 공기 등에 불안정한 비타민을 안정화하여 비타민의 효과를 우리몸에 그대로 전달합니다.

원료약품 및 그 분량

1캡슐(1,660mg) 중	
셀레늄함유 건조효소(별규)	39.46mg
(셀레늄으로서 51.3 μ g)	
베타카로틴 30%현탁액 (KPC)	50mg
(베타카로틴으로서 15mg)	
dl- α -토코페롤(USP) (비타민 E로서 400IU)	363.64mg
아스코르브산(KP)	500mg
첨가제(타르색소) : 황색5호/203호, 청색1호, 적색40호	

성상 적갈색의 내용물을 함유한 암녹색의 장방형 연질캡슐**효능 효과**

1. 다음 경우의 비타민A, C, E의 보급
 - 육체피로
 - 임신수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력저하시
 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
 - 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈, 비출혈(코피)예방

용법 용량

12세 이상 어린이 및 성인 1일 1회, 1캡슐을 식후 복용합니다.

사용상의주의사항

1. 경고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않는다.
(비타민A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음 환자에는 투여하지 말것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과산화노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 심장·순환기계 기능장애 환자

- 5) 신장장애(신장장애) 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 위 장관(장자) 질환
- 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
4. 이상반응
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - ① 구약, 구토, 기려움증, 건조하고 거친피부, 통증성 관절 부종(부기)
 - ② 위부(상복부) 불쾌감, 설사 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)
 - ③ 피부염, 발진, 홍조, 악취, 탈모, 조급증
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리기에정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증(혈관막힘)의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
5. 일반적주의
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량을 1일 5,000I.U.를 넘지 않도록 한다.
 - 4) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여한다.
 - 5) 지방 과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 경구용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 상호작용
 - 1) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용{함께 복용(사용)} 투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 한다.
 - 2) 이약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용{함께 복용(사용)} 투여하지 않는다.
인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계제, 제산제
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용 전후에는 피할것
7. 임부에 대한 투여
외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000I.U./일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000I.U./일 미만에 머물도록하는 등 적절한 주의를 한다.
8. 임상검사치에의 영향
각종 뇨 검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
9. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
 - 3) 오용(잘못 사용), 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위 : 30, 60연질캡슐

사용기간 : 제조일로부터24개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처에서 교환해 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2011년 07월) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.

♣ 소비자 상담실: 02)568-0051 ♣ 반품 및 교환처: 02)525-0725

설명서 작성일: 2007.01

설명서 개정일: 2011.07

제조원



경기도 화성시 향남읍 상산리 906-6

알앤피코리아(주)

최대중재약 개발사

판매원



리드팜주식회사

LEADPHARM CO., LTD.