

# 이이케이 점안액

(Eyecare eye drops)

## 【원료약품의 분량】 1mL 중

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 설파메톡사졸(KP)                                                     | 40mg  |
| 글리시리진산이칼륨(KP)                                                  | 1mg   |
| 클로르페니라민말레산염(KP)                                                | 0.2mg |
| 아미노카프로산(BP)                                                    | 20mg  |
| 첨가제 : (안정(화)제)에데트산나트륨수화물, (완충제)붕사, 붕산, (pH조절제)수산화나트륨, (용제)주사용수 |       |

【성 상】 황색 투명 용기에 든 무색 내지 약간 미황색의 투명한 점안액

【효능·효과】 결막염(유행성결막염), 다래끼, 눈꺼풀의 짓무름, 눈의 가려움

【용법·용량】 1일 3~6회, 1회 1~3방울 점안한다.

## 【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  1. 눈의 통증이 심한 사람
  2. 지금까지 설파제에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움, 구역, 발열 등)을 일으킨 적이 있는 사람
  3. 지금까지 안약에 의한 알레르기 증상(예를 들면 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 충혈되어 붉어짐 등)을 일으킨 적이 있는 사람
  4. 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담이 가능한 한 이 점부문서를 소지할 것.
  1. 이 약의 투여에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
눈의 충혈, 가려움, 부종(부기) 등
  2. 3, 4일동안 투여 후에도 증상이 좋아지지 않는 경우
- 기타 이 약의 사용시 주의사항
  1. 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
  2. 장기간 계속하여 사용하지 말 것.
  3. 다래끼인 경우에는 눈꺼풀을 비비거나 그 외, 눈에 자극을 가하지 않도록 주의할 것(또한 다래끼는 체질적으로 생기기 쉬운 경우가 있기는 하나, 피로나 수면부족 등으로 인해 체력이 저하된 때 생기기 쉬우므로 휴식과 수면을 충분히 취하도록 유의할 것).
  4. 이 약은 점안용으로만 사용할 것.
  5. 소프트콘택트렌즈의 장착액으로, 또한 소프트콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 말 것.
  6. 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 곰팡이 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(흐림)될 수 있으므로 주의할 것. 또한 혼탁(흐림)된 것은 사용하지 말 것.
  7. 오염을 방지하기 위해 가능한 공중으로 사용하지 말 것.
- 저장상의 주의사항
  1. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  2. 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
  3. 오염(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장 단위】 10mL, 13mL, 14mL, 15mL

【저장방법 및 유효기간】 기밀용기, 실온보관(1~30°C), 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수 의약품관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 2002년 7월 1일부터 제조를 책임법이 시행되고 있습니다. 부작용을 예방하고 올바른 약물 사용을 위해 약물사용 전 다음 사항을 반드시 읽고 숙지하시기 바랍니다.

1. 사용전 반드시 설명서를 주의 깊게 읽어 보십시오.
2. 정해진 용법·용량을 준수하십시오. (장기 사용시 반드시 의사나 약사와 상담합니다.)
3. 다른 약물과 동시에 사용시 의사나 약사와 상담후 사용하십시오.
4. 어린이가 사용할 때 반드시 보호자의 지도 감독하에 사용하십시오.
5. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
6. 직사광선을 피해 반드시 보관하고, 개봉후 1개월 이상 사용하지 마십시오.

※ 내가 신고한 작은 부작용 국민건강 초석된다.(온라인의약도서관:1577-1255, drug.mfds.go.kr)

※ 이 점부문서의 개정년월일 이후로 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.bi-nex.com)나 전화(080-263-3151)로 문의 하시면 확인하실 수 있습니다.

http://www.bi-nex.com

☎ 080-263-3151

개정년월일 : 2015년 03월 26일



주|바이넥스

경 상·부산광역시 서하구 다대로 388-3