

혈소판 응집억제제

사포그렌정

(사포그릴레이트염산염)

SARPOGREN Tablets

CN012517

사포그렌 정

(사포그릴레이트염산염)

전문의약품
분류번호 339

혈소판 응집억제제

SARPOGREN Tablets

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

사포그릴레이트염산염(별규)100mg

■ 성 상

흰색의 원형 필름코팅정제

■ 효능 · 효과

만성 동맥폐색증(버거씨병, 폐색성동맥경화증, 당뇨병성말초혈관병증 등)에 의한 궤양, 통증 및 냉각 등의 허혈성 증상 개선

■ 용법 · 용량

성인 : 사포그릴레이트염산염로서 1회 100mg을 1일 3회 식후 경구투여합니다.

증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 출혈이 있는 환자(혈우병, 모세혈관위약증, 소화관궤양, 요로출혈, 객혈, 초지체출혈 등) (출혈을 증가시킬 가능성이 있습니다.)
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임부 · 수유부에서의 투여 항 참조)
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 월경기간중인 환자 (출혈을 증가시킬 우려가 있습니다.)

2) 출혈경향 및 이러한 소인이 있는 환자 (출혈경향을 증강시킬 우려가 있습니다.)

3) 항응고제(와르파린 등) 또는 혈소판응집억제작용이 있는 약제(아스피린, 티클로피딘, 실로스타졸 등)를 투여중인 환자(출혈경향을 증강시킬 우려가 있습니다.)

4) 중증의 신장장애가 있는 환자 (배설에 영향을 미칠 우려가 있습니다.)

5) 고령자

3. 이상반응

이상반응 발현빈도는 때때로 0.1% 이상~5% 미만, 드물게 0.1% 미만으로 구분하였다.

1) 중대한 이상반응

- 1) 출혈경향 : 때때로 소화관출혈(토혈 및 하혈 등), 뇌출혈, 피하출혈 등의 출혈이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 2) 혈액장애 : 무과립구증, 때때로 빈혈, 드물게 혈소판 감소, 백혈구 감소 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 3) 급성간염, 간장애 또는 황달 : 때때로 빌리루빈, AST, ALT, ALP, γ -GTP, LDH의 상승 등을 수반하는 간기능장애 및 황달 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

2) 기타 이상반응

- 1) 과민반응 : 홍반, 두드러기, 때때로 발진, 발적, 드물게 구진, 가려

움이나 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

2) 소화기계 : 구토, 구내염, 때때로 구역, 이물감(식도), 가슴쓰림, 복통, 변비, 드물게 식욕부진, 복부평만감, 설사 등이 나타날 수 있다.

3) 순환기계 : 때때로 심계항진, 호흡곤란, 가슴통증, 안면홍조, 손의 부종 등이 나타날 수 있다.

4) 정신신경계 : 때때로 졸음, 미각이상, 두통, 드물게 어지럼 등이 나타날 수 있다.

5) 신장 : 때때로 단백뇨, 요장혈, BUN 상승, 크레아티닌상승이 나타날 수 있다.

6) 기타 : 인두통, 인두불쾌감, 인두작열감, 때때로 체중증가, 혈청중 성지방 상승, 혈청콜레스테롤 상승, 혈청알부민 감소, 혈청칼슘 감소, 요양, 요침사, 드물게 부종, 관태감, 마비감, 발열, 피로 등이 나타날 수 있다.

3) 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 626명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 11례에서 가슴쓰림, 설사, 두통, 소화관출혈, 비출혈, AST · ALT 상승, 빌리루빈 상승, 콜레스테롤 상승, 트리글리세라이드 상승 등이 보고되었습니다.

4. 일반적주의

이 약 투여 중에는 정기적으로 혈액검사를 하는 것이 바람직합니다.

5. 상호작용

항응고제(와르파린 등) 또는 혈소판 응집억제작용이 있는 약물(아스피린, 티클로피딘, 실로스타졸)과 병용투여시 출혈을 조장할 수 있으므로 주의합니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물시험(랫트)에서 태자 사망률 증가 및 신생자 생존율 저하가 보고되었으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않습니다.
- 2) 동물시험(랫트)에서 유즙으로의 분비가 보고되었으므로 수유중인 여성에게는 투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이 투여할 경우에는 수유를 피합니다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되지 않았습니다. (사용경험이 없습니다.)

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 신장, 간장의 생리기능이 저하되는 경우가 많아 높은 혈중농도가 지속될 우려가 있으므로 복용량(예로서 150mg/일)으로 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하여 신중히 투여합니다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간

제조일로부터 36개월

■ 포장단위

30정/병, 100정/병

■ 제조의뢰자

(주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

■ 제조자

우리들제약(주), 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

* 의약품 사용하시기 전에 첨부문서는 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.
* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에 고지한 소비자 분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.
* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

이 첨부문서의 작성일(2017년 01월 25일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처
온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)이나
소비자상담실 (080-611-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인하십시오.



제조발매인
(주)동구바이오제약
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18
www.dongkoo.com