

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

페라티스캡슐

(포도엽엑스)

조 제 용	
일반의약품	
분류번호	219
KGMP	적격업체

원료약품 및 그 분량 1캡슐 중

포도엽엑스(생규).....180mg
 첨가제(타르색소) : 적색 40호, 황색 203호, 청색 1호

성 상

암자색의 분말이 충전된 상하부 담갈색의 경질캡슐제

효능 · 효과

만성정맥부전으로 인한 다음 증상의 개선 : 하지부종(다리부기), 하지(다리)중압감, 통증

용법 · 용량

성인 : 포도엽엑스로서 1일 1회 360 mg(2캡슐)을 아침 식전에 물과 함께 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성 성분에 과민반응 환자
- 2) 소아 및 청소년
- 3) 포도당-갈락토오스 흡수 장애 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 투여하지 않습니다.
- 5) 수유부 : 이 약이 모유로 이행되는지의 여부는 알려져 있지 않으므로 수유부에게는 투여하지 않거나 이 약으로의 치료 중 수유는 권장되지 않습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사 약사와 상의하십시오.

임신 가능성이 있는 여성 : 임신 가능성이 있는 여성에 대한 연구가 없습니다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 알레르기 반응
 드물게 두드러기, 가려움을 동반하거나 동반하지 않은 피부발진, 햇빛 노출시 피부 과민반응, 습진과 같은 피부 반응이 보고되었습니다.
 이러한 반응은 투여 중단 시 사라집니다. 매우 드물게 혈관부종(혈관부기)이 보고된 바 있습니다.
- 2) 드물게 위통, 구역, 설사와 같은 위장관계 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 3) 매우 드물게, 두통이 나타날 수 있습니다.
- 4) 이 약의 투여 중 특히 한 쪽 다리 부위에 갑작스런 이상 증세가 나타나거나 극심한 통증, 종창(부기), 피부 변색, 긴장, 온감이 나타나면, 다리의 심부정맥 혈전증과 같은 중증(심한)질환의 가능성을 고려하여 즉시 의사와 상담하십시오.
- 5) 이 약을 6주 정도 투여하여도 개선이 없을 경우에는 이 약의 복용을 중단하십시오. 이와 같은 경우에는 다른 요인이 있을 수도 있기 때문에 의사와 상담하십시오. 완전한 치료 효과를 얻기 위해서는 몇 주간 복용해야 하나 복용기간이 3달은 넘지 않도록 하십시오.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 운전 및 기계사용의 영향에 대한 적절한 연구가 시행된 바 없습니다.
- 2) 과량복용과 관련된 심각한 이상반응은 나타나지 않았습니다.
- 3) 의사가 처방한 다리 붓대, 압박스타킹, 천물로 씻기 등의 비침습적인 처치는 이 약 복용과 관계없이 계속 지속하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

30캡슐, 300캡슐

취급상의 주의사항

- ※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꿀 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2016년 09월 01일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 이 약은 습기에 취약하므로 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
- ☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정 연월일 : 2016. 09. 01
1609-05