

성인용 아연(Zn)영양제 제텐-씨[®] 정

일반의약품

의약품 분류번호	316 혼합비타민제
-------------	---------------

현대인에게 있어 과다한 업무로 인한 부담감과 스트레스, 피로 등은, 건강하고 행복한 삶의 최대 적입니다. 적당한 휴식을 통해 심신의 피로를 풀어주는 것이 중요하며, 고른 영양섭취를 할 수 있는 균형있는 식사가 꼭 필요합니다.

제텐-씨 정은, 시간에 쫓겨서 적당한 휴식과 균형있는 영양 섭취를 소홀히 하기 쉬운 성인들을 위한 비타민 및 아연 보급 영양제입니다. 제텐-씨 정은 필수미네랄인 아연과 비타민 C 750mg, 비타민 B군 7종과 비타민 E를 함유한 제제로서 영양 불량, 눈의 피로를 비롯한 각종 피로, 소모성질환, 병중이나 병후, 신경통 및 관절통, 구내염 및 설염의 완화에 도움을 줍니다. 또는 일반인보다 더 많은 양의 비타민이 요구되는 임신부, 수유부, 발육기 어린이 및 노인들에게도 좋습니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

황산아연(USP)	61.76mg
아스코르브산(KP)	750mg
토코페롤아세테이트50%(KPC)	60mg
(비타민E로서)	(30 I.U.)
티아민질산염(KP)	15mg
리보플라빈(KP)	15mg
니코틴산아미드(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP)	20mg
피리독신염산염(KP)	20mg
폴산(KP)	400μg
시아노코발라민0.1%(KPC)	12mg
(시아노코발라민으로서 12μg)	

첨가제(타르색소): 청색1호 알루미늄레이크, 황색4호 알루미늄레이크

【성 상】

황갈색의 내용물을 가진 타원형의 녹색 제피정.

【작 용】

- 제텐-씨 정은 각종 효소의 구성요소이며 신체 면역기능조절에 꼭 필요한 미네랄인 Zn(아연)을 보급해 줍니다.
Zn은 체내 각종 효소의 구성요소로서 특히 세포의 분화 및 증식에 중요한 역할을 하고 있으며, 인슐린 및 성장 호르몬의 활성화도 연관이 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 Zn은 면역기능 조절에 여러 가지로 관여하고 있는 미네랄로서 결핍 시 성장지연, 피부 변화 등이 나타나게 됩니다. 제텐-씨 정은 아연을 보급함으로써 영양불량이나 노년기, 발육기에 섭취하시면 좋습니다.
- 제텐-씨 정에는 피부미용, 피로시에 좋은 비타민 C가 750mg 함유되어 있습니다.
비타민 C는 기미, 주근깨 등을 완화시키고 잇몸출혈, 비출혈을 예방하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 제텐-씨 정에는 비타민 C가 750mg이나 함유되어 있기 때문에 다른 비타민 C 제제를 따로 복용할 필요가 없습니다.
- 제텐-씨 정에는 피로회복에 좋은 7종의 비타민 B군 및 항산화제인 비타민 E가 다량 함유되어 있습니다.
비타민 B군은 신경을 많이 쓰는 직장인들에게 쉽게 찾아오는 피로나, 병중·병후, 임신·수유기의 체력 저하시 도움을 줍니다. 특히 눈의 피로, 구내염 및 설염을 완화시켜 주며 비타민 E와 함께 신경통, 관절통(요통, 건통 등)에도 도움을 줍니다. 비타민 E는 노화의 주된 원인으로 알려진 활성 산소를 제거하는 항산화 비타민제로 노년기에 특히 좋습니다.
- 제텐-씨 정은 필립코팅 정제이므로 비타민의 파괴가 방지되고 역가가 장기간 보존됩니다.

【효능·효과】

비타민 및 아연의 보급 :

- 신경통, 관절통(요통, 건통 등), 눈의 피로, 구내염 및 설염의 완화.
- 영양불량, 소모성질환, 피로, 병중·병후, 임신·수유기, 발육기, 노년기.

【용법·용량】

성인 1회 1정, 1일 1회 복용.

【사용상의 주의사항】

1. 복용시 다음 사항에 주의할 것.

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것.

3) 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 황색4호 알루미늄레이크를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 복용중 또는 복용후는 다음사항에 주의할 것.

- 1) 본제의 복용에 의해 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
- 2) 본제의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있다. 출혈이 오래 계속될 경우에는 의사 또는 약사와 상담할 것.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담할 것.

3. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】

밀폐·차광용기, 제조일로부터 36개월

【포장단위】

자사포장 단위

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
2. 개봉 후 충전물이 있을 경우 완전히 제거하고 사용하시기 바라며, 개봉 후 뚜껑을 잘 닫아 보관할 것.(실리카겔(건조제)을 먹지 말 것.)

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의할 것.

설명서 개정연월일: 2012. 03. 15

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 801121 000472
Ver: 00047002