

혈액순환장애 예방 및 치료제

셀크톤

연질캡슐

셀크톤연질캡슐은 종래에 사용하던 무기염 제제가 아닌 생체이용률이 높은 크롬건조효모, 셀레늄건조효모 및 활성비타민C를 이상적으로 배합하여 만든 제제로서 당뇨병, 고혈압, 심장병 등 성인병 치료에 효과를 나타내는 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,240mg) 중

셀레늄함유건조효모(KPC) (셀레늄으로서 50 μ g)	92.60mg
크롬함유건조효모(KPC) (크롬으로서 50 μ g)	100.00mg
아스코르브산(KP)	50.00mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호	

【성 상】

미황색의 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

고혈압의 저하 및 예방

【용법·용량】

성인 1일 1회 1캡슐을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 구성성분에 과민증 환자
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 부작용
구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 이 약의 투여에 의해 부작용이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 성인의 1일 셀레늄 필요량은 70~150 μ g이고, 200 μ g 이상 투여 하면 독성이 나타날 수 있으므로 200 μ g 이상 투여하지 않는다.
 - 지방 과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의양을 고려하여 그지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 임상검사치에의 영향

각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저 장 방 법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【사 용 기 간】 제조일로부터 24개월

【포 장 단 위】 90캡슐, 180캡슐

-
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
 - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
 - 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 - 설명서 작성일자(2010년 7월) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
 - **소비자상담실(반품 및 교환처) : 02-568-0051**
-

작성일 2010. 07

제 조 원



경기도 화성시 향남읍 삼신리 906-6

알엔피코리아(주)

판 매 원



녹십자가족 ———
상아제약

경기도 용인시 기흥구 보정동 303